

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение. Построение математической модели.	6
3	Задание	8
4	Задачи	9
5	Выполнение лабораторной работы	10
5.1	Решение с помощью программ	10
5.1.1	Julia	10
5.1.2	Результаты работы кода на Julia	14
5.2	OpenModelica	15
5.2.1	Результаты работы кода на OpenModelica	17
6	Анализ полученных результатов. Сравнение языков.	18
7	Вывод	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

5.1	Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные изолированы	14
5.2	Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные могут заражать особей группы S	15
5.3	Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные изолированы	17
5.4	Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные могут заражать особей группы S	17

Список таблиц

[1]

1 Цель работы

Изучить и построить модель эпидемии.

2 Теоретическое введение.

Построение математической модели.

Рассмотрим простейшую модель эпидемии [1]. Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через $S(t)$. Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их $I(t)$. А третья группа, обозначаемая через $R(t)$ – это здоровые особи с иммунитетом к болезни. До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа $S(t)$ меняется по следующему закону:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S & , \text{если } I(t) > I^* \\ 0 & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися

и теми, кто уже болеет и лечится, то есть:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I & , \text{ если } I(t) > I^* \\ -\beta I & , \text{ если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни):

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности α, β - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени $t = 0$ нет особей с иммунитетом к болезни $R(0) = 0$, а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей $I(0)$ и $S(0)$ соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая: $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$

3 Задание

Вариант 7

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 13000$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 113$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 13$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

1. $I(0) \leq I^*$
2. $I(0) > I^*$

4 Задачи

Построить графики изменения числа особей в каждой из трех групп S , I , R .
Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случаях:

1. $I(0) \leq I^*$

2. $I(0) > I^*$

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Решение с помощью программ

5.1.1 Julia

Код программы для случая $I(0) \leq I^*$:

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
N = 13000
```

```
I0 = 113 # заболевшие особи
```

```
R0 = 13 # особи с иммунитетом
```

```
S0 = N - I0 - R0 # здоровые, но восприимчивые особи
```

```
alpha = 0.6 # коэффициент заболеваемости
```

```
beta = 0.2 # коэффициент выздоровления
```

```
#I0 <= I*
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    S, I, R = u
```

```

    du[1] = 0
    du[2] = -beta*u[2]
    du[3] = beta*I
end

v0 = [S0, I0, R0]
tspan = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)
S = [u[1] for u in sol.u]
I = [u[2] for u in sol.u]
R = [u[3] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt = plot(
    dpi = 600,
    legend = :topright)

plot!(
    plt,
    T,
    S,
    label = "Восприимчивые особи",
    color = :blue)

plot!(
    plt,
    T,
    I,
    label = "Инфицированные особи",
    color = :green)

plot!(

```

```
plt,
T,
R,
label = "Особи с иммунитетом",
color = :red)
```

```
savefig(plt, "lab6_1.png")
```

Код программы для случая $I(0) > I^*$:

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
N = 13000
```

```
I0 = 113 # заболевшие особи
```

```
R0 = 35 # особи с иммунитетом
```

```
S0 = N - I0 - R0 # здоровые, но восприимчивые особи
```

```
alpha = 0.4 # коэффициент заболеваемости
```

```
beta = 0.1 # коэффициент выздоровления
```

```
#I0 > I*
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    S, I, R = u
```

```
    du[1] = -alpha*u[1]
```

```
    du[2] = alpha*u[1] - beta*u[2]
```

```
    du[3] = beta*I
```

```
end
```

```

v0 = [S0, I0, R0]
tspan = (0.0, 120.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax=0.05)
S = [u[1] for u in sol.u]
I = [u[2] for u in sol.u]
R = [u[3] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

```

```

plt = plot(
    dpi=600,
    legend=:right)

```

```

plot!(
    plt,
    T,
    S,
    label="Восприимчивые особи",
    color=:blue)

```

```

plot!(
    plt,
    T,
    I,
    label="Инфицированные особи",
    color=:green)

```

```

plot!(
    plt,
    T,
    R,

```

```
label="Особи с иммунитетом",  
color=:red)
```

```
savefig(plt, "lab6_2.png")
```

5.1.2 Результаты работы кода на Julia




Рис. 5.1: Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные изолированы




Рис. 5.2: Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные могут заражать особей группы S

5.2 OpenModelica

Код программы для случая $I(0) \leq I^*$:

```
model lab6_1
Real N = 13000;
Real I;
Real R;
Real S;
Real alpha = 0.6;
Real beta = 0.2;
initial equation
I = 113;
R = 13;
S = N - I - R;
equation
der(S) = 0;
```

```
der(I) = -beta*I;  
der(R) = beta*I;  
end lab6_1;
```

Код программы для случая $I(0) > I^*$:

```
model lab6_2  
Real N = 13000;  
Real I;  
Real R;  
Real S;  
Real alpha = 0.4;  
Real beta = 0.1;  
initial equation  
I = 113;  
R = 13;  
S = N - I - R;  
equation  
der(S) = -alpha*S;  
der(I) = alpha*S - beta*I;  
der(R) = beta*I;  
end lab6_2;
```


5.2.1 Результаты работы кода на OpenModelica




Рис. 5.3: Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные изолированы




Рис. 5.4: Графики численности особей трех групп S, I, R, построенные на Julia, для случая, когда больные могут заражать особей группы S

6 Анализ полученных результатов.

Сравнение языков.

В итоге проделанной работы мы построили графики зависимости численности особей трех групп S , I , R для случаев, когда больные изолированы и когда они могут заражать особей группы S .

Построение модели эпидемии на языке OpenModelica занимает значительно меньше строк, чем аналогичное построение на Julia. Кроме того, построения на языке OpenModelica проводятся относительно значения времени t по умолчанию, что упрощает нашу работу.

7 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эпидемии и построена модель на языках Julia и Open Modelica.

Список литературы

1. Mathematical_modelling_of_infectious_diseases [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_modelling_of_infectious_diseases.