

# Algebre Lineaire I

David Wiedemann

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Le language des Ensembles</b>	<b>3</b>
1.1	Notations . . . . .	3
1.2	Ensembles . . . . .	4
1.2.1	Exemples . . . . .	4
1.3	Sous-Ensembles . . . . .	4
1.4	$\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des sous-ensembles . . . . .	4
1.4.1	Exercice . . . . .	5
1.5	Operations sur les ensembles . . . . .	5
1.6	$\times$ : Produit cartésien . . . . .	5
1.7	Applications entre ensembles . . . . .	5
1.7.1	Graphe . . . . .	6
1.8	Composition/Associativite . . . . .	6
1.8.1	Associativite . . . . .	7
1.9	Image,Preimage . . . . .	7
1.10	Relation de composition par les applications reciproques . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Groupes</b>	<b>12</b>
2.1	Le groupe Symmetrique . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Sous-Groupe</b>	<b>16</b>
3.1	Groupe engendre par un ensemble . . . . .	17
3.2	Morphismes de Groupes . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Noyau et Image</b>	<b>23</b>
<b>5</b>	<b>Anneaux</b>	<b>27</b>

## List of Theorems

1	Theorème (Composition de fonctions) . . . . .	7
1	Definition (Injectivite) . . . . .	8
2	Definition (Surjectivite) . . . . .	8

3	Definition (Bijectivite) . . . . .	9
2	Proposition (Injectivite et cardinalite) . . . . .	9
3	Proposition (Surjectivite et cardinalite) . . . . .	9
4	Proposition (injectivite et condition) . . . . .	9
5	Proposition (Surjectivite et condition) . . . . .	9
7	Lemme (Composition d'applications surjectives et injectives) . .	10
8	Proposition (Inverse d'une composition) . . . . .	11
4	Definition (Notations Injection) . . . . .	12
5	Definition (Notations Surjection) . . . . .	12
6	Definition (Notations Bijection) . . . . .	12
7	Definition (Groupe abstrait) . . . . .	13
8	Definition (Groupes commutatifs) . . . . .	14
9	Definition (Notation additive) . . . . .	14
9	Proposition (Lois de Groupe) . . . . .	14
10	Definition (Notation exponentielle) . . . . .	15
11	Definition (exponentielle) . . . . .	15
12	Definition (Notation multiple) . . . . .	15
13	Definition (Sous-groupe) . . . . .	16
11	Proposition (Critere de Sous-groupe) . . . . .	16
14	Theorème (Sous groupe de $\mathbb{Z}$ ) . . . . .	17
15	Proposition (Intersection de sous-groupes) . . . . .	18
14	Definition (Sous-groupe engendre) . . . . .	18
17	Theorème . . . . .	18
15	Definition (Morphisme de Groupe) . . . . .	19
18	Theorème . . . . .	19
16	Definition (Notations) . . . . .	20
21	Proposition . . . . .	21
22	Proposition . . . . .	22
17	Definition (Groupes Isomorphes) . . . . .	22
24	Theorème . . . . .	23
25	Proposition . . . . .	23
18	Definition . . . . .	24
26	Theorème (Critere d'injectivite) . . . . .	24
19	Definition (Anneaux) . . . . .	27
30	Lemme . . . . .	27

## Lecture 1: Le langage des Ensembles

Mon 14 Sep

### 1 Le langage des Ensembles

Le terme “Algebre” est derive du mot arabe al-jabr tire du titre d’un ouvrage. Al-jabr signifie restoration.

Par exemple :  $2x - 4 = 0$  Ce qu’on veut c’est trouver  $x$ . Il faut donc transformer cette egalite en effectuant des operations de part et d’autres de l’egalite.

$$\begin{array}{ll} 2x = 4 & | + 4 \\ x = \frac{4}{2} = 2 & | : 2 \end{array}$$

Le but de l’ouvrage etait de resoudre des soucis administratifs, comment partager des champs etc.

Le but c’est d’introduire les espaces vectoriels a partir de 0.

Il y aura besoin d’introduire des groupes, anneaux, corps (anneaux particuliers), modules et des ensembles.

Il faut donc commencer avec les objets les plus simples, i.e. les groupes. Ici, on introduit de maniere moins rigoureuse qu’avec les systemes algebriques.

#### 1.1 Notations

- "Il existe"  $\exists$ , "Il existe un unique"  $\exists!$
- "Quel que soit", "Pour tout",  $\forall$
- "Implique",  $\Rightarrow$
- "est equivalent"  $\iff$ , ou “ssi”
- "sans perte de generalite" “spdg”, “wlog”
- “on peut supposer” “ops, wma”
- “tel que” t.q. ou |

On ne va pas parler de logique mathematique dans ce cours, ni de definition rigoureuse des ensembles

## 1.2 Ensembles

Un ensemble est une collection d'éléments "appartenant" à  $E$

$$e \underbrace{\in}_{\text{"appartient à"}} E$$

### 1.2.1 Exemples

- $\emptyset$  ne contient aucun élément
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2\}$
- $\mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$
- $\mathbb{R}$ , nombres réels, nombres complexes.

## 1.3 Sous-Ensembles

Un sous-ensemble  $A$  d'un ensemble  $E$  est un ensemble t.q. tout élément de  $A$  appartient à  $E$ . Formellement :

$$a \in A \Rightarrow a \in E$$

$$A \underbrace{\subset}_{\text{inclut dans } E} E$$

L'ensemble vide est un sous-ensemble de  $E$  pour tout ensemble  $E$ .

$$\emptyset \subset E \forall E$$

Deux ensembles  $E$  et  $F$  sont égaux si ils ont les mêmes éléments, ssi  $E$  est inclus dans  $F$  et  $F$  est inclus dans  $E$  (regarder notations)

$$E \subset F \wedge F \subset E \Rightarrow E = F.$$

## 1.4 $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des sous-ensembles

C'est l'ensemble des  $A \in E$ , aussi appelé l'ensemble des parties de  $E$ .

Remarque : L'ensemble de TOUS les ensembles n'est pas un ensemble et c'est du au paradoxe de Russell (Logicien anglais) Si c'était le cas, on considérerait

$$N_{cont} = \{ \text{L'ensemble des } E \text{ tq } E \text{ n'est pas contenu dans lui meme.} \}$$

Cet ensemble  $N_{cont}$  est-il contenu dans lui même ou pas ?

### 1.4.1 Exercice

Ncont est il contenu dans lui meme ou pas ?  $\nexists$

## 1.5 Operations sur les ensembles

—  $A, B \subset E$

$$A \cup B = \{e \in E \text{ tq } e \in A \text{ ou bien } e \in B\}$$

Réunion de  $A$  et  $B$ .

—  $A \cap B = \{e \in E | e \in A \text{ et } e \in B\}$

Difference :  $A - B$  ou  $A \setminus B$

$$= \{e \in A \wedge e \notin B\}$$

Difference symmetrique :

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

Si  $A \cap B = \emptyset$  on dit que  $A$  et  $B$  sont disjoints.  $A_1, \dots, A_n \subset E \quad n \geq 1$

On peut noter une grande reunion ainsi :

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n &= A_1 \cup (A_2 \cup \dots \cup A_n) \\ &= \{e \in E | \exists i \in \{1, \dots, n\} \text{ avec } e \in A_i\} \\ &= \bigcup_{i=1}^n A_i \end{aligned}$$

## 1.6 $\times$ : Produit cartésien

Si  $A$  et  $B$  sont des ensembles

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

On peut bien sur iterer

$$A_1 \times \dots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_n \text{ avec } a_i \in A_i\}$$

## 1.7 Applications entre ensembles

Soient  $X$  et  $Y$  deux ensembles.

Une application (fonction)  $f$  est la donnée pour chaque element  $x \in X$  (L'espace de depart) d'un element  $f(x) \in Y$  (l'espace d'arrivee)

$$f : X \rightarrow Y$$




FIGURE 1 – Schema de la composition de 2 applications

### 1.7.1 Graphe

Se donner une application

$$f : X \rightarrow Y$$

equivaut a se donner un graphe  $G$  (graphe de  $f$ )

$$G \subset X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$$

tq pour  $x_0 \in X$  l'ensemble des elements du graphe  $G$  de la forme  $(x_0, y)$  possede exactement un element  $(x_0, y_0)$ .  $y_0 = f(x_0)$  = l'image de  $x_0$  par l'application  $f$ .

On associe simplement au premier element un autre element.

## 1.8 Composition/Associativite

Soient

$$f : X \rightarrow Y$$

$$g : Y \rightarrow Z$$

$$\begin{aligned} g \circ f : X &\longrightarrow Z | x \in X \longrightarrow f(x) \in Y \\ &\longrightarrow g(f(x)) \in Z \end{aligned}$$

Cette application s'appelle la composee de  $f$  et  $g$ .

### 1.8.1 Associativité

$$f : X \longrightarrow Y$$

$$g : Y \longrightarrow Z$$

$$h : Z \longrightarrow W$$

Alors

$$\begin{aligned} (g \circ f) : X &\longrightarrow Z \circ h : Z \longrightarrow W \\ &\Rightarrow h \circ (g \circ f) \end{aligned}$$

$$f : X \longrightarrow Y \circ h \circ g : Y \longrightarrow W$$

On a que

**Theorème 1 (Composition de fonctions)**

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h \circ g \circ f$$

**Preuve**

$$\begin{aligned} h \circ (g \circ f) : x &\longrightarrow h((g \circ f)(x)) \\ &= h(g(f(x))) \in W \\ (h \circ g) \circ f : x &\longrightarrow (h \circ g)(f(x)) \\ h(g(f(x))) &\in W \end{aligned}$$

□

## 1.9 Image, Preimage

$$f : X \longrightarrow Y$$

A l'application  $f$  sont associées deux applications impliquant  $\mathcal{P}(X), \mathcal{P}(Y)$ .

$$— \text{ } Im(f) : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(Y)$$

$$A \subset X \longrightarrow Im(f)(A) = f(A)$$

C'est ce qu'on appelle l'image de  $A$  par  $f$

$$= \{f(a) \in Y | a \in A\} \subset Y \in \mathcal{P}(Y)$$

$$\text{L'image de } f \text{ } Im(f) := f(X) = \{f(x) \in Y | x \in X\}$$

— Preimage de  $f : \text{Preim}(f) :$

$$\text{Preim}(f) : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$

$$B \longrightarrow \text{Preim}(f)(B) = f^{-1}(B) \quad = \text{preimage de l'ensemble } B \text{ par } f.$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X | f(x) \in B\}$$

### Exemples

$$f_1(\{1, 2\}) = \{2, 4\}$$

$$f_1^{-1}(\{1, 2, 3, 4\}) = \{1, 2, 3, 4\}$$

## Lecture 2: Injectivite, Surjectivite et Bijectivite

Tue 15 Sep

### Definition 1 (Injectivite)

Une application  $f : X \mapsto Y$  est injective ( injection) si  $\forall y \in Y f^{-1}(\{y\})$  ne possede pas plus d'un element. On note

$$f : X \hookrightarrow Y$$

Remarque : Une condition equivalente d' injectivite :

$$\forall x \neq x' \in X \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

### Definition 2 (Surjectivite)

Une application  $f : X \mapsto Y$  est surjective ( surjection) si  $\forall y \in Y f^{-1}(\{y\})$  possede au moins un element.

On note

$$f : X \twoheadrightarrow Y$$

Soit  $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ , il existe au moins  $x \in X$  tq  $f(x) = y$

De maniere equivalente

$$\text{surjectif} \iff \text{Im}(f) = f(X) = Y$$

Alors on a une application

$$\begin{aligned} "f'' : X &\mapsto Y \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Cette application est toujours surjective.



**Definition 3 (Bijectivite)**

Une application  $f : X \mapsto Y$  est bijective (bijection) si elle est injective et surjective, cad si  $\forall y \in Y, f^{-1}(\{y\})$  (l'ensemble des antecedents de  $y$  par  $f$ ) possede exactement un element. On note la bijectivite par

$$f : X \simeq Y$$

Si  $f : X \simeq Y$ , alors on peut identifier les els de  $X$  avec ceux de  $Y$  :

$$x \in X \leftrightarrow f(x) \in Y$$

Remarque : Si  $f : X \hookrightarrow Y$

$Y' = f(X)$  l'application

$$f : X \twoheadrightarrow Y' = f(X)$$

et toujours surjective. et comme  $f$  est injective, on obtient une bijection  $f : X \simeq Y' = f(X)$  entre  $X$  et  $f(X)$ .

$X$  peut etre identifie a  $f(X)$ .

- $Id_X : \underbrace{X \mapsto X}_{x \mapsto x}$  est bijective
- $x \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$  est inj et bijective.
- $\mathcal{P} \simeq \{0, 1\}^X = \mathcal{F}(X, \{0, 1\})$

**Exercice**

$$C : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$$

$$(m, n) \mapsto \frac{1}{2}((m+n)^2 + m + 3n)$$

Montrer la bijectivite.

Dans ce qui suit, soient  $X$  et  $Y$  des ensembles finis possedant respectivement  $|X|$  et  $|Y|$  elements et  $f : X \mapsto Y$  une application entre ces ensembles. On a les proprietes suivantes :

**Proposition 2 (Injectivite et cardinalite)**

Si  $f : X \hookrightarrow Y$  est injective alors  $|X| \leq |Y|$

**Proposition 3 (Surjectivite et cardinalite)**

Si  $f : X \twoheadrightarrow Y$  est surjective alors  $|X| \geq |Y|$ .

**Proposition 4 (injectivite et condition)**

Si  $f : X \hookrightarrow Y$  et  $|X| \geq |Y|$  alors  $|Y| = |X|$  et  $f$  bijective.

**Proposition 5 (Surjectivite et condition)**

Si  $f : X \twoheadrightarrow Y$  et  $|X| \leq |Y|$  alors  $|Y| = |X|$  et  $f$  bijective.

**Propriete 6 (Bijectivite)**

Si  $f$  bijective, on peut lui associer une application reciproque :

$$f^{-1} : Y \mapsto X$$

$$y \mapsto x$$

tel que  $f^{-1}(\{y\}) = \{x\}$ ,  $x$  unique.

### 1.10 Relation de composition par les applications reciproques

—  $f : X \simeq Y$  et  $f^{-1} : Y \simeq X$

$$f^{-1} \circ f : X \mapsto Y \mapsto X = Id_X.$$

En effet,  $\forall x \in X$  si on pose  $y = f(x)$

on a  $f^{-1}(y) = x = f^{-1}(f(x)) = x$

—  $f \circ f^{-1} : Y \mapsto X \mapsto Y$

$$f \circ f^{-1} = Id_Y$$

—  $(f^{-1})^{-1} = f$

—  $f : X \simeq Y$  et  $g : Y \simeq Z$

Alors  $g \circ f : X \mapsto Z$  est bijective et  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

**Lemme 7 (Composition d'applications surjectives et injectives)**

1. Si  $f$  et  $g$  sont injectives,  $g \circ f$  est injective.

2. Si  $f$  et  $g$  sont surjectives,  $g \circ f$  est surjective.

3. Si  $f$  et  $g$  sont bijectives,  $g \circ f$  est bijective et

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

**Preuve**

1.  $g \circ f : X \mapsto Y \mapsto Z$

$$x \mapsto g(f(x))$$

$\forall z \in Z$  on veut montrer que  $(g \circ f)^{-1}(\{z\})$  a au plus un element

$$(g \circ f)^{-1}(\{z\}) = \{x \in X | g(f(x)) = z\}$$

$$\text{si } g(f(x)) = z \Rightarrow f(x) \in g^{-1}(\{z\})$$

l'ensemble  $\{x \in X | g(f(x)) = z\}$  est contenu dans  $g^{-1}(\{z\})$  et donc possede au plus 1 element. Si cet ensemble est vide on a fini  $(g \circ f)^{-1}(\{z\}) =$

$\emptyset$ . Si  $g^{-1}(\{z\}) \neq \emptyset$  alors  $g^{-1}(\{z\}) = \{y\}$   
et  $x \in (g \circ f)^{-1}(\{z\})$  verifie

$$f(x) = y \Rightarrow x \in f^{-1}(\{y\})$$

Comme  $f^{-1}$  est injective  $f^{-1}(\{y\})$  possede au plus un element.  
Et donc  $g^{-1}(f^{-1}(\{z\}))$  a au plus 1 element car  $g$  est surjective

2. Surjectivite : Exercice

3. Bijectivite : si  $f$  et  $g$  sont bijectives  $g \circ f$  est bijective.

$f$  et  $g$  sont inj  $\Rightarrow g \circ f$  inj.

$f$  et  $g$  sont surj  $\Rightarrow g \circ f$  surj

Si  $f$  et  $g$  sont bij  $\Rightarrow g \circ f$  est injective et surjective

$\Rightarrow g \circ f$  bijective. □

**Proposition 8 (Inverse d'une composition)**

On veut montrer que  $\forall z \in Z$

$$X := (g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1} \circ g^{-1}(z) \underbrace{=}_{?} f^{-1}(g^{-1}(z)) = x'$$

**Preuve**

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= g(f(x)) = z \\ g \circ f(f^{-1}(g^{-1}(z))) &= g(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))) \\ &= g(f \circ f^{-1}(g^{-1}(z))) \end{aligned}$$

Or on sait que

$$f \circ f^{-1} = g \circ g^{-1} Id_Y$$

et donc

$$g(f \circ f^{-1}(g^{-1}(z))) = g(g^{-1}(z)) = z = (g \circ f)(x)$$

On a donc montre que

$$(g \circ f)(x) = z = (g \circ f)(x') \quad \square$$

$\Rightarrow x$  et  $x'$  on la meme image par  $g \circ f$  et comme  $g \circ f$  est injective  $x = x'$ . Donc  
 $\forall z \in Z (g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1} \circ g^{-1}(z)$ .

L'ensemble des applications entre  $X$  et  $Y$  seran note

$$\mathcal{F}(X, Y) = HOM_{ENS}(X, Y) = Y^X$$

**Definition 4 (Notations Injection)**

*L'ensemble des applications injectives sera noté*

$$INJ_{ENS}(X, Y)$$

**Definition 5 (Notations Surjection)**

*L'ensemble des applications surjectives sera noté*

$$SURJ_{ENS}(X, Y)$$

**Definition 6 (Notations Bijection)**

*L'ensemble des applications bijectives sera noté*

$$BIJ_{ENS}(X, Y) = ISO_{ENS}(X, Y)$$

*Si il s'agit d'une bijections de  $X$  vers  $Y = X$  alors*

$$Hom_{ENS}(X, X) = END_{ENS}(X) = AUT_{ENS} = ISO_{ENS}(X)$$

*On appelle cet ensemble aussi parfois l'ensemble des permutations de  $X$ .*

## 2 Groupes

### 2.1 Le groupe Symmetrique

Voici un exemple d'un groupe, le groupe des bijections muni de la composition.

$X$  ensemble

$$Bij(X, X) = Bij(X)$$

Clairement  $\{Id_X\} \subset Bij(X) \Rightarrow Bij(X) \neq \emptyset$ .

Supposons  $f, g \in Bij(X)$ , alors

$$f, g \mapsto g \circ f \in Bij(X)$$

On dispose donc de cette loi de composition :

$$\begin{aligned} \circ : Bij(X) \times Bij(X) &\longrightarrow Bij(X) \\ (g, f) &\longrightarrow g \circ f \end{aligned}$$

$\circ$  est associative :

$f, g, h \in Bij(X)$ , alors

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h) = f \circ g \circ h$$

$Id_X$  est neutre :  $\forall f \in Bij(X)$

$$f \circ Id_X = Id_X \circ f = f$$

Donc

$$x \in X(f \circ Id_X)(x) = f(Id_X(x)) = f(x)$$

Pour chaque element  $f$  on trouve une reciproque notee  $f^{-1}$  tel que

$$f^{-1} \circ f = Id_X = f \circ f^{-1}$$

Toutes ces proprietes font de

$$Bij(X) = Aut_{ENS}(X)$$

un groupe

**Definition 7 (Groupe abstrait)**

Un groupe  $(G, \star, e_G, \cdot^{-1})$  est la donnee d'un quadruple forme

- d'un ensemble  $G$  non-vide
- d'une application ( appelee loi de composition interne)  $\star$  tq

$$\begin{aligned} \star : G \times G &\mapsto G \\ (g, g') &\mapsto \star(g, g') =: g \star g' \end{aligned}$$

- d'un element  $e_G \in G$  (element neutre)
- de l'application d'inversion  $\cdot^{-1}$

$$\begin{aligned} \cdot^{-1} : G &\mapsto G \\ g &\mapsto g^{-1} \end{aligned}$$

ayant les proprietes suivantes

- Associativite :  $\forall g, g', g'' \in G, (g \star g') \star g'' = g \star (g' \star g'')$ .
- Neutralite  $e_G$  :  $\forall g \in G, g \star e_G = e_G \star g = g$ .
- Inversibilite :  $\forall g \in G, g^{-1} \star g = g \star g^{-1} = e_G$ .

Quelques exemples :

- $(Bij(X), \circ, Id_X, \cdot^{-1})$  est un groupe.
- $(\mathbb{Z}, +, 0, -\cdot)$  est un groupe.
- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times, 1, \cdot^{-1})$  est un groupe.
- $(\{1, -1\}, \times, 1, \cdot^{-1})$  est un groupe.

**Definition 8 (Groupes commutatifs)**

Un groupe  $(G, \star, e_G, \cdot^{-1})$  est dit commutatif si  $\star$  possède la propriété supplémentaire de commutativité :

$$\forall g, g' \in G \quad g \star g' = g' \star g$$

Exemple Les groupes  $(\mathbb{Z}, +)$  ou  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$  sont des groupes commutatifs. Par contre si  $X$  possède au moins 3 éléments  $\text{Bij}(X)$  n'est pas commutatif.

**Lecture 3: Groupes, Anneaux, Corps**

Tue 22 Sep

$$\exists \sigma, \tau \in \text{Bij}(X) \text{ tq. } \sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$$

**Definition 9 (Notation additive)**

Si un groupe est commutatif on pourra utiliser une notation "additive" :

- La loi sera notée  $+$ .
- L'élément neutre sera noté  $0_G$ .
- L'inversion sera appelée opposé et notée  $-g$  et  $g + (-g) = 0_G$ .

**Proposition 9 (Lois de Groupe)**

- Involutive de l'inversion :  $\forall g, (g^{-1})^{-1} = g, g^{-1} \star g = e_G$ .
- L'élément neutre est unique, si  $\exists e'_G$  tq  $g \in G$  vérifiant  $g \star e'_G = g$ , alors  $e'_G$  est l'élément neutre.
- Unicité de l'inverse : si  $g' \in G$  vérifie  $g \star g' = e_G$ , alors  $g' = g^{-1}$ .
- On a  $(g \star g')^{-1} = g'^{-1} \star g^{-1}$

**Preuve**

La preuve de toutes les propriétés est donnée dans le support de cours.

On montre l'unicité de l'élément neutre.

Si  $e'_G$  est telle que pour un certain  $g \in G$ , tq

$$g \star e'_G = g$$

Alors on a à gauche par  $g^{-1}g^{-1} \star g \star e'_G = g^{-1} \star g$

$$= e_G \star e'_G = e_G = e'_G$$

Admettons que l'inverse est unique et montrons que si  $g, g' \in G$   $(g \star g')^{-1} = g'^{-1} \star g^{-1}$

On calcule

$$\begin{aligned}(g \star g') \star (g'^{-1} \star g^{-1}) &= g \star g' \star g'^{-1} \star g^{-1} \\ &= g \star e_G \star g^{-1} = g \star g^{-1}\end{aligned}$$

de meme :

$$(g'^{-1} \star g^{-1}) \star (g \star g') = e_G$$

Donc  $g'^{-1} \star g^{-1}$  a les meme proprietes d'inversion que  $(g \star g')$  et par unicite c'est  $(g \star g')^{-1}$ .  $\square$

**Definition 10 (Notation exponentielle)**

$(G, \cdot)$  un groupe et  $g \in G$ . On peut :

$$g \rightarrow g^{-1} \cdot g \cdot g, g \cdot g \cdot g, g \cdot g \cdot g \cdot g \dots$$

On peut faire ca  $n$  fois  $n \geq 1$  un entier, on notera :

$$g \cdot g \cdot g \cdot g = g^n$$

si  $n < 0$  :

$$g^n := (g^{-1})^n = \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot \dots \cdot g^{-1}}_{|n| \text{ fois}}$$

et  $g^0 := e_G$

**Exercice 10**

Verifier que :  $g^{m+n} = g^m \cdot g^n$

**Definition 11 (exponentielle)**

$$\begin{aligned}\exp_g : \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ n &\rightarrow g^n\end{aligned}$$

On l'appelle l'exponentielle de  $n$  en base  $g$ .

$$\exp_g(m+n) = \exp_g(m) \cdot \exp_g(n)$$

**Definition 12 (Notation multiple)**

Si  $G$  est commutatif et que le groupe est note additivement

$$n \geq 1 \quad \underbrace{g + \dots + g}_{n \text{ fois}} = n \cdot g$$

Si  $n < 0$

$$n \cdot g := \underbrace{(-g) + \dots + (-g)}_{|n| \text{ fois}}$$

Donc on a la notation

$$\forall m, n \in \mathbb{Z} (m+n) \cdot g = m \cdot g + n \cdot g$$

### 3 Sous-Groupe

**Definition 13 (Sous-groupe)**

Soit  $(G, \star, e_G, \cdot^{-1})$  un groupe. Un sous-groupe  $H \subset G$  est un sous-ensemble de  $G$  tq

1.  $e_G \in H$

2.  $H$  est stable par la loi de composition

$$\forall h, h' \in H, h \star h' \in H$$

3.  $H$  est stable par l'inversion

$$\forall h \in H, h^{-1} \in H$$

$(H, \star, e_G, \cdot^{-1})$  forme un groupe

**Proposition 11 (Critere de Sous-groupe)**

Pour montrer que  $\emptyset \neq H \subset G$  est un sous groupe il suffit de verifier l'une ou l'autre de ces proprietes :

1. a.  $\forall h, h' \in H, h \star h' \in H$

- b.  $\forall h \in H, h^{-1} \in H$

2.  $\forall h, h' \in H, h \star h'^{-1} \in H.$

**Preuve**

Montrons que  $H$  verifie le point 1 de la definition.

Comme  $H \neq \emptyset$  il existe  $h \in H$ . Par hypothese  $h \star h^{-1} \in H$ .

On verifie la stabilite par inversion

Soit  $h \in H$  et par hypothese  $e_G \in H$   $e_G \star h^{-1} \in H$

On verifie la stabilite par produit

Soit  $h, h' \in H$  alors  $(h')^{-1} \in H$  et  $h \star ((h')^{-1})^{-1} \in H$ . Or

$$((h')^{-1})^{-1} = h' \Rightarrow h \star h' \in H \quad \square$$

**Exemple**

$(G, \cdot) g \in G$  et  $g^{\mathbb{Z}} = \exp_g(\mathbb{Z}) = \{g^n, n \in \mathbb{Z}\}$  Forme un sous groupe.

**Preuve**

Soit  $h, h' \in H = g^{\mathbb{Z}}$  alors

$$h = g^m h' = g^{m'} m, m' \in \mathbb{Z}$$

Alors

$$h \cdot h' = g^m \cdot g^{m'} = g^{m+m'} \in g^{\mathbb{Z}}$$

Soit  $h \in g^{\mathbb{Z}} h = g^m$  comme  $h^{-1} = g^{-m}$  alors  $h^{-1} \in g^{\mathbb{Z}}$   $\square$



**Exemple**

1.  $\{e_G\} \subset G$  est un sous groupe de  $G$  on l'appelle le sous groupe trivial de  $G$ .
2.  $G \subset G$  est un sous groupe
3.  $(\mathbb{Z}, +)q \in \mathbb{Z}$
4.  $q \cdot \mathbb{Z} = \{a, a = q \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$

**Preuve**

On prouve la derniere propriete

- $0 \in q\mathbb{Z}$  car  $0 = q \cdot 0$
- $qk$  et  $q \cdot k' \in q\mathbb{Z} \Rightarrow qk + qk' = q(k + k') \in q \cdot \mathbb{Z}$
- $qk \in q\mathbb{Z}$  □

**Theorème 14 (Sous groupe de  $\mathbb{Z}$ )**

Reciproquement tout sousgroupe de  $\mathbb{Z}$  est de la forme  $q \cdot \mathbb{Z}$ .

**Preuve**

Soit  $H \subset \mathbb{Z}$  un sous groupe

- si  $h = \{0\}$ ,  $H = 0 \cdot \mathbb{Z}$ .
- si  $H \neq \{0\}$  soit  $q \in H \neq 0$

Alors, sans perte de generalite, on peut supposer que  $q > 0$  ( si  $q < 0$  on remplace  $q$  par  $-q \in H$  )

Sans perte de generalite on peut supposer que  $q$  est le plus petit el strictement positif contenu dans  $H$

$$q = q_{min} = \min(h \in H, h > 0)$$

On va montrer que  $H = q\mathbb{Z}$ .

Soit  $h \in H$  par division euclidienne il existe  $k \in \mathbb{Z}$  et  $r \in \{0, \dots, q-1\}$  tq

$$\begin{aligned} h &= qk + r \\ r &= h - qk \in H \end{aligned}$$
□

Donc  $0 \geq r < q \Rightarrow r = 0$  par def de  $q$ .

Donc  $h = q \cdot k \in q\mathbb{Z}$ .

**3.1 Groupe engendre par un ensemble**

**Proposition 15 (Intersection de sous-groupes)**

Soit  $G$  un groupe et  $H_1, H_2 \subset G$  deux sous groupes alors  $H_1 \cap H_2$  est un sous groupe. Plus généralement l'intersection de sous groupes est un sous-groupe.

**Preuve**

Cas  $H_1 \cap H_2$ . On veut montrer que c'est un sous groupe. On utilise la deuxième version du critère de la proposition 11.

$$\forall h, h' \in H_1 \cap H_2 \Rightarrow h \star h'^{-1} \in H_1 \cap H_2$$

Comme  $h, h' \in H_1$   $h \star h'^{-1} \in H_1$  et  $h, h' \in H_2$   $h \star h'^{-1} \in H_2$

Donc  $h \star h'^{-1} \in H_1 \cap H_2$

$\Rightarrow H_1 \cap H_2$  est un sous-groupe □

**Definition 14 (Sous-groupe engendre)**

$G$  un groupe et  $A \subset G$  un sous-ensemble de  $G$ .

Le sous-groupe engendré par  $A$ , noté  $\langle A \rangle \subset G$  est par définition le plus petit sous groupe de  $G$  contenant  $A$ .

Soit

$$G_A = \{H \subset G, H \text{ est un sous groupe et } A \subset H\}$$

$G_A$  est non-vidé car il contient  $G$ .

Par la proposition précédente, on considère

$$\langle A \rangle := \bigcap_{H \in G_A} H$$

Par la proposition cette intersection est un sous groupe qui contient  $A$  et c'est le plus petit possible au sens où si  $H \subset G$  est un sous groupe contenant  $A$  alors

$$\langle A \rangle = \bigcap_{H \in G_A} H \subset H'$$

**Exemple**

Si  $g \in G$   $\langle \{g\} \rangle = g^{\mathbb{Z}} = \{g^n, n \in \mathbb{Z}\}$

**Lecture 4: Groupes et Anneaux**

Mon 28 Sep

**Theorème 17**

Soit  $A \subset G$  un ensemble, si  $A = \emptyset$  alors  $\langle A \rangle = \{e_G\}$ , sinon on pose

$$A^{-1} = \{g^{-1}, g \in A\} \subset G$$

l'image de  $A$  par l'inversion alors

$$\langle A \rangle = \{g_1 \star \dots \star g_n, g_i \in A \cup A^{-1}\}$$

En d'autres termes,  $\langle A \rangle$  est l'ensemble des elements de  $G$  qu'on peut former en multipliant ensemble des elements de  $A$  et de son invers  $A^{-1}$  de toutes les manieres possibles.

### Preuve

Pour montrer que c'est  $\langle A \rangle$ , on procede par double inclusion.

$\supset$  : soit  $H \subset G$  un ssgpe tq

$$A \subset H \subset G$$

Alors comme  $H$  est stable par  $\bullet^{-1}$

$$A^{-1} \subset H^{-1} = H$$

Donc,  $A \cup A^{-1} \subset H$  comme  $H$  est stable par  $\star$ , si  $g_1, \dots, g_n \in A \cup A^{-1}$  Le produit  $g_1 \star g_2 \star \dots \star g_n \in H$

Donc  $\{g_1 \star g_2 \star \dots \star g_n, g_i \in A \cup A^{-1}\} \subset H$  et donc  $\{g_1 \star g_2 \star \dots \star g_n, g_i \in A \cup A^{-1}\} \subset \bigcap_{A \subset H} H \subset \langle A \rangle$

$\subset$  : il suffit de mq  $\{\dots\}$  et un sous groupe de  $G$ . En effet,  $\{g_1 \star \dots \star g_n, n \geq 1, g_i \in A \cup A^{-1}\} \supset A$

Critere de ss-groupe :

a) Soit  $g \in A \Rightarrow g^{-1} \in A^{-1}, g \star g^{-1} = e_G \in \{g_1 \star \dots \star g_n, \dots\}$

b) Soit  $g = g_1 \star g_2 \star \dots \star g_n$  et  $g' = g'_1 \star g'_2 \star \dots \star g'_n$

$$n, n' \geq 1, g_i, g'_j \in A \cup A^{-1}$$

Alors

$$g \star g' = g_1 \star \dots \star g_n \star g'_1 \star \dots \star g'_n \in \{\dots\}$$

c) soit  $g = g_1 \star \dots \star g_n$  comme ci-dessus

$$g^{-1} = g_n^{-1} \star g_{n-1}^{-1} \star \dots \star g_1^{-1} \in \{\dots\}$$

$\{\dots\}$  est un sousgroupe de  $G$  contenant  $A$  donc il contient  $\langle A \rangle$ . □

## 3.2 Morphismes de Groupes

### Definition 15 (Morphisme de Groupe)

Soient  $(G, \star)$  et  $(H, \bullet)$  deux groupes, un morphisme de groupes  $\phi : G \rightarrow H$  est une application telle que

$$\forall g, g' \in G, \phi(g \star g') = \phi(g) \bullet \phi(g')$$

### Theorème 18

Soit  $\phi : G \rightarrow H$  un morphisme de groupes alors

1.  $\phi(e_G) = e_H$
2.  $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$

$$3. \forall g, g' \in G, \phi(g \star g') = \phi(g) \bullet \phi(g')$$

### Preuve

Il suffit de demontrer 1 et 2, 3 est vrai par definition.

1)

Soit  $g \in G, \phi(g) = \phi(g \star e_G) = \phi(g) \bullet \phi(e_G)$ .

Donc  $\phi(g) = \phi(g) \star \phi(e_G)$  et donc

$$\begin{aligned} h &= h \bullet \phi(e_G) \\ h^{-1} \bullet h &= h^{-1} \bullet h \bullet \phi(e_G) \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} \phi(g) \bullet \phi(g)^{-1} &= e_H \\ \phi(g) \bullet \phi(g^{-1}) &= \phi(g \star g^{-1}) \\ &= \phi(e_G) = e_H \end{aligned}$$

On conclut en utilisant l'unicite de l'inverse

$$\phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1} \quad \square$$

### Definition 16 (Notations)

- $\text{Hom}_{Gr}(G, H)$  l'ensemble des morphismes de groupe entre  $G$  et  $H$ .
- $\text{End}_{Gr}(G) = \text{Hom}_{Gr}(G, G)$  les endomorphismes du groupe  $G$ .
- $\text{Isom}_{Gr}(G, H)$  l'ensemble des morphismes bijectifs
- $\text{Aut}_{Gr}(G) = \text{Isom}_{Gr}(G, G)$  l'ensembles des automorphismes du groupe  $G$ .

### Exemple

—

$$e_H : \begin{cases} G \rightarrow H \\ g \rightarrow e_h \end{cases}$$

— Soit  $g \in G$

$$\exp_G : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow G \\ n \rightarrow g^n \end{cases}$$

Si  $G$  est commutatif note additivement

$$\bullet \cdot g : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow G \\ n \rightarrow n \cdot g \end{cases}$$

Conjugaison dans un groupe :  $(G, \cdot)$

$$h \in G$$

$$Ad_h : \begin{cases} G \rightarrow G \\ g \rightarrow h.g.h^{-1} \end{cases}$$

**Preuve**

On veut montrer que  $\forall g, g' \in G$

$$Ad_h(g.g') = Ad_h(g).Ad_h(g')$$

$$\begin{aligned} Ad_h(g).Ad_h(g') &= (h.g.h^{-1}).(h.g'.h^{-1}) \\ &= h.g.h^{-1}.h.g'.h^{-1} \\ &= h.g.e_G.g'.h^{-1} &= h.g.g'.h^{-1} = Ad_h(g.g') \end{aligned}$$

Terminologie :

$$Ad_h(g) = h.g.h^{-1} \quad \square$$

Le conjugué de  $g$  par  $g$ .

**Remarque**

$Ad_h : G \rightarrow G$  est bijectif.  $Ad_h$  admet une application réciproque qui est  $Ad_h^{-1}$

**Preuve**

$$Ad_{h^{-1}} \circ Ad_h = Id_G$$

$$Ad_h \circ Ad_{h^{-1}} = Id_G$$

Il suffit de montrer le premier.

$$\begin{aligned} Ad_{h^{-1}} \circ Ad_h(g) &= h^{-1}.(h.g.h^{-1}).h \\ &= h^{-1}.h.g.h^{-1}.h \\ &= g = Id_G(g) \end{aligned}$$

$$\text{car } (h^{-1})^{-1} = h \quad \square$$

$$\forall h \in G,$$

$$Ad_h \in Aut_{Gr}(G)$$

**Proposition 21**

Soient  $(G, \star), (H, *), (K, \bullet)$  des groupes et  $\phi : G \rightarrow H$  et  $\psi : H \rightarrow K$  des morphismes de groupes alors la composée  $\psi \circ \phi : G \rightarrow K$  est un morphisme de groupes

---

**Preuve**

On veut montrer que

$$\psi \circ \phi(g \star g') = ? \psi \circ \phi(g) \bullet \psi \circ \phi(g')$$

on a :

$$\begin{aligned}\psi \circ \phi(g \star g') &= \psi(\phi(g \star g')) \\ &= \psi(\phi(g) * \phi(g')) \\ &= \psi(\phi(g)) \bullet \psi(\phi(g'))\end{aligned}\quad \square$$

**Proposition 22**

Soit  $\phi : G \rightarrow H$  un morphisme de groupe bijectif alors l'application reciproque  $\phi^{-1}$  est un morphisme bijectif.

**Preuve**

Soit  $\phi : G \rightarrow H$  un morphisme de groupe bijectif ( en tant qu'application), on veut montrer que  $\phi^{-1} : H \rightarrow G$  verifie

$$\phi^{-1}(h \star h') = ? \phi^{-1}(h) * \phi^{-1}(h'), \forall h, h' \in H$$

On calcule

$$\begin{aligned}\phi(\phi^{-1}(h) * \phi^{-1}(h')) &= \phi(\phi^{-1}(h)) \star \phi(\phi^{-1}(h')) \\ &= h \star h' \\ \Rightarrow \phi^{-1}(h) * \phi^{-1}(h') &\end{aligned}\quad \square$$

est un antecedent de  $h \star h'$  mais le seul antecedent de  $h \star h'$  c'est  $\phi^{-1}(h \star h')$   
 $\Rightarrow \phi^{-1}(h) * \phi^{-1}(h') = \phi^{-1}(h \star h')$

**Definition 17 (Groupes Isomorphes)**

Soient  $G$  et  $H$  deux groupes si

$$Isom_{gr}(G, H) \neq \emptyset$$

On dit que  $G$  et  $H$  sont isomorphes ( comme groupes)

$$G \simeq_{Gr} H$$

et si  $Isom_{gr}(G, H) \neq \emptyset$  alors  $Isom_{Gr}(H, G) \neq \emptyset, H \simeq_{Gr} G$

La relation “etre isomorphe” dans la categorie des groupes est une relation d'equivalence :

- $G \simeq_{Gr} G$  (  $Isom_{Gr}(G, G) \ni Id_G$  )
- Si  $G \simeq_{Gr} H \Rightarrow H \simeq_{Gr} G$

— Si  $G \simeq_{Gr} H$  et  $H \simeq_{Gr} K \Rightarrow G \simeq_{Gr} K$

### Exemple

Le groupe des automorphismes d'un groupe

$$Aut_{Gr}(G) = Isom_{Gr}(G, G) \subset Bij(G)$$

### Theorème 24

$Aut_{Gr}(G)$  est un sous-groupe de  $(Bij(G), \circ, Id_G, \bullet^{-1})$

### Preuve

Si  $\phi$  et  $\psi \in Isom_{Gr}(G, G)$ , alors  $\psi \circ \phi$  est un morphisme et  $\psi \circ \phi$  est bijectif

$\Rightarrow \psi \circ \phi \in Isom_{Gr}(G, G)$

Si  $\phi \in Isom_{Gr}(G, G) \cup Bij(G, G)$  alors  $\phi^{-1}$  est un morphisme donc

$$Isom_{Gr}(G, G) = Aut_{Gr}(G) \quad \square$$

## Lecture 5: Noyau et Image

Tue 29 Sep

### 4 Noyau et Image

#### Proposition 25

Soit  $\phi \in Hom_{Gr}(G, H)$  un morphisme de groupes.

— Soit  $K \subset G$  un sous groupe alors  $\phi(K) \subset H$  est un sous-groupe. En particulier l'image de  $\phi$ ,

$$Im(\phi) = \phi(G)$$

— Soit  $L \subset H$  un sous-groupe de  $H$ , alors l'image inverse

$$\phi^{-1}(L) = \{g \in G, \phi(g) \in L\} \subset G$$

est un sous-groupe de  $G$ . En particulier,  $\phi^{-1}(\{e_H\})$  est un sous-groupe

### Preuve

Soit  $K \subset G$  un sous-groupe.

Soit

$$h, h' \in \phi(K)$$

On veut montrer que  $h \star h'^{-1} \in \phi(K)$ .

Il existe  $k, k' \in K$  tel que  $\phi(k) = h, \phi(k') = h'$

$$\begin{aligned} h \star h'^{-1} &= \phi(k) \star \phi(k')^{-1} \\ &= \phi(k) \star \phi(k'^{-1}) \end{aligned}$$

$$= \phi(k * k'^{-1}), \quad k * k'^{-1} \in K$$

car  $K$  sous-groupe.

$$h * h'^{-1} \in \phi(K)$$

Soit  $L \subset H$  un sous-groupe, on veut montrer que

$$\phi^{-1}(L) \subset G$$

est un sous-groupe Soient  $g, g' \in \phi^{-1}(L)$ , alors  $\phi(g) = h \in L, \phi(g') = h' \in L$

$$g * g'^{-1} \in \phi^{-1}(L)?$$

on a

$$\begin{aligned} \phi(g * g'^{-1}) &= \phi(g) * \phi(g')^{-1} \\ &= h * h'^{-1} \in L \text{ car } L \text{ sous-groupe} \end{aligned} \quad \square$$

### Definition 18

Le sous-groupe  $\phi^{-1}(\{e_H\})$  s'appelle le noyau de  $\phi$  et est noté

$$\ker(\phi) = \phi^{-1}(\{e_H\}) = \{g \in G, \phi(g) = e_H\}$$

L'importance du noyau vient du fait qu'il permet de tester facilement si un morphisme est injectif.

### Theorème 26 (Critere d'injectivite)

Soit  $\phi \in \text{Hom}_{Gr}(G, H)$  un morphisme de groupes alors les proprietes suivantes sont equivalentes

- $\phi$  est injectif
- $\ker(\phi) = \{e_G\}$

### Preuve

1  $\rightarrow$  2

si  $\phi$  est injectif, l'image reciproque de  $\{e_H\}$  possede au plus un seul element.

Mais comme  $\phi$  est un morphisme  $\phi(e_G) = e_H \Rightarrow \phi^{-1}(\{e_H\}) = \{e_G\}$

2  $\rightarrow$  1

On se donne  $h \in H$  et on veut montrer que  $\phi^{-1}(\{h\}) = \{g \in G, \phi(g) = h\}$  n'a pas plus d'un element.

Si  $\phi^{-1}(\{h\}) = \emptyset$  OK

Si  $\phi^{-1}(\{h\}) \neq \emptyset$ , soient  $g, g' \in \phi^{-1}(\{h\})$  on veut montrer que  $g = g'$ .

Par definition,  $\phi(g) = \phi(g') = h$

$$\phi(g) * \phi(g')^{-1} = e_H$$



$$= \phi(g * g'^{-1}) \text{ car } \phi \text{ morphisme}$$

Donc,  $g * g'^{-1} \in \ker(\phi) = \{e_G\}$ ,

$$\Rightarrow g * g'^{-1} = e_G \Rightarrow g = g' \quad \square$$

### Exemple

Ordre d'un element

Soit  $g \in G$  groupe

$$\exp_g : \mathbb{Z} \rightarrow G, n \in (\mathbb{Z}, +) \rightarrow g^n \in G$$

est un morphisme de groupes.

$$\ker(\exp_g) \subset \mathbb{Z}q, q \in \mathbb{Z}$$

Si  $q = 0$ ,  $\ker(\exp_g) = \{0\}$

$$\Rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow G$$

$n \rightarrow g^n$  est injective

$\mathbb{Z}$  est isomorphe à  $g^{\mathbb{Z}}$  ( $\mathbb{Z} \simeq g^{\mathbb{Z}}$ )

$$G \supset g^{\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}$$

donc  $g$  est d'ordre infini.

Si  $q > 0$ , alors

$$g^{\mathbb{Z}} = \{g^0 = e_G, g, g^2, \dots, g^{q-1}\}$$

est un sous-groupe de cardinal  $q$  (à démontrer en exercice) et donc  $G$  contient un sous-groupe d'ordre  $q$

$$q := \text{ordre de } g = \text{ord}(g)$$

$q$  est le plus petit entier  $> 0$  tel que

$$g^q = e_G$$

### Exemple (Conjugaison)

$G \ni h$

$$\text{Ad}_h : g \rightarrow h.g.h^{-1}$$

On a montré que  $\text{Ad}_h \in \text{Aut}_{\text{Gr}}(G)$

On considère l'application

$$h \in G \rightarrow \text{Ad}_h \in \text{Aut}_{\text{Gr}}(G)$$

Cette application est un morphisme de groupes :

On doit verifier que :  $\forall h, h' \in G$

$$Ad_{h.h'} = Ad_h \circ Ad_{h'}$$

On veut montrer que pour tout  $g \in G$

$$Ad_{h.h'} = Ad_h(Ad_{h'}(g))$$

$$\begin{aligned} h.h'.g.(h.h')^{-1} &= h.h'.g.h'^{-1}.h^{-1} \\ &= h.(h'.g.h'^{-1}).h^{-1} \\ &= Ad_h(Ad_{h'}(g)) \\ \ker(Ad) &= \{h \in G | Ad_h = Id_G\} \\ &= \{h \in G | \forall g \in G Ad_h(g) = g\} \\ &= \{h \in G | \forall g \in G, h.g.h^{-1} = g\} \\ h.g.h^{-1} = g &\iff h.g = g.h \end{aligned}$$

On dit que  $h$  commute avec  $g$ .

$$\begin{aligned} \ker(Ad) &= \{ \text{l'ensemble des } h \text{ dans } G \text{ qui commutent avec tous les elements de } G \} \\ &= \text{Centre de } G \\ &= Z(G) = Z_G \end{aligned}$$

$Z_G$  est un groupe commutatif de  $G$

### Exemple (Translation)

Soit  $h \in G$  la translation a gauche par  $h$

$$t_h : \begin{cases} G \rightarrow G \\ g \rightarrow h.g \end{cases}$$

Attention  $t_h$  n'est pas un morphisme de groupes, car l'element neutre ne va pas sur lui meme ( sauf si  $h = e_G, t_h = t_{e_G} = Id_G$  )

Par contre  $t_h$  est bijective de reciproque  $t_{h^{-1}}$

$t_\bullet : h \in G \rightarrow t_h \in \text{Bij}(G)$  est un morphisme de groupe injectif, l'image s'appelle le groupe des translations ( a gauche ) de  $G$ .

Donc  $G \simeq t_G \subset \text{Bij}(G)$

Tout groupe  $G$  abstrait peut s'identifier ( est isomorphe ) a un sous-groupe d'un groupe de bijections d'un ensemble.

## 5 Anneaux

### Definition 19 (Anneaux)

Un anneau  $(A, +, \cdot, 1_A)$  est la donnée, d'un groupe commutatif  $(A, +)$  (note additivement) d'élément neutre noté  $0_A$ , d'une loi de composition interne (dite de multiplication)

$$\bullet \bullet \begin{cases} A \times A \rightarrow A \\ (a, b) \rightarrow a.b \end{cases}$$

et d'un élément unité  $1_A \in A$  ayant les propriétés suivantes

1. Associativité de la multiplication

$$\forall a, b, c \in A, (a.b).c = a.(b.c) = a.b.c$$

2. Distributivité

$$\forall a, b, c \in A (a + b).c = a.c + b.c, c.(a + b) = c.a + c.b$$

3. Neutralité de l'unité

$$\forall a \in A, a.1_A = 1_A.a = a$$

Un anneau est dit commutatif si de plus la multiplication est commutative

$$\forall a, b \in A, a.b = b.a$$

### Lemme 30

Pour tout  $a, b \in A$ , on a

$$0_A.a = a.0_A = 0_A$$

On dit que l'élément neutre de l'addition  $0_A$  est absorbant. Pour l'opposé, on a

$$(-a).b = -(a.b) = a.(-b)$$

### Preuve

$\forall a \in A$

$$a = a.1_A = a.(1_A + 0_A)$$

$$= a.1_A + a.0_A$$

$$0_A = a.0_A$$

□

### Exemple

— L'anneau nul :  $\{0\}$

- $\mathbb{Z}, (\mathbb{Q}, +, \bullet), (\mathbb{R}, +, \bullet)$
- $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$  des fonctions d'un ensemble  $X$  a valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

$$+ : f + g : x \in X \rightarrow f(x) + g(x) = (f + g)(x)$$

$$0_{\mathcal{F}(X, \mathbb{R})} : x \rightarrow 0 \in \mathbb{R}$$

$$1_{\mathcal{F}(X, \mathbb{R})} : x \rightarrow 1 \in \mathbb{R}$$

$(\mathcal{F}(X, A), +, \bullet)$  est un anneau (commutatif si  $A$  commutatif) generalisation du cas des fonctions reelles

- $\mathbb{R}[x] = \{P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d, a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{R}, d \geq 0\}$
- $A[x] = \{P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d, a_0, \dots, a_d \in A, d \geq 0\}$   
Anneau des polynomes a coefficients dans  $A$ .
- $(M, +)$  un groupe commutatif

$$\text{End}(M) = \text{End}_{Gr}(M) = \text{Hom}_{Gr}(M, M)$$

$$+ : \psi, \phi \in \text{End}(M)$$

$$\phi + \psi : m \rightarrow \phi(m) + \psi(m)$$

Soient  $\phi, \psi \in \text{End}(M)$

$$\phi \circ \psi \in \text{End}(M)$$

$$0_{\text{End}(M)} : m \in M \rightarrow 0_M \in M$$

$$1_{\text{End}(M)} : Id_M : m \in M \rightarrow m \in M$$

$(\text{End}(M), +, \circ, 0_M, Id_M)$  est un anneau

## Lecture 6: Anneaux 2

Mon 05 Oct