

Série 7

David Wiedemann

9 novembre 2020

1

Supposons que $(m, n) = 1$.

On utilise la propriété du produit universelle pour construire un morphisme entre $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
Soit l'application α définie par

$$\alpha : k \in \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \mapsto [k]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

De même on définit l'application β par

$$\beta : k \in \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \mapsto [k]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

où $[\cdot]_m$ est la classe de congruence modulo m d'un élément.

Vérifions que ces applications sont des morphismes.

On vérifie facilement que α et β sont des morphismes, en effet

$$\alpha(0) = 0$$

car 0 est congru à 0 modulo n .

Soit $a, b \in \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$, alors

$$\alpha(a + b) = [a + b]_n = [a]_n + [b]_n = \alpha(a) + \alpha(b)$$

où la dernière égalité suit directement de la définition de classe d'équivalence modulo n .

On vérifie de la même manière que β est un morphisme.

Par la propriété du produit universel, il existe donc un morphisme ϕ de $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

De plus, on sait que $\text{pr}_n \circ \phi = \alpha$ et $\text{pr}_m \circ \phi = \beta$ où pr_n est la projection sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et pr_m la projection sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Vérifions que ϕ est un isomorphisme.

Car

$$|\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}|$$

Il suffit, par l'exercice 1 de la série 5, de vérifier que ϕ est injective.

Soit $k \in \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ et supposons que $\phi(k) = (0, 0)$ et montrons que ceci implique $k = 0$.

Si $\phi(k) = (0, 0)$, alors $\alpha(k) = 0$ et $\beta(k) = 0$. Donc $[k]_n = 0$ et $[k]_m = 0$, donc k est un multiple de n et de m . Car n et m sont premiers entre eux¹, ceci implique qu'il existe a tel que $k = anm$, donc $[k]_{nm} = 0$.

Donc l'application ϕ est injective et donc bijective.

Supposons maintenant que $(n, m) \neq 1$.

Supposons par l'absurde qu'il existe un isomorphisme ϕ entre $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. On sait que les isomorphismes préservent les ordres des éléments, on a donc en particulier

$$o(1) = nm.$$

Ce qui implique

$$o(\phi(1)) = nm$$

Or, posons que $(n, m) = a$, alors $a|nm$ et donc $\frac{nm}{a}$ est un entier.

Car $\frac{nm}{a}$ est un multiple de n , on trouve que pour tout $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\frac{nm}{a} \cdot [k]_n = [0]$$

Cette égalité suit du fait que $\frac{nm}{a}$ contient tous les facteurs premiers de n et est donc un multiple de n .

Par le même argument, $\forall k \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

$$\frac{nm}{a} \cdot [k]_m = [0]$$

Donc l'ordre de $\phi(1)$ est borné par $\frac{nm}{a}$ ce qui est une contradiction au fait que ϕ est un isomorphisme.

Donc, il ne peut pas y avoir d'isomorphismes si $(n, m) \neq 1$.

2

Théorème 1. Soit A un groupe, et $B \simeq C$ deux groupes isomorphes, alors

$$A \times B \simeq A \times C$$

Démonstration. On sait qu'il existe un isomorphisme ϕ entre B et C , on peut donc construire un isomorphisme ainsi

$$\begin{aligned} A \times B &\mapsto A \times C \\ (a, b) &\mapsto (a, \phi(b)) \end{aligned}$$

1. Si n et m sont premiers entre eux, ils ne partagent aucun facteur premier, d'où l'égalité $k = anm$

La vérification que cette application est un isomorphisme est immédiate car ϕ est un isomorphisme. \square

On procède par récurrence sur r .

On sait que le cas $r = 2$ est vrai par la partie 1. (Le cas $r = 1$ est trivialement vrai)

Supposons donc vrai pour r et montrons pour $r + 1$.

On sait que $(n_r, n_i) = 1$ et $(n_{r+1}, n_i) = 1$ pour tout $0 < i < r$. On en déduit que $(n_r \cdot n_{r+1}, n_i) = 1$. Ceci suit directement de la décomposition en nombre premiers, en effet n_{r+1} et n_r ne partagent pas de facteurs avec les n_i et donc $n_r \cdot n_{r+1}$ non plus.

En posant donc que $n_r \cdot n_{r+1} = p$, on trouve

$$\mathbb{Z}/(n_1 \dots n_{r+1})\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/(n_1 \dots n_{r-1}p)\mathbb{Z} \simeq \prod_{i=1}^{r-1} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \quad (1)$$

$$\simeq \prod_{i=1}^{r-1} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_r n_{r+1}\mathbb{Z} \quad (2)$$

$$\simeq \prod_{i=1}^{r-1} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_{r+1}\mathbb{Z} \quad (3)$$

$$\simeq \prod_{i=1}^{r+1} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \quad (4)$$

où l'égalité (1) suit de l'hypothèse de récurrence, et l'égalité (3) suit du théorème 1.

La forme de l'isomorphisme ci-dessus est donné par la généralisation de l'isomorphisme donné en 1 à plusieurs entiers, c'est à dire

$$\Phi : k \in \mathbb{Z}/(n_1 \dots n_r)\mathbb{Z} \mapsto ([k]_{n_1}, \dots, [k]_{n_r})$$

La vérification que Φ est un isomorphisme se fait comme dans la partie 1. En effet, il est clair que

$$\Phi(k + j) = ([k + j]_{n_1}, \dots) = ([k]_{n_1} + [j]_{n_1}, \dots) = \Phi(k) + \Phi(j)$$

Et on vérifie également que

$$\Phi(0) = ([0]_{n_1}, \dots) = 0$$

Finalement, par le même argument que dans la partie 1, il suffit de vérifier que $\ker \Phi = \{0\}$.

Soit $k \in \mathbb{Z}/(n_1 \dots n_r)\mathbb{Z}$ et supposons que $\Phi(k) = 0$.

Car les n_i sont tous premiers entre eux, ceci entraîne que k est multiple de tous les n_i et donc que $k = 0$.

Donc l'application Φ est un isomorphisme.