

Série 1, Exercice 6

David Wiedemann

21 septembre 2020

• Clairement le numérateur est un entier positif, il suffit donc de montrer qu'il est pair.
On distingue donc les cas.

— Supposons m pair et n pair, alors :

$$m = 2i \text{ et } n = 2k$$

Donc

$$\begin{aligned}(m+n)^2 + m + 3n &= (2i+2k)^2 + 2i + 6k \\ &= 2(2(i+k))^2 + i + 3k\end{aligned}$$

Donc le numérateur est pair.

— Supposons m pair et n impair, alors

$$m = 2i \text{ et } n = 2k + 1$$

Donc

$$\begin{aligned}(m+n)^2 + m + 3n &= (2i+2k+1)^2 + 2i + 6k + 3 \\ &= (2i+2k)^2 + 2(2i+2k) + 1 + 2i + 6k + 3 \\ &= (2i+2k)^2 + 2(2i+2k) + 2i + 6k + 4 \\ &= 2(2(i+k))^2 + (2i+2k) + i + 3k + 2\end{aligned}$$

Donc le numérateur est pair.

— Supposons m impair et n pair, alors

$$m = 2i + 1 \text{ et } n = 2k$$

Donc

$$\begin{aligned}
(m+n)^2 + m + 3n &= (2i+2k+1)^2 + 2i+6k+1 \\
&= (2i+2k)^2 + 2(2i+2k) + 1 + 2i+6k+1 \\
&= (2i+2k)^2 + 2(2i+2k) + 2i+6k+2 \\
&= 2(2(i+k))^2 + (2i+2k) + i+3k+1
\end{aligned}$$

— Finalement, supposons m impair et n impair

$$m = 2i + 1 \text{ et } n = 2k + 1$$

Donc

$$\begin{aligned}
(m+n)^2 + m + 3n &= (2i+2k+2)^2 + 2i+6k+4 \\
&= 2(2(i+k+1)) + i+3k+2
\end{aligned}$$

- Par la définition de D_k , $(m, n) \in D_k$ implique que $(k-n, n) \in D_k$ et $0 \leq n \leq k$.

Supposons donc $(m, n) \in D_k$, on a :

$$\begin{aligned}
C(m, n) &= C(k-n, n) = \frac{1}{2} \cdot ((k-n+n)^2 + k-n+3n) \\
&= \frac{1}{2} \cdot (k^2 + k + 2n) \\
&= \frac{k^2 + k}{2} + n
\end{aligned}$$

Donc si $n = 0$, $C(m, n) = \frac{k^2+k}{2}$ et si $n = k$, $C(m, n) = \frac{k^2+k}{2} + k$, donc les valeurs de $C(m, n)$ sont comprises entre $\frac{k^2+k}{2}$ et $\frac{k^2+k}{2} + k$.

- On est maintenant prêt à montrer la bijectivité de $C : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Pour ceci, on va procéder par étapes :

1. Montrer que $C : D_k \rightarrow \{\frac{k^2+k}{2}, \dots, \frac{k^2+k}{2} + k\}$ est bijective.
2. Montrer que $D_i \cap D_k = \emptyset$, si $i \neq k$.
3. Montrer que $\bigcup_{i=0}^{+\infty} D_i = \mathbb{N}^2$.
4. Montrer la bijectivité de $C : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

Pour le point 1.

Trouver un inverse pour $C : D_k \rightarrow \{\frac{k^2+k}{2}, \dots, \frac{k^2+k}{2} + k\}$ est facile, soit

$a \in \left\{ \frac{k^2+k}{2}, \dots, \frac{k^2+k}{2} + k \right\}$, alors

$$C^{-1} : \left\{ \frac{k^2+k}{2}, \dots, \frac{k^2+k}{2} + k \right\} \rightarrow D_k$$

$$a \rightarrow \left(a - \frac{1}{2}(k^2+k), k + \frac{1}{2}(k^2+k) - a \right)$$

Clairement, cette application est bijective car k est constante.

Pour le point 2.

Par l'absurde, supposons que $\exists(m, n) \in D_k$ et $(m, n) \in D_i$.

Donc $m+n = i$ et $m+n = k$, donc $i = k$, ce qui est une contradiction à l'hypothèse.

Pour le point 3.

On montre la double inclusion.

L'inclusion de gauche à droite est triviale.

Supposons donc $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. On pose $m+n = i, i \in \mathbb{N}$, donc $m = i - n$.

$$(m, n) = (i - n, n) \in D_i$$

On en déduit $\bigcup_{i=0}^{+\infty} D_i = \mathbb{N}^2$