## DAVID WIEDEMANN

# ALGEBRE LINEAIRE I

## **T**able des matières

1	Le language des Ensembles 4
	1.1 Notations 4
	1.2 Ensembles 5
	1.2.1 Exemples 5
	1.3 Sous-Ensembles 5
	1.4 $P(E)$ l'ensemble des sous-ensembles 5
	1.4.1 Exercice 6
	1.5 Operations sur les ensembles 6
	1.6 × : Produit cartesien 6
	1.7 Applications entre ensembles 6
	1.7.1 Graphe 7
	1.8 Composition/Associativite 7
	1.8.1 Associativite 7
	1.9 Image,Preimage 8
	1.10 Relation de composition par les applications reciproques
2	Groupes 13



2.1 Le groupe Symmetrique

1	■Theorem (Composition de fonctions)	8
		8
1	■ Definition (Injectivite)	9
2	■ Definition (Surjectivite)	9
3	■ Definition (Bijectivite)	9
2	♦ Proposition (Injectivite et cardinalite)	10
3	♦ Proposition (Surjectivite et cardinalite)	10
4	♦ Proposition (injectivite et condition)	10
5	♦ Proposition (Surjectivite et condition)	10
7	♣ Lemme (Composition d'applications surjectives et in-	
	jectives)	11
		11
8	♦ Proposition (Inverse d'une composition)	12
		12
4	■ Definition (Notations Injection)	13
5	■ Definition (Notations Surjection)	13
6	■ Definition (Notations Bijection)	13
7	■ Definition (Groupe abstrait)	14
8	■ Definition (Groupes commutatifs)	15

## 1 De language des Ensembles

Le terme "Algebre" est derive du mot arabe al-jabr tire du tire d'un ouvrage.

Al-jabr signifie restoration.

Par exemple : 2x - 4 = 0 Ce qu'on veut c'est trouver x. Il faut donc transformer cette egalite en effectuant des operations de part et d'autres de l egalite.

$$2x = 4$$
 | +4  
 $x = \frac{4}{2} = 2$  | :2

Le but de l'ouvrage etait de resoudre des soucis administratifs, comment partager des champs etc.

Le but c'est d'introduire les espaces vectoriels a partir de o.

Il y aura besoin d'introduire des groupes, anneaux, corps (anneaux particuliers), modules et des ensembles.

Il faut donc commencer avec les objets les plus simples, i.e. les groupes.

Ici, on introduit de maniere moins rigoureuse qu'avec les systemes algebriques.

#### 1.1 Notations

- "Il existe" ∃, "Il existe un unique" ∃!
- "Quel que soit", "Pour tout",  $\forall$
- "Implique",  $\Rightarrow$
- "est equivalent"  $\iff$  , ou "ssi"
- "sans perte de generalite" "spdg", "wlog"
- "on peut supposer" "ops, wma"
- "tel que" t.q. ou |

On ne va pas parler de logique mathematique dans ce cours, ni de definition rigoureuse des ensembles

#### 1.2 Ensembles

Un ensemble est une collection d'elements "appartenant" a E

$$e \underset{\text{"appartient à"}}{\underbrace{\in}} E$$

#### Exemples

- Ø ne contient aucun element
- $-\mathbb{N} = \{0,1,2\}$
- $\mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \middle| p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$
- $\mathbb{R}$ , nombres réels, nombres complexes.

#### 1.3 Sous-Ensembles

Un sous-ensemble A d'un ensemble E est un ensemble t.q. tout element de A appartient a E. Formellement :

$$a \in A \Rightarrow a \in E$$

$$A \underbrace{\subset}_{\text{inclut dans } E} E$$

L'ensemble vide est un sous-ensemble de E pour tout ensemble Ε.

$$\emptyset \subset E \forall E$$

Deux ensembles E et F sont egaux si ils ont les mêmes élements, ssi E est inclus dans F et F est inclus dans E ( regarder notations)

$$E \subset F \wedge F \subset E \Rightarrow E = F$$
.

## 1.4 P(E) l'ensemble des sous-ensembles

C'est l'ensemble des  $A \in E$ , aussi appelé l'ensemble des parties de E.

Remarque: L'ensemble de TOUS les ensembles n'est pas un ensemble et c'est du au paradoxe de Russell (Logicien anglais) Si c'etait le cas, on considererait

 $Ncont = \{ L'ensemble des E tq E n'est pas contenu dans lui meme. \}$ 

Cet ensemble Ncont est-il contenu dans lui meme ou pas?

#### 1.4.1 Exercice

Ncont est il contenu dans lui meme ou pas?  $\mbox{\ensuremath{\cancel{1}}}$ 

## 1.5 Operations sur les ensembles

$$-A,B\subset E$$

$$A \cup B = \{e \in E \text{ tq } e \in A \text{ ou bien } e \in B\}$$

Réunion de A et B.

$$- A \cap B = \{e \in E | e \in Ae \in B\}$$

Difference : A - B ou  $A \setminus B$ 

$$= \{ A \in A \land \notin B \}$$

Difference symmetrique:

$$A\Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

Si  $A \cap B = \emptyset$  on dit que A et B sont disjoints.  $A_1, \ldots, A_n \subset E$   $n \ge 1$ 

On peut noter une grande reunion ainsi:

$$A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = A_1 \cup (A_2 \cup \ldots \cup A_n)$$

$$= \{e \in E | \exists i \in \{1, \ldots, n\} \text{avec} e \in A_i\}$$

$$= \bigcup_{i=1}^n A_i$$

### 1.6 × : Produit cartesien

Si A et B sont des ensembles

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \land b \in B\}$$

On peut bien sur iterer

$$A_1 \times \ldots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i = \{a_1, a_2, \ldots, a_n \text{ avec } a_i \in A_i\}$$

## 1.7 Applications entre ensembles

Soient *X* et *Y* deux ensembles.

$$f: X \to Y$$

#### 1.7.1 Graphe

Se donner une application

$$f: X \to Y$$

equivaut a se donner un graphe G (graphe de f)

$$G \subset X \times Y = \{(x, y) | x \in Xy \in Y\}$$

tq pour  $x_0 \in X$  l'ensemble des elements du graphe G de la forme  $(x_0, y)$  possede exactement un element  $(x_0, y_0)$ .  $y_0 = f(x_0) =$  l'image de  $x_0$  par l'application f.

On associe simplement au premier element un autre element.

## 1.8 Composition/Associativite

Soient

$$f: X \to Y$$

$$g: Y \to Z$$

$$X$$
 $X$  $Z$ 

$$g \circ f : X \longrightarrow Z | x \in X \longrightarrow f(x) \in Y$$
  
  $\longrightarrow g(f(x)) \in Z$ 

Cette application s'appelle la composee de f et g.

FIGURE 1.1: Schema de la composition de 2 applications

#### 1.8.1 Associativite

$$f: X \longrightarrow Y$$

$$g: Y \longrightarrow Z$$

$$h: Z \longrightarrow W$$

Alors

$$(g \circ f) : X \longrightarrow Z \circ h : Z \longrightarrow W$$
  
 $\Rightarrow h \circ (g \circ f)$ 

$$f: X \longrightarrow Y \circ h \circ g: Y \longrightarrow W$$

On a que

#### ■Theorem 1 (Composition de fonctions)

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h \circ g \circ f$$

Proof

$$h \circ (g \circ f) : x \longrightarrow h((g \circ f)(x))$$

$$= h(g(f(x))) \in W$$

$$(h \circ g) \circ f : x \longrightarrow (h \circ g)(f(x))$$

$$h(g(f(x))) \in W$$

## 1.9 Image,Preimage

$$f: X \longrightarrow Y$$

A l'application f sont associes deux applications impliquant  $\mathcal{P}(X)$ ,  $\mathcal{P}(Y)$ .

$$-\operatorname{Im}(f): \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(Y)$$
$$A \subset X \longrightarrow \operatorname{Im}(f)(A) = f(A)$$

C'est ce qu'on appelle l'image de A par f

$$= \{ f(a) \in Y | a \in A \} \subset Y \in \mathcal{P}(Y)$$

L'image de 
$$f \ Im(f) := f(X) = \{ f(x) \in Y | x \in X \}$$

— Preimage de f : Preim(f) :

$$Preim(f): \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$
 
$$B \longrightarrow Preim(f)(B) = f^{-1}(B) \quad = \text{preimage de l'ensemble } B \text{ par } f.$$

$$f^{-1}(B) = \{ x \in X | f(x) \in B \}$$

**Exemples** 

$$f_1(\{1,2\}) = \{2,4\}$$

$$f_1^{-1}(\{1,2,3,4\}) = \{1,2,3,4\}$$

Lecture 2: Injectivite, Surjectivite et Bijectivite

Tue 15 Sep

**■** Definition 1 (Injectivite)

*Une application*  $f: X \mapsto Y$  *est injective* ( *injection*)  $si \forall y \in Yf^{-1}(\{y\})$  *ne possede pas plus d'un element. On note* 

$$f: X \hookrightarrow Y$$

Remarque: Une condition equivalente d'injectivite:

$$\forall x \neq x' \in X \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

#### **■** Definition 2 (Surjectivite)

Une application  $f: X \mapsto Y$  est surjective (surjection) si  $\forall y \in Yf^{-1}(\{y\})$  possede au moins un element.

On note

Soit  $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ , il existe au moins  $x \in X$  tq f(x) = y

De maniere equivalente

surjectif 
$$\iff$$
  $Im(f) = f(X) = Y$ 

Alors on a une application

"
$$f'': X \mapsto Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

Cette application est toujours surjective.

#### **■** Definition 3 (Bijectivite)

Une application  $f: X \mapsto Y$  est bijective (bijection) si elle est injective et surjective, cad si  $\forall y \in Y$ ,  $f^{-1}(\{y\})$  (l'ensemble des antecedents de y par f) possede exactement un element. On note la bijectivite par

$$f: X \simeq Y$$

Si  $f: X \simeq Y$ , alors on peut identifier les els de X avec ceux de Y:

$$x \in X \leftrightarrow f(x) \in Y$$

 $\frac{\text{Remarque}: \text{Si } f: X \hookrightarrow Y}{Y' = f(X) \text{ l'application}}$ 

$$f: X \twoheadrightarrow Y' = f(x)$$

et toujours surjective. et comme f est injective, on obtient une bijection  $f: X \simeq Y' = f(X)$  entre X et f(X).

X peut etre identifie a f(X).

- $Id_X : \underbrace{X \mapsto X}_{x \mapsto x}$  est bijective
- $-x \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$  est inj et bijective.
- $\mathcal{P} \simeq \{0,1\}^X = \mathcal{F}(X,\{0,1\})$

#### Exercice

$$C: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$$

$$(m,n) \simeq \frac{1}{2}((m+n)^2 + m + 3n)$$

Montrer la bijectivite.

Dans ce qui suit, soient X et Y des ensembles finis possedant respectivement |X| et |Y| elements et  $f:X\mapsto Y$  une application entre ces ensembles. On a les proprietes suivantes :

#### ♦ Proposition 2 (Injectivite et cardinalite)

 $Si\ f: X \hookrightarrow Y \ est \ injective \ alors \ |X| \le |Y|$ 

#### **♦** Proposition 3 (Surjectivite et cardinalite)

Si  $f : \rightarrow Y$  est surjective alors  $|X| \ge |Y|$ .

## **♦** Proposition 4 (injectivite et condition)

Si  $f: X \hookrightarrow Y$  et  $|X| \ge |Y|$  alors |Y| = |X| et f bijective.

## **♦** Proposition 5 (Surjectivite et condition)

Si  $f: X \rightarrow Y$  et  $|X| \leq |Y|$  alors |Y| = |X| et f bijective.

## **♣** Propriete 6 (Bijectivite)

Si f bijective, on peut lui associer une application reciproque :

$$f^{-1}: Y \mapsto X$$
$$y \mapsto x$$

tel que  $f^{-1}(\{y\}) = \{x\}$ , x unique.

## 1.10 Relation de composition par les applications reciproques

$$-f: X \simeq Y \text{ et } f^{-1}: Y \simeq X$$

$$f^{-1} \circ f : X \mapsto Y \mapsto X = Id_X.$$

En effet,  $\forall x \in X$  si on pose y = f(x)

on a 
$$f^{-1}(y) = x = f^{-1}(f(x)) = x$$

$$- f \circ f^{-1}: Y \mapsto X \mapsto Y$$

$$f \circ f^{-1} = Id_Y$$

$$- (f^{-1})^{-1} = f$$

$$-f: X \simeq Y \text{ et } g: Y \simeq Z$$

Alors  $g \circ f : X \mapsto Z$  est bijective et  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 

## ♣ Lemme 7 (Composition d'applications surjectives et injectives)

- 1. Si f et g sont injectives,  $g \circ f$  est injective.
- 2. Si f et g sont surjectives,  $g \circ f$  est surjective.
- 3. Si f et g sont bijectives,  $g \circ f$  est bijective et

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

#### Proof

1. 
$$g \circ f : X \mapsto Y \mapsto Z$$

 $\forall z \in Z \text{ on veut montrer que } (g \circ f)^{-1}(\{z\}) \text{ a au plus un element}$ 

$$(g \circ f)^{-1}(\{z\}) = \{x \in X | g(f(x)) = z\}$$
  
si  $g(f(x)) = z \Rightarrow f(x) \in g^{-1}(\{z\})$ 

l'ensemble  $\{x \in X | g(f(x)) = z\}$  est contenu dans  $g^{-1}(\{z\})$  et donc possede au plus 1 element. Si cet ensemble est vide on a fini  $(g \circ f)^{-1}(\{z\}) = \emptyset$ . Si  $g^{-1}(\{z\}) \neq \emptyset$  alors  $g^{-1}(\{z\}) = \{y\}$  et  $x \in (g \circ f)^{-1}(\{z\})$  verifie

$$f(x) = y \Rightarrow x \in f^{-1}(\{y\})$$

Comme  $f^{-1}$  est injective  $f^{-1}(\{y\})$  possede au plus un element.

Et donc  $g^{-1}(f^{-1}(\{z\}))$  a au plus 1 element car g est surjective

- 2. Surjectivite: Exercice
- 3. Bijectivite : si f et g sont bijectives  $g \circ f$  est bijective.

f et g sont inj  $\Rightarrow g \circ f$  inj.

f et g sont surj  $\Rightarrow g \circ f$  surj

Si f et g sont bij  $\Rightarrow g \circ f$  est injective et surjective

 $\Rightarrow$  *g*  $\circ$  *f* bijective.

## **♦** Proposition 8 (Inverse d'une composition)

*On veut montrer que*  $\forall z \in Z$ 

$$X := (g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1} \circ g^{-1}(z) \underbrace{=}_? f^{-1}(g^{-1}(z)) = x'$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = z$$
$$g \circ f(f^{-1}(g^{-1}(z))) = g(f(f^{-1}(g^{-1}(z))))$$
$$= g(f \circ f^{-1}(g^{-1}(z)))$$

Or on sait que

$$f \circ f^{-1} = g \circ g^{-1} Id_Y$$

et donc

$$g(f \circ f^{-1}(g^{-1}(z))) = g(g^{-1}(z)) = z = (g \circ f)(x)$$

On a donc montre que

$$(g \circ f)(x) = z = (g \circ f)(x')$$

 $\Rightarrow$  x et x' on la meme image par  $g \circ f$  et comme  $g \circ f$  est injective x = x'. Donc  $\forall z \in Z(g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1} \circ g^{-1}(z)$ .

L'ensemble des applications entre X et Y seran note

$$\mathcal{F}(X,Y) = HOM_{ENS}(X,Y) = Y^X$$

#### **■** Definition 4 (Notations Injection)

L'ensemble des applications injectives sera note

$$INJ_{ENS}(X,Y)$$

## **■** Definition 5 (Notations Surjection)

L'ensemble des applications surjectives sera note

$$SURJ_{ENS}(X,Y)$$

#### **E** Definition 6 (Notations Bijection)

L'ensemble des applications bijectives sera note

$$BIJ_{ENS}(X,Y) = Iso_{ENS}(X,Y)$$

 $Si\ il\ s'agit\ d'une\ bijections\ de\ X\ vers\ Y=X\ alors$ 

$$Hom_{ENS}(X, X) = END_{ENS}(X) = AUT_{ENS} = ISO_{ENS}(X)$$

On appelle cet ensemble aussi parfois l'ensemble des permutations de X.

## 2.1 Le groupe Symmetrique

Voici un exemple d'un groupe, le groupe des bijections muni de la composition.

X ensemble

$$Bij(X, X) = Bij(X)$$

Clairement  $\{Id_X\} \subset Bij(X) \Rightarrow Bij(X) \neq \emptyset$ .

Supposons  $f, g \in Bij(X)$ , alors

$$f,g\mapsto g\circ f\in Bij(X)$$

On dispose donc de cette loi de composition :

$$\circ: \begin{cases} Bij(X) \times Bij(X) & \longrightarrow Bij(X) \\ (g,f) & \longrightarrow g \circ f \end{cases}$$

o est associative :

f, g,  $h \in Bij(X)$ , alors

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h) = f \circ g \circ h$$

 $Id_X$  est neutre :  $\forall f \in Bij(X)$ 

$$f \circ Id_X = Id_X \circ f = f$$

Donc

$$x \in X(f \circ Id_X)(x) = f(Id_X(x)) = f(x)$$

Pour chaque element f on trouve une reciproque notee  $f^{-1}$  tel que

$$f^{-1} \circ f = Id_X = f \circ f^{-1}$$

Toutes ces proprietes font de

$$Bij(X) = Aut_{ENS}(X)$$

un groupe

## **■** Definition 7 (Groupe abstrait)

*Un groupe*  $(G, \star, e_G, \cdot^{-1})$  *est la donnee d'un quadruple forme* 

- d'un ensemble G non-vide
- d'une application (appellee loi de composition interne)  $\star$  tq

$$G \times G \mapsto G$$

$$(g,g') \mapsto \star(g,g') =: g \star g'$$

- d'un element  $e_G \in G$  (element neutre)
- de l'application d'inversion  $\cdot^{-1}$

$$G \mapsto G$$

$$g \mapsto g^{-1}$$

ayant les proprietes suivantes

- Associativite:  $\forall g, g', g'' \in G, (g \star g') \star g'' = g \star (g' \star g'').$
- Neutralite  $e e_G : \forall g \in G, g \star e_G = e_G \star g = g$ .
- Inversibilite :  $\forall g \in G, g^{-1} \star g = g \star g^{-1} = e_G$ .

## Quelques exemples :

- $(Bij(X), \circ, Id_X, \cdot^{-1})$  est un groupe.
- $(\mathbb{Z}, +, 0, -\cdot)$  est un groupe.
- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times, 1, \cdot^{-1})$  est un groupe.
- $-(\{1,-1\},\times,1,\cdot^{-1})$  est un groupe.

#### **■** Definition 8 (Groupes commutatifs)

*Un groupe*  $(G, \star, e_G, \cdot^{-1}$  *est dit commutatif si*  $\star$  *possede la propriete* supplementaire de commutativite :

$$\forall g, g' \in Gg \star g' = g' \star g$$

Exemple Les groupes  $(\mathbb{Z},+)$  ou  $(\mathbb{Q}\setminus\{0\},x)$  sont des groupes commutatifs.

Par contre si X possede au moins 3 elements Bij(X) n'est pas commutatif.