

A INTEGRAL DEFINIDA

SOMA DE REIMANN, DEFINIÇÃO E PROPRIEDADES

$$\int_a^b f(u) du = ?$$




Fonte: geogebra.org

Área:

INTEGRAL DEFINIDA

Consideremos agora o problema de definir a área da região plana, delimitada pelo gráfico de uma função contínua $f(x)$ e pelas retas $x = 0$ (*eixo y*), $y = 0$ (*eixo x*) e $x = 2$. A função está definida no intervalo $[0,2]$, conforme mostra a figura.





Para definir a área de uma figura plana aproximamos a figura por polígonos cujas áreas podem ser calculadas pelos métodos da geometria elementar, ou seja,




Área de um retângulo = base x altura



Assim, para determinar a área da região limitada pela curva, pelos eixos coordenados e pela reta $x = 2$, podemos dividir o intervalo $[0,2]$ em n subintervalos, isto é, fazemos uma partição do intervalo $[0,2]$, $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 2$, chamado de partição do intervalo



Podemos verificar na figura b) que os subintervalos $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ representam a base de cada retângulo, sendo $i = 1, 2, \dots, n$. Cada retângulo tem uma altura correspondente ao valor de $f(x_i)$.



Observa-se, nas figuras, que à medida que n cresce e que cada $\Delta x_i, i = 1, \dots, n$ torna-se muito pequeno, a soma das áreas retangulares aproxima-se do que intuitivamente entendemos como a área S .



Desta forma a soma das áreas dos n retângulos é dada por

$$S_n = f(x_1)\Delta x_1 + f(x_2)\Delta x_2 + f(x_3)\Delta x_3 + \dots + f(x_n)\Delta x_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i.$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i \quad \text{é chamada de } \mathbf{Soma\ de\ Riemann} \text{ da função } f(x).$$

Podemos, assim, dizer que a área da região limitada pela função $f(x)$, pelos eixos coordenados e pela reta $x = 2$, no intervalo $[0,2]$ é dada por

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \int_0^2 f(x) dx$$




onde a integral $\int_0^2 f(x) dx$ é chamada **de integral definida**

INTEGRAL DEFINIDA

DEFINIÇÃO: Seja $f(x)$ uma função contínua definida no intervalo fechado $[a, b]$, então a integral definida de $f(x)$ de a até b é dada por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N f(x_i) \Delta x_i,$$



desde que o limite exista. Se a $\int_a^b f(x) dx$ existe, dizemos que $f(x)$ é integrável em $[a, b]$.

Na integral definida, a é o limite inferior de integração e b o limite superior de integração.

PROPRIEDADES:

Se $f(x)$ e $g(x)$ são funções integráveis no intervalo fechado $[a,b]$, então:

1. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$, sendo k é um número real

2. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$

3. Se $a < c < b$ e a função $f(x)$ é integrável em $[a, c]$ e $[c, b]$, então $f(x)$ é integrável em $[a, b]$:
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

4. $\int_a^b k dx = k[b - a].$