
Sesión 1 : Estadística Básica

Daniel Fuertes Oscar Moreno Marc Torres

4 de noviembre de 2026

1. Calcular la media, la mediana, la desviación tipo, el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico y dibujar el correspondiente boxplot de la muestra de datos.

$$p = (7{,}80, 12{,}60, 15{,}96, 13{,}50, 8{,}25, 31{,}29, 16{,}46)$$



2. Justificar que la media de una muestra escogida al azar es un estimador más fiable que la media de una muestra de expertos.

Me pican los cocos

3. Suponga la variable aleatoria "tiempo que tardo en ir de mi casa al trabajo" y diferencie factores sistemáticos y factores aleatorios intervinientes en su medición

Me pican los cocos

4. Cuando podemos asegurar que el mecanismo generador de una variable aleatoria se aproxima a una distribución gaussiana.

Me pican los cocos

5. Efectúe un summary de las variables de `bcn_pisos.txt`. Detecte si en el fichero proporcionado hay registros duplicados y elimínelos.

Me pican los cocos

6. Represente gráficamente la distribución de cada variable del fichero: histograma o función de densidad para las variables continuas o diagrama de barras para las variables categóricas.

me

7. Identifique si existe algún piso que podemos considerar “outlier” (para ello solo tenga en cuenta las variables continuas). Elimínelo del data frame

pican

8. Efectúe un diagrama bivariante (plot) entre el “Valor de los pisos” y su “Superficie”. Calcule la covariancia y la correlación entre ambas variables.

los

9. Calcule la asociación entre el “Valor de los pisos” y el “Distrito”.

cocos

10. Calcule la asociación entre el “Distrito” y el “Estado de la vivienda”.

!