



CONCOURS DE RECRUTEMENT

Session du 22 Novembre 2020

Cadre : Infirmier

Spécialité : Infirmier Polyvalent

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Pour répondre aux 40 questions, cocher la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

1) Parmi les propositions suivantes désignez les buts d'un drainage aspiratif de Redon

- A. Éliminer par voie transcutanée les liquides organiques d'une plaie suturée. ✓
- B. Evacuer les liquides des cavités organiques.
- C. Prévenir les hématomes et les suppurations en post opératoire. ✓
- D. Evacuer les liquides organiques des plaies chirurgicales.

2) Pour traiter les vomissements chez le nourrisson il faut :

- A. Espacer les tétés.
- B. Épaissir les biberons.
- C. Ne pas coucher le nourrisson juste après la tété.
- D. Secouer le nourrisson.
- E. Jouer avec le nourrisson.

3) La leucorrhée physiologique est :

- A. Un écoulement sanglant provenant de l'appareil génital féminin.
- B. Brunâtre.
- C. Un écoulement non sanglant provenant de l'appareil génital féminin.
- D. Rougeâtre.
- E. Verdâtre.

4) une personne est considérée obèse quand la valeur de son IMC (kg/m^2) est située entre :

- A. 25,00 à 29,99
- B. 30,00 à 34,99
- C. 18,50 à 24,99
- D. 35,00 à 39,99
- E. $\geq 40,00$

5) Lors des risques infectieux hospitaliers les précautions peuvent comporter pour le patient :

- ✕
- A. L'isolement en chambre individuelle
 - B. La limitation des déplacements
 - C. Un renforcement du lavage des mains
 - D. Le port de vêtements de protection
 - E. Un renforcement des mesures d'élimination des déchets

6) La prématurité est un état attribué à un enfant né :

- A. Entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée
- B. Entre 40 et 41 semaines d'aménorrhée
- C. A moins de 32 semaines d'aménorrhée
- D. Au-dessous de 27 semaines d'aménorrhée

7) Parmi les propositions suivantes désignez la ou les indications du sondage vésical:

- A. La rétention urinaire.
- B. La surveillance des entrées et des sorties.
- C. La sténose de l'urètre.
- D. L'incontinence urinaire chez les personnes âgées.

8) Parmi les propositions suivantes désignez la ou les complications d'un sondage vésical évacuateur.

- A. Fausse route lors de l'introduction de la sonde.
- B. Lésions traumatiques de l'urètre.
- C. Une hémorragie survenant par le méat urinaire.
- D. La prostatite aiguë.

9) Devant une vulvo-vaginite bactérienne :

- A. Il faut traiter le partenaire.
- B. Il ne faut pas traiter le partenaire.
- C. Il faut faire un bilan biologique.
- D. Le bilan n'est pas nécessaire.
- E. Il n'y a pas de complications.

10) On parle d'anémie lorsque l'hémoglobine est :

- A. Supérieur à 13 g/dl chez la femme.
- B. Inférieur à 13 g/dl chez l'homme.
- C. Inférieur à 12 g/dl chez la femme.
- D. Supérieur à 12 g/dl chez l'homme.
- E. Toutes les réponses sont justes.

11) La peau est constituée de 3 couches qui sont :

- A. L'épiderme.
- B. La musculuse.
- C. Le derme.
- D. La séreuse.
- E. L'hypoderme.

12) la leucémie est :

- A. Une prolifération incontrôlée des globules rouges.
- ☒ B. Une prolifération incontrôlée des globules blancs.
- C. Une prolifération incontrôlée des plaquettes.
- ☒ D. Un cancer du sang.
- E. Un cancer de la moelle osseuse.

13) Les signes cliniques et biologiques suivant peuvent être spécifiques à l'hypoglycémie

- A. Taux de glucose dans le sang est $\leq 1,40\text{g/l}$
- ☒ B. Trismus (contractures des mâchoires)
- C. Transpiration
- D. Odeur acétonique de l'haleine
- E. Asthénie brutale et pâleur

14) L'immaturité des centres respiratoires chez le prématuré se caractérise par :

- A. Hypoxie
- ☒ B. Hypothermie
- C. Pause et apnée
- D. Râles sibilants

15) Quel est le signe clinique le plus fréquent au cours d'une anémie :

- A. La rougeur.
- B. La force.
- C. La pâleur.
- D. La boulimie.
- E. Absence de signe.

16) Au cours de l'ictère néonatal :

- A. La peau est rouge.
- B. Les conjonctives sont normales.
- C. La peau est jaune.
- D. Les conjonctives sont jaunes.
- E. Toutes les réponses sont justes.

17) Parmi les incidents et accidents liés à la ponction évacuatrice d'ascite :

- A. infection péritonéale
- ☒ B. pneumothorax
- C. choc si évacuation trop rapide ou évacuation d'une très grande quantité de liquide
- D. sortie accidentelle du cathéter

18) Indiquez la ou les propositions exactes concernant la stomie ?

- A. Une ablation intentionnelle et chirurgicale, temporaire ou définitive, d'un organe creux.
- B. Un abouchement intentionnel et chirurgical, temporaire ou définitif, d'un organe creux à la peau.
- C. Un abouchement spontané non chirurgical, d'un organe creux à la peau.

19) Une leucorrhée physiologique est une leucorrhée :

- A. Purulente.
- B. De mauvaise odeur.
- C. Transparente.
- D. Verdâtre.
- E. Grisâtre.

20) Parmi les mesures suivantes, citer celles entrant dans le cadre des précautions standards

- ☒ A. Port de gants en cas de contact avec des liquides biologiques
- ☒ B. Port de gants en cas de contact avec l'environnement
- C. Hygiène des mains avant et après un soin
- D. Hygiène des mains après le retrait des gants
- E. Port d'une surblouse en cas de contact avec des liquides biologiques.

21) Le poids de naissance sera en moyenne :

- A. multiplié par 2 à 4mois
- B. multiplié par 3 à 1an
- C. multiplié par 2 à 6mois
- D. multiplié par 3 à 9mois.

22) la convulsion chez l'enfant :

- A. Est un relachement musculaire.
- B. Est due à une fièvre normale.
- C. Est une suite de secousses musculaires involontaires.
- D. Peut etre d'origine hyperthermique.
- E. Peut être d'origine neurologique.

23) Indiquez la ou les propositions exactes concernant la maladie de crohn ?

- ☒ A. Une affection inflammatoire chronique de cause inconnue qui peut atteindre tous les segments du tube digestif, mais le plus souvent l'iléon et le côlon.
- ☒ B. Une affection chronique du tube digestif qui survient suite à une occlusion intestinale.
- C. Une affection inflammatoire chronique du tube digestif notamment l'iléon et le côlon qui survient suite à un défaut de sécrétion du suc gastrique.

24) Parmi les éléments suivants, quels sont ceux indiqués dans le traitement de la glomérulonéphrite aigue :

- ☒ A. Epuration extrarénale (hémodialyse)
- ☒ B. Digitaliques
- ☒ C. Diurétiques
- D. Régime sans sucre

25) Parmi les incidents et accidents liés à la ponction biopsie hépatique:

- A. blessure d'un organe de voisinage (VB, poumon droit, rein...)
- B. blessure vasculaire avec hémorragie
- ☒ C. hématurie obstructive
- D. hématome péri rénale ✓
- E. hématome intra-hépatique

26) La névrose est une maladie psychique au cours de laquelle :

- A. Le patient est conscient.
- B. Le patient n'est pas conscient.
- C. Le patient veut être traité.
- D. Le patient refuse le traitement.
- E. Aucune réponse n'est juste.

27) La kératite est :

- A. Une inflammation de la cornée.
- B. Une inflammation de la conjonctive.
- C. Si non traité peut entraîner une perte de la vue.
- D. Peut-être associée à une conjonctivite.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

28) les signes cliniques et para cliniques suivant peuvent être évocateurs d'une pancréatite aiguë:

- A. transaminases hépatique sont augmentées
- B. douleur abdominale intense avec position en « chien de fusil »
- ☒ C. bilan de la fonction rénale perturbé
- D. nausées et vomissements
- E. hyperamylasémie, hyperlipasémie

29) L'hypothermie se définit par une température centrale :

- A. Supérieure à 37°C.
- B. Inférieure à 38°C.
- C. Inférieure à 36°C.
- D. Inférieure à 39°C.
- E. Supérieure à 40°C.

30) la fibroscopie digestive est indiquée dans les cas suivant:

- ☒ A. présence du sang des selles
- B. suspicion de gastrite, ulcères
- C. varices œsophagiennes
- D. suspicion de RCH
- E. varices gastriques

31) Quelle est la voie de contamination la plus fréquente de la pneumopathie aiguë ? :

- A. Sanguine.
- B. Urinaire.
- C. Aérienne.

- D. Plasmétique.
- E. Entérale.

32) indiquer parmi les examens suivant ceux qui utilisent les rayons X (RX) comme principe physique :

- A. ASP, Echographie, TDM
- B. TDM, IRM, Echographie
- X C. UIV, TDM, ASP
- D. TOGD, TDM, IRM

33) Le rhumatisme articulaire aigu est :

- A. Une infection.
- B. Une complication inflammatoire aigue d'une infection streptococcique.
- C. Une entérite.
- D. Une angine.
- E. Une pharyngite.

34) La complication la plus grave du rhumatisme articulaire aigu est :

- A. La stomatite.
- B. La gastrite.
- C. La cardite.
- D. La pharyngite.
- E. L'otite.

35) Le tétanos néonatal est dû au :

- A. Streptocoque
- B. Staphylocoque.
- C. Clostridium tétani.
- D. Entérocoque.
- E. Bacille de koch.

36) Lors des risques infectieux hospitaliers les précautions peuvent comporter pour le patient:

- A. L'isolement en chambre individuelle
- B. La limitation des déplacements
- X C. Un renforcement du lavage des mains
- D. Le port de vêtements de protection
- E. Un renforcement des mesures d'élimination des déchets

37) Parmi les signes suivants, quels sont ceux en relation avec les crises convulsives :

- A. Emission des urines
- F B. Révulsion des globes oculaires
- C. Dyspnée
- D. Perte de connaissance

38) Indiquez la ou les propositions exactes concernant Spina bifida ?

- A. Une malformation caractérisée par une déviation de la colonne vertébrale caractérisée par une importante convexité vers l'arrière.
- B. Une malformation liée à un défaut de fermeture du tube neural durant la vie embryonnaire.
- C. Une malformation liée à un défaut de fermeture du tube neural, Se traduisant par un méningocèle ou un myéloméningocèle.

39) Quels sont les différents modes de transmission d'une infection nosocomiale ?

- A. Contact
- ☒ B. Gouttelettes
- C. Animal-humain
- D. Air
- E. Auto-infection

40) Pour un enfant moins d'un an, la fréquence respiration normale est :

- ☒ A. Entre 22-37 cycles/min
- B. Entre 30-53 cycles/min
- C. Entre 20-29 cycles/min
- D. Entre 15-20 cycles/min.