Concours Recrutement

2026

PREPARE MON CONCOURS

ConCours 19

Region Dakhla 2025 – Sage-Femme

06 16 03 08 31

slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

1/ Lors de l'examen du nouveau-né, si l'on trouve du sang dans les selles :

A/ Diarrhée sécrétoire

B/ Dysenterie

C/ Diarrhée aiguë

D/ Diarrhée chronique

2/ Choisir parmi les vaccins suivants les vaccins viraux vivants atténués :

A/ BCG

B/ VPI (Poliomyélite injectable)

C/ VPO (Poliomyélite orale)

D/ Toutes les réponses sont justes

3/ Les Pl sont contre-indiqués chez une parturiente :

A/ Multipare

B/ Avec saignement génital inexpliqué

C/ Diabétique de type I

D/ Diabétique de type II

4/ Il est contre-indiqué de prescrire le DIU chez une parturiente :

A/ Avec des cardiopathies valvulaires compliquées

B/ Sous anticoagulants

C/ Avec maladie trophoblastique gestationnelle maligne

D/ Avec SIDA contrôlé

5/ Les contraceptifs oraux combinés (COC) :

A/ S'accumulent dans le corps de la femme

B/ Nécessitent une période de repos

C/ Diminuent la libido

D/ Ne provoquent pas de malformations congénitales

6/ Lors de votre examen, vous avez posé le diagnostic de suspicion d'ictère chez une femme sous COC

A/ Référer vers une consultation médicale

B/ Arrêter la pilule

C/ Proposer un autre moyen de contraception temporaire (préservatifs)

D/ Toutes les réponses sont justes

7/ Il faut retirer le DIU si :

A/ Saignement minime

B/ Expulsion totale

C/ Expulsion partielle

D/ Douleur pelvienne résistante au traitement

8/ Il ne faut pas utiliser les COC chez une parturiente qui présente :

A/ Antécédents d'hypertension artérielle gravidique

B/ Antécédents de diabète gestationnel

C/ Cirrhose

D/ Fibrome utérin

9/ On commence les COC en post abortom :

A/ Après 6 semaines si la femme n'allait pas

B/ Après 6 semaines

C/ Après 3 semaines

D/ Toutes les réponses sont fausses

10/ Les progestatifs injectables (PI) agissent sur :

A/ Épaississement de la glaire cervicale

B/ Blocage de l'ovulation

C/ Atrophie de l'endomètre

D/ Toutes les réponses sont fausses

11/ Choisir les effets secondaires du vaccin le rotavirus :

A/ Somnolence

B/ Paralysie

C/ Vomissements

D/ Diarrhée

12/ Parmi les signes de vomissements occasionnels chez l'enfant :

A/ Sténose du pylore

B/ Mal des transports

C/ Insuffisance rénale

D/ Erreurs diététiques

13/ Parmi les complications du syndrome fébrile chez un enfant :

A/ Convulsions

B/ Déshydratation aiguë

C/ Hyperthermie majeure

D/ Toutes les réponses sont justes

14/ La fièvre aiguë chez le nourrisson est une fièvre qui est apparue :

A/ Entre 8 et 15 jours chez l'enfant

B/ Plus de 5 jours

C/ Moins de 5 jours et qui n'est pas répétitive

D/ Entre 7 et 10 jours

15/ En cas de crise de convulsions chez un enfant, il faut :

A/ Toutes les réponses sont justes

B/ Complètement déshabiller l'enfant

C/ Le coucher en position dorsale

D/ Mettre en place une canule de Mayo

16/ Les signes cliniques de déshydratation extracellulaire chez un enfant :

A/ Oligurie

B/ Coma

C/ Soif

D/ Fièvre

17/ Parmi les signes de l'asthme chez un enfant :

A/ Toux sèche ou grasse

B/ Sifflements thoraciques

C/ Tirage intercostal

D/ Sensation d'oppression thoracique

18/ Signes cliniques de tétanos néonatal :

A/ Vomissements

B/ Trismus

C/ Fièvre

D/ Dysphagie

19/ L'ictère hémolytique du nouveau-né survient :

a) À partir du 2ème jour de vie

b) Au cours des premières 24 h de vie

c) Toutes les réponses sont fausses

d) Après 48 h de vie

20/ Les infections des voies aériennes supérieures (VAS) :

A/ Pneumonies

B/ Otites moyennes aiguës

C/ Bronchiolites

D/ Rhinopharyngites

21. Un risque accru d'IRA (Insuffisance Rénale Aiguë) chez l'enfant est associé à :

A/ La prématurité

B/ Déficit immunologique congénital ou acquis

C/ Obésité de la mère au cours de la grossesse

D/ Déficit en vitamine D

22/ La deuxième visite durant le premier trimestre a lieu entre :

A/ 11 SA-14 SA

B/ 12 SA-16 SA

C/ 13 SA-17 SA

D/ 12 SA-15 SA

23/ Si l'âge de la parturiente est supérieur à 38 ans, cela peut favoriser les risques suivants

A/ Accouchement prématuré, aberrations chromosomiques, morbidité périnatale

B/ Hypertension gravidique, retard de croissance intra-utérin

C/ Accouchement prématuré

D/ Toutes les réponses sont justes

24/ On considère que la glycémie est anormale chez les femmes enceinte si le taux est supérieur à :

A/ 0,90 g/L

B/ 0,92 g/L

C/ 0,97 g/L

D/ 0,96 g/L

25/ Nombre de consultations prénatales en cas de grossesse normale :

A/ 4 consultations

B/ 7 consultations

C/ 9 consultations

D/ Toutes les réponses sont fausses

26/ On peut diagnostiquer le diabète gestationnel si l'on trouve une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) à 75 g de glucose avec :

A/ Au moins 1 valeur anormale parmi les 3 mesures

B/ Au moins 2 valeurs anormales parmi les 3 mesures

C/ Les 3 valeurs anormales

D/ Au plus 2 valeurs anormales parmi les 3 mesures

27/ Après l'accouchement, la muqueuse utérine subit un phénomène de régénération qui passe par 4 phases :

A/ Régression, prolifération, cicatrisation, reprise du cycle menstruel

B/ Prolifération, régression, cicatrisation, reprise du cycle menstruel

C/ Régression, cicatrisation, prolifération, reprise du cycle menstruel

D/ Reprise du cycle menstruel, prolifération, cicatrisation, régression

28/ Parmi les signes de l'endométrite :

A/ Fièvre (38-38,5°C)

B/ Défense sus-pubienne

C/ Lochies nauséabondes

D/ Début au 2ème - 3ème jour post-partum

29/ Parmi les facteurs favorisant la phlébite du membre inférieur :

A/ Accouchement non instrumental

B/ La césarienne

C/ Accouchement laborieux (instrumental)

D/ Anémie

30/ Le "baby blues" survient entre :

A/ Après un mois du post-partum

B/ 3-8 mois du post-partum

C/ 2-6 mois du post-partum

D/ Le 3ème et le 5ème jour du post-partum

31/ Indications de césarienne prophylactiques si :

A/ diamètre Promonto-rétro pubien < 9 cm

B/ diamètre Promonto-rétro pubien ≤9 cm

C/ diamètre Promonto-rétro pubien < 10 cm

D/ diamètre Promonto-rétro pubien ≤ 10 cm

32/ Parmi les signes d'hématome rétro placentaire :

A/ Saignement noirâtre minime, douleur, hypertonie

B/ Saignement noirâtre minime, indolore, hypotonie

C/ Saignement noirâtre abondant, douleur, hypertonie

D/ Saignement noirâtre abondant, indolore, hypotonie

33/ En cas de cardiopathie selon la classification NYHA (New York Heart Association) stade III :

A/ Cardiopathie asymptomatique avec gène pour la moindre action

B/ Cardiopathie asymptomatique sans gêne pour la moindre action

C/ Cardiopathie symptomatique avec gêne pour la moindre action

D/ Cardiopathie symptomatique sans gêne pour la moindre action

34/ Parmi les signes de candidose :

A/ Pertes vaginales verdâtres spumeuses

B/ Leucorrhées blanchâtres ressemblant à du lait caillé

C/ Odeur désagréable

D/ Démangeaisons intenses au niveau de la vulve

35/ Parmi les complications maternelles en cas de grossesse gémellaire (GG) :

A/ Toutes les réponses sont vraies

B/ Anémie

C/ Prééclampsie

D/ Accidents placentaires

36/ En cas de menace d'accouchement prématuré, on peut administrer une corticothérapie en :

A/ 2 injections IM de 12 mg à 48 h d'intervalle

B/ 2 injections IM de 12 mg à 24 h d'intervalle

C/ 3 injections IM de 12 mg à 24 h d'intervalle

D/ 3 injections IM de 12 mg à 48 h d'intervalle

37/ Parmi les signes de gravité de la prééclampsie sévère :

A/ Douleur de l'hypocondre droit

B/ Hyperuricémie

C/ Thrombopénie

D/ Oligurie <500 ml/24h

38/ Quelle est la manœuvre qui n'est pas utilisée en cas de dystocie des épaules ?

A/ Manœuvre de Couder

B/ Manœuvre de Wood

C/ Manœuvre de Bracht

D/ Manœuvre de Mc Roberts

39/ En cas de procidence vraie du cordon atteignant la vulve, c'est le :

A/ 1er degré

B/ 3ème degré

C/ 4ème degré

D/ 2ème degré

40/ En cas de placenta prævia, l'hémorragie devient :

A/ Hémorragie cachée

B/ Rouge

C/ Importante

D/ Caillots