

2574. 左右元素和的差值

难度: Easy

给你一个下标从 0 开始的长度为 n 的整数数组 `nums`。

定义两个数组 `leftSum` 和 `rightSum`，其中：

- `leftSum[i]` 是数组 `nums` 中下标 i 左侧元素之和。如果不存在对应的元素，`leftSum[i] = 0`。
- `rightSum[i]` 是数组 `nums` 中下标 i 右侧元素之和。如果不存在对应的元素，`rightSum[i] = 0`。

返回长度为 n 数组 `answer`，其中 `answer[i] = |leftSum[i] - rightSum[i]|`。

示例 1：

输入：`nums = [10,4,8,3]`

输出：`[15,1,11,22]`

解释：数组 `leftSum` 为 `[0,10,14,22]` 且数组 `rightSum` 为 `[15,11,3,0]`。

数组 `answer` 为 `[|0 - 15|, |10 - 11|, |14 - 3|, |22 - 0|] = [15,1,11,22]`。

示例 2：

输入：`nums = [1]`

输出：`[0]`

解释：数组 `leftSum` 为 `[0]` 且数组 `rightSum` 为 `[0]`。

数组 `answer` 为 `[|0 - 0|] = [0]`。

提示：

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 1000$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^5$