

3751. 范围内总波动值 I

难度: Medium

给你两个整数 `num1` 和 `num2`，表示一个 **闭** 区间 `[num1, num2]`。

一个数字的 **波动值** 定义为该数字中 **峰** 和 **谷** 的总数：

- 如果一个数位 **严格大于** 其两个相邻数位，则该数位为 **峰**。
- 如果一个数位 **严格小于** 其两个相邻数位，则该数位为 **谷**。
- 数字的第一个和最后一个数位 **不能** 是峰或谷。
- 任何少于 3 位的数字，其波动值均为 0。

返回范围 `[num1, num2]` 内所有数字的波动值之和。

示例 1：

输入： `num1 = 120, num2 = 130`

输出： 3

解释：

在范围 `[120, 130]` 内：

- 120：中间数位 2 是峰，波动值 = 1。
- 121：中间数位 2 是峰，波动值 = 1。
- 130：中间数位 3 是峰，波动值 = 1。
- 范围内所有其他数字的波动值均为 0。

因此，总波动值为 $1 + 1 + 1 = 3$ 。

示例 2：

输入： `num1 = 198, num2 = 202`

输出： 3

解释：

在范围 `[198, 202]` 内：

- 198：中间数位 9 是峰，波动值 = 1。

- 201：中间数位 0 是谷，波动值 = 1。
- 202：中间数位 0 是谷，波动值 = 1。
- 范围内所有其他数字的波动值均为 0。

因此，总波动值为 $1 + 1 + 1 = 3$ 。

示例 3：

输入： num1 = 4848, num2 = 4848

输出： 2

解释：

数字 4848：第二个数位 8 是峰，第三个数位 4 是谷，波动值为 2。

提示：

- $1 \leq \text{num1} \leq \text{num2} \leq 10^5$