

1665. 完成所有任务的最少初始能量

难度: Hard

给你一个任务数组 `tasks`，其中 `tasks[i] = [actuali, minimumi]`：

- `actuali` 是完成第 `i` 个任务 **需要耗费** 的实际能量。
- `minimumi` 是开始第 `i` 个任务前需要达到的最低能量。

比方说，如果任务为 `[10, 12]` 且你当前的能量为 `11`，那么你不能开始这个任务。如果你当前的能量为 `13`，你可以完成这个任务，且完成它后剩余能量为 `3`。

你可以按照 **任意顺序** 完成任务。

请你返回完成所有任务的 **最少** 初始能量。

示例 1：

输入：`tasks = [[1,2],[2,4],[4,8]]`

输出：`8`

解释：

一开始有 `8` 能量，我们按照如下顺序完成任务：

- 完成第 `3` 个任务，剩余能量为 `8 - 4 = 4`。
- 完成第 `2` 个任务，剩余能量为 `4 - 2 = 2`。
- 完成第 `1` 个任务，剩余能量为 `2 - 1 = 1`。

注意到尽管我们有能量剩余，但是如果一开始只有 `7` 能量是不能完成所有任务的，因为我们无法开始第 `3`

示例 2：

输入：`tasks = [[1,3],[2,4],[10,11],[10,12],[8,9]]`

输出：`32`

解释：

一开始有 `32` 能量，我们按照如下顺序完成任务：

- 完成第 `1` 个任务，剩余能量为 `32 - 1 = 31`。
- 完成第 `2` 个任务，剩余能量为 `31 - 2 = 29`。
- 完成第 `3` 个任务，剩余能量为 `29 - 10 = 19`。
- 完成第 `4` 个任务，剩余能量为 `19 - 10 = 9`。
- 完成第 `5` 个任务，剩余能量为 `9 - 8 = 1`。

示例 3：

输入：tasks = [[1,7],[2,8],[3,9],[4,10],[5,11],[6,12]]

输出：27

解释：

一开始有 27 能量，我们按照如下顺序完成任务：

- 完成第 5 个任务，剩余能量为 $27 - 5 = 22$ 。
- 完成第 2 个任务，剩余能量为 $22 - 2 = 20$ 。
- 完成第 3 个任务，剩余能量为 $20 - 3 = 17$ 。
- 完成第 1 个任务，剩余能量为 $17 - 1 = 16$ 。
- 完成第 4 个任务，剩余能量为 $16 - 4 = 12$ 。
- 完成第 6 个任务，剩余能量为 $12 - 6 = 6$ 。

提示：

- $1 \leq \text{tasks.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{actual}_i \leq \text{minimum}_i \leq 10^4$