3364. 最小正和子数组

难度: **Easy**

给你一个整数数组 `nums` 和 **两个** 整数 `l` 和 `r`。你的任务是找到一个长度在 `l` 和 `r` 之间（包含）且和大于 0 的 **子数组** 的 **最小** 和。

返回满足条件的子数组的 **最小** 和。如果不存在这样的子数组，则返回 -1。

子数组 是数组中的一个连续 **非空** 元素序列。

示例 1：

输入： nums = [3, -2, 1, 4], l = 2, r = 3

输出： 1

解释：

长度在 `l = 2` 和 `r = 3` 之间且和大于 0 的子数组有：

- `[3, -2]` 和为 1
- `[1, 4]` 和为 5
- `[3, -2, 1]` 和为 2
- `[-2, 1, 4]` 和为 3

其中，子数组 `[3, -2]` 的和为 1，是所有正和中最小的。因此，答案为 1。

示例 2：

输入： nums = [-2, 2, -3, 1], l = 2, r = 3

输出： -1

解释：

不存在长度在 `l` 和 `r` 之间且和大于 0 的子数组。因此，答案为 -1。

示例 3：

输入： nums = [1, 2, 3, 4], l = 2, r = 4

输出： 3

解释：

子数组 `[1, 2]` 的长度为 2，和为 3，是所有正和中最小的。因此，答案为 3。

提示：

- `1 <= nums.length <= 100`
- `1 <= l <= r <= nums.length`
- `-1000 <= nums[i] <= 1000`