争取未来开挖掘机

姜圣的追随者 2024.7.12

摘要

沉迷游戏的我无意间看见关于姜圣的新闻。深感愧疚,幼儿班的我就已经熟练的掌握 了的九九乘法表。而现在我却每天沉迷于提瓦特大陆,天天只知道打丘丘人。

从今天开始我也要努力学习数学,希望姜圣以后当上院士的时候能带我一起开发挖掘机。

(本书内容: 仅有公式, 定理及证明)

(作者文凭:中专学历,混的文凭,简单理解就是初中学历(-。-)!)

(公式及证明出处:公式及证明都是在别的书里参考过来的,极个别公式证明是我自己瞎写的。)

本书的 pdf, 及 latex 源码地址: https://github.com/daidongchuixue/jiangping.git 2024.8.31: 本书几乎是跟着 B 站高数视频记录的。记录完,会作为第一版。(预计时间几个月)

然后参考数学分析书籍重新整理, 为第二版。

目录

1	三角	三角函数												
	1.1	三角恒等式	6											
		1.1.1 倍角公式	6											
	1.2	双曲函数	6											
2	不等	式	7											
3	排列]组合	8											
	3.1	定义	8											
	3.2	运算	8											
4	区间]与映射	9											
	4.1		ç											
	4.2	领域定义	ç											
	4.3	映射定义	ç											
5	函数与图像 11													
	5.1	函数的定义	11											
	5.2	函数的性质	11											
		5.2.1 函数的有界性	11											
		5.2.2 函数的单调性	11											
		5.2.3 函数的奇偶性	11											
		5.2.4 周期性	12											
	5.3	函数图像	12											
6	并集,交集 1													
	6.1	定义	13											
	6.2	运算	13											
	6.3	性质	13											
	6.4	gustus De Morgan 定理	14											
	6.5	德摩根律 定理	14											
7	群,	环, 域	15											
	7.1	群	15											
		7.1.1 M1	1.5											

		7.1.2 M2	15
		7.1.3 M3	15
		7.1.4 M4	15
		7.1.5 sdas	15
	7.2	环	15
	7.3	域	15
8	极限		16
	8.1	数列极限	16
		8.1.1 数列的定义	16
		8.1.2 数列极限的定义	16
		8.1.3 极限的唯一性	16
		8.1.4 有界数列	16
		8.1.5 收敛数列与有界性	16
		8.1.6 收敛数列的保号性	16
		8.1.7 收敛数列和子数列	17
	8.2	函数极限	17
		8.2.1 极限的定义	17
		8.2.2 极限的性质	17
	8.3	无穷小与无穷大	18
		8.3.1 无穷小定义	18
		8.3.2 函数极限与无穷小的关系	18
		8.3.3 无穷大与无穷小的关系	18
		8.3.4 无穷大定义	19
	8.4	运算	19
		8.4.1 有限个无穷小的和仍为无穷小	19
		8.4.2 有界函数与无穷小的乘积仍为无穷小	20
		8.4.3 极限的四则运算	20
		8.4.4 夹逼定理 (三明治定理)	21
		8.4.5 重要极限	21
		8.4.6 无穷小比较	22
9	导数		23
	9.1		23
			23

	9.3	导数运算 .		 	 	 	 	 	 		24
10	积分										25
	10.1	幂数,指数,	对数	 	 	 	 	 	 		25
	10.2	三角函数 .		 	 	 	 	 	 		25
	10.3	积分运算 .		 	 	 	 	 	 		25
11	零散	的一些									26
12	证明										28
	12.1	1.2.1		 	 	 	 	 	 		28
	12.2	1.2.2		 	 	 	 	 	 		28
	12.3	1.2.3		 	 	 	 	 	 		28
	12.4	1.2.4		 	 	 	 	 	 		28
	12.5	8.1.2		 	 	 	 	 	 		29
	12.6	8.1.4		 	 	 	 	 	 		29
	12.7	8.1.5		 	 	 	 	 	 		29
	12.8	8.1.1		 	 	 	 	 	 		30
	12.9	8.2.1		 	 	 	 	 	 		30
	12.10	08.3.1		 	 	 	 	 	 		31
	12.11	18.3.2		 	 	 	 	 	 		31
	12.12	28.4.2		 	 	 	 	 	 		31
	12.13	38.4.8		 	 	 	 	 	 		32
	12.14	18.4.9		 	 	 	 	 	 		32
	12.15	58.4.10		 	 	 	 	 	 		33
	12.16	88.4.11		 	 	 	 	 	 		33
	12.17	78.4.12		 	 	 	 	 	 		33
	12.18	88.4.13		 	 	 	 	 	 		33
	12.19	98.4.14		 	 	 	 	 	 		34
	12.20	08.4.15		 	 	 	 	 	 		34
	12.21	18.4.16		 	 	 	 	 	 		34
	12.22	28.4.17		 	 	 	 	 	 		34
	12.23										35

1 三角函数

1.1 三角恒等式

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

1.1.1 倍角公式

$$\sin(2x) = 2\sin x \cos x$$
$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

1.2 双曲函数

定义

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \qquad \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

恒等式

$$\sinh(2x) = 2\sinh x \cosh x \tag{1.2.1}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \tag{1.2.2}$$

$$\cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh(2x) \tag{1.2.3}$$

$$\cosh x = 1 + 2\sinh^2 \frac{x}{2} \tag{1.2.4}$$

2 不等式

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geqslant \sqrt[n]{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$$
 (2.0.1)

$$|x+y| < |x| + |y| \tag{2.0.2}$$

$$\sin x < x < \tan x \tag{2.0.3}$$

伯努利不等式

$$(1+x)^n \leqslant 1 + nx \tag{2.0.4}$$

3 排列组合

3.1 定义

$$\mathbb{A}_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{3.1.1}$$

$$\mathbb{C}_n^k = \frac{\mathbb{A}_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$
(3.1.2)

3.2 运算

4 区间与映射

4.1 区间定义

区间定义
$$\left\{ \begin{array}{l} (a,b) = \{x | a < x < b\} \\ [a,b] = \{x | a \leqslant x \leqslant b\} \\ (a,b] = \{x | a < x \leqslant b\} \\ (a,+\infty) = \{x | a < x\} \end{array} \right.$$

4.2 领域定义

点 a 的领域

$$U(a,\delta) = \begin{cases} \{x|a-\delta < x < a+\delta\} & a \\ \{x|\ |x-a| < \delta\} & \bullet & U \xrightarrow{a-\delta} U \xrightarrow{a+\delta} \end{cases}$$

点 a 的去心领域

$$\mathring{U}(a,\delta) = \begin{cases} \{x|a-\delta < x < a+\delta \land x \neq 0\} & a \\ \{x|0 < |x-a| < \delta\} & \longleftarrow a-\delta \xrightarrow{\bullet} a+\delta \xrightarrow{\bullet} U \end{cases}$$

点 a 的左领域
$$(a - \delta, a)$$

点 a 的右领域 $(a, a + \delta)$

4.3 映射定义

定义:X 与 Y 是两个非空集合, 如果存在一个法则对任一 $x \in X$, 都有确定的 y 与之对应。则称 f 为从 X 到 Y 的一个映射。

5 函数与图像

5.1 函数的定义

设数集 $D \in R$ 的映射

$$f:D\to R$$

称 f 为定义在 D 上的函数, 记为

$$y = f(x) \ \{x \in D\}$$

5.2 函数的性质

5.2.1 函数的有界性

$$f: D \to R\{D \subset R\} \begin{cases} f = x \\ f = x \\ f = x \end{cases} \begin{cases} f = x \\ f = x \\ f = x \end{cases} \begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f = x \\ f = x \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f = x \\ f = x \end{cases} \begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \\ f(x) \leq x_1, \forall x \in D \end{cases} \end{cases}$$

5.2.2 函数的单调性

单调增加 若
$$\{x_1, x_2 \in D\}$$
 $x_1 < x_2 \Rightarrow$
$$\begin{cases} f(x_1) < f(x_2) \% f(x) \text{在 D 上单调增加} \\ f(x_1) > f(x_2) \% f(x) \text{在 D 上单调减少} \\ f(x_1) \leqslant f(x_2) \% f(x) \text{在 D 上单调非降} \\ f(x_1) \geqslant f(x_2) \% f(x) \text{在 D 上单调非增} \end{cases}$$

5.2.3 函数的奇偶性

定义域

$$\forall x \in D$$
 $f(-x) = \begin{cases} f(x) &$ 偶函数
$$-f(x) &$$
 奇函数

奇偶性运算

奇函数
$$\times$$
 奇函数 = 偶函数 (5.2.1)


奇函数
$$\times$$
 偶函数 $=$ 奇函数 (5.2.2)

偶函数
$$\times$$
 偶函数 = 偶函数 $(5.2.3)$

5.2.4 周期性


 $Def: f(x+L) = f(x)\{L > 0$ 常数, $\forall x \in D\} \Rightarrow f(x)$ 为 L 的周期函数

5.3 函数图像



$$f(x) = sgn \ x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$





6 并集,交集

6.1 定义

$$(\lor 或, \land 与)$$
$$A \cup B = \{x \in A \lor x \in B\}$$
$$A \cap B = \{x \in A \land x \in B\}$$

6.2 运算

6.3 性质

性质 1.

$$A \subset (A \cup B)$$
 $A \supset (A \cap B)$ (6.3.1)

性质 2.

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B \tag{6.3.2}$$

性质 3.

$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B \tag{6.3.3}$$

性质 $4.(n \in N)$

$$A \cup (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap \dots \cap (A \cup B_n)$$

$$(6.3.4)$$

性质 $5. (n \in N)$

$$A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$$

$$(6.3.5)$$

6.4 gustus De Morgan 定理

$$\neg(A \lor B) \Leftrightarrow (\neg A) \land (\neg B)$$

$$\neg(A \land B) \Leftrightarrow (\neg A) \lor (\neg B)$$

6.5 德摩根律 定理

$$\left(\bigcup_{\alpha} E_{\alpha}\right)^{C} = \bigcap_{\alpha} (E_{\alpha}^{C})$$

$$\left(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha}\right)^{C} = \bigcup_{\alpha} (E_{\alpha}^{C})$$

7 群,环,域

- 7.1 群
- 7.1.1 M1
- 7.1.2 M2
- 7.1.3 M3
- 7.1.4 M4
- 7.1.5 sdas
- 7.2 琢
- 7.3 域

8 极限

8.1 数列极限

8.1.1 数列的定义

 $Def: \{x_n\}: N^+ \to R$

$$x_n = f(n)$$

8.1.2 数列极限的定义

 $Def: \{x_n\}, n \in N^+, \exists a, \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$ $\lim_{n \to \infty} x_n = a$ 极限存在,为收敛,不存在为发散

8.1.3 极限的唯一性

数列收敛,极限的唯一性

(8.1.1)

8.1.4 有界数列

8.1.5 收敛数列与有界性

收敛数列必有界

(8.1.2)

单调有界数列必收敛

(8.1.3)

8.1.6 收敛数列的保号性

如果 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ 存在,且 a>0,则 $\exists N>0\{N\in N^+\}$ 当 n>N 时, $\Leftrightarrow x_n>0$

(8.1.4)

$$\lim_{n \to \infty} x_n = a, \lim_{n \to \infty} b_n = b, a < b, \exists N, n > N, a_n < b_n$$

(8.1.5)

8.1.7 收敛数列和子数列

$$\{x_n\}, \lim_{n\to\infty} x_n = a, \ \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_{n_k} = a$$
 证明 $K = N$ $k > K$
$$n_k > n_K \geqslant N$$

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon$$

$$\lim_{n\to\infty} x_{n_k} = a$$

8.2 函数极限

8.2.1 极限的定义

$$Def: \forall \varepsilon > 0 \begin{cases} \exists x > X & \text{时都有} \quad |f(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = A \\ \exists x < -X & \text{时都有} \quad |f(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = A \\ \exists |x| > X & \text{时都有} \quad |f(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = A \end{cases}$$
$$\exists \delta > 0 \begin{cases} \exists x > 0 & \text{Harm} \\ \exists$$

注意 1

定义中 $0 < |x - x_0|$ 表示 $x \neq x_0$ 讨论 $x \rightarrow x_0$, 只考虑 $x \neq x_0$ 注意 2

 $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 是否存在与 $f(x_0)$ 是否有定义取什么值无关。

$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$
 存在 $\Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$ (8.2.1)

冬

8.2.2 极限的性质

1 函数的极限的唯一性

如果 $\lim f(x)$ 存在必唯一。

2 局部有界性

 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \Rightarrow \exists M > 0, \delta > 0 \oplus 0 < |x - x_0| < \delta, |f(x)| \leqslant M$

3 保号性

 $\lim_{x \to x_0} = A, \ A > 0, \Rightarrow \exists \delta > 0, \underline{+}, 0 < |x - x_0| < \delta \mathbb{H}f(x) > 0$

4 保序性

 $f(x) \geqslant g(x)$, $\lim f(x) = a$, $\lim g(x) = b$, $\mathbb{M}a \geqslant b$

Def: 如果 $\lim f(x) = 0$ 则称f(x)为 $x \to x_0$ 时的无穷小

4 函数极限与数列极限的关系

如果 $\lim_{x\to x_0}f(x)$ 存在, $\{x_n\}$ 为 f(x) 定义域的任一收敛于 x_0 的数列,则满足 $x_n\neq x_0$ 则 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=0=\lim_{x\to x_0}f(x),\ x_n\to x_0$

8.3 无穷小与无穷大

8.3.1 无穷小定义

$$Def: 如果 \lim_{x \to x_0} f(x) = 0 则称 f(x) 为 x \to x_0 时的无穷小$$

$$\begin{cases} \exists X > 0 \begin{cases} \exists x > X & \text{时 } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = 0 \\ \exists x < -X & \text{时 } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0 \end{cases}$$

$$\exists |x| > 0 \begin{cases} \exists x > X & \text{时 } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0 \\ \exists |x| > X & \text{时 } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = 0 \end{cases}$$

$$\exists \delta > 0 \begin{cases} \exists x > 0 & \text{dim} f(x) = 0 \\ \exists x_0 < x < x_0 + \delta, \text{ ft } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = 0 \\ \exists x_0 < x < x_0, \text{ ft } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = 0 \end{cases}$$

$$\exists 0 < |x - x_0| < \delta, \text{ ft } |f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

$$\exists \delta > 0$$

$$\exists \delta > 0$$

$$\exists x_0 - \delta < x < x_0,$$
 时 $|f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = 0$
$$\exists 0 < |x - x_0| < \delta,$$
 时 $|f(x) - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = 0$

函数极限与无穷小的关系 8.3.2

在自变量的同一变化中。 α 为无穷小。 $\lim f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha$ (8.3.1)

8.3.3 无穷大与无穷小的关系

在自变量同一变化过程中

如果
$$f(x)$$
 为无穷大,则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小。 (8.3.2)

如果
$$f(x)$$
 为无穷小,切 $f(x) \neq 0$,则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小。 (8.3.3)

8.4 运算

8 极限

无穷大定义 8.3.4

8.3.4 无穷大定义
$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \\ f(x) < -M \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = \infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = \infty \\ f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \\ f(x) < M \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = \infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = \infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \\ |f(x)| > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) > M \Leftrightarrow \lim_{x \to$$

 $\lim f(x) = \infty$,直线 $x = x_0$ 是y = f(x)垂直渐进线

8.4 运算

有限个无穷小的和仍为无穷小 8.4.1

8.4 运算

8.4.2 有界函数与无穷小的乘积仍为无穷小

设
$$\alpha$$
 为 $x \to x_0$ 时的一个无穷小
$$g(x)$$
 为 x_0 的一个去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta_1)$ 有界
$$f(x) = g(x)\alpha$$
 证 $f(x)$ 为 $x \to x_0$ 时的无穷小 因为 $g(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0, \delta_1)$ 有界
$$\exists M > 0, \pm 0 < |x - x_0| < \delta_1 \text{ 时 } |g(x)| < M$$
 因为 α 是 $x \to x_0$ 的无穷小
$$\exists \delta_2 > 0 \pm 0 < |x - x_0| < \delta_2 \text{ 时 } |\alpha| < \frac{\varepsilon}{M} < \varepsilon$$
 取 $\delta = min\{delta, \delta_2\} \pm 0 < |x - x_0| < \delta$ 时
$$|g(x)| \geqslant M, |\alpha| < \frac{\varepsilon}{M} \text{ 同时成立}$$

$$|g(x)\alpha| = |g(x)| |\alpha| < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

推论 1. 常数与无穷小的乘积为无穷小

推论 2. 有限个无穷小的乘积为无穷小

8.4.3 极限的四则运算

$$\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$$

$$\lim (f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) \tag{8.4.1}$$

$$\lim (f(x)g(x)) = \lim f(x) \lim g(x) \tag{8.4.2}$$

$$\lim \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} \tag{8.4.3}$$

$$\lim \left[Cf(x) \right] = C\lim f(x) \tag{8.4.4}$$

$$\lim [f(x)]^n = [\lim f(x)]^n \tag{8.4.5}$$

8 极限

$$\lim_{x \to \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m}{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n} = \begin{cases} \frac{a}{b} & m = n \\ \infty & m > n \\ 0 & m < n \end{cases}$$
(8.4.6)

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = u_0, \ \lim_{u \to u_0} f(x) = A$$

$$\exists \delta_0 > 0, \ x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0), \ g(x) \neq u_0$$

$$\lim_{x \to x_0} f[g(x)] = \lim_{u \to u_0} f(u) = A$$
(8.4.7)

8.4.4 夹逼定理 (三明治定理)

$$x_n \leqslant z_n \leqslant y_n \qquad \forall n > N_0$$

若 $\lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} y_n = a$ 則 $\lim_{n \to \infty} z_n = a$ (8.4.8)

8.4.5 重要极限

趋向 0

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{8.4.9}$$

$$\lim_{x \to 0} \cos x = 1 \tag{8.4.10}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \tag{8.4.11}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} = 1 \tag{8.4.12}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$
(8.4.13)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \tag{8.4.15}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \tag{8.4.16}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^n - 1}{nx} = 1 \tag{8.4.17}$$

$$\lim_{x \to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \tag{8.4.18}$$

趋向 ∞

$$\{x_n\} \qquad \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \tag{8.4.19}$$

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e \tag{8.4.20}$$

8.4.6 无穷小比较

⊕ 型未定式

 $Def: \alpha, \beta$ 是同一极限过程的无穷小。

- (1) 如果 $\lim_{\alpha} \frac{\beta}{\alpha} = 0$ 则称 $\beta \in \alpha$ 的高阶无穷小,记作 $\beta = \circ(\alpha)$
- (2) 如果 $\lim_{\alpha} \frac{\beta}{\alpha} = \infty$ 则称 β 是 α 的底阶无穷小。
- (3) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = C$ 则称 β 是 α 的同阶无穷小。
- (4) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C, k > 0$ 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小。
- (5) 如果 $\lim_{\alpha \to 0} \frac{\beta}{\alpha} = 1$ 则称 β 是 α 的等价阶无穷小。

9 导数

9.1 幂数,指数,对数

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}x^a = ax^{a-1} \tag{9.1.1}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}b^x = b^x \ln b \tag{9.1.2}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}e^x = e^x \tag{9.1.3}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}\ln x = \frac{1}{x} \tag{9.1.4}$$

(9.2.6)

9.2 三角函数

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x\tag{9.2.1}$$

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\tag{9.2.2}$$

$$\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x \tag{9.2.3}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x\tag{9.2.4}$$

$$\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x \tag{9.2.5}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}\operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}\tan x = \sec^2 x\tag{9.2.7}$$

$$\frac{d}{dx}\arctan = \frac{1}{1+x^2} \tag{9.2.8}$$

$$\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x\tag{9.2.9}$$

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x \tag{9.2.10}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}x}\cosh x = \sinh x \tag{9.2.11}$$

9.3 导数运算

$$A = B$$

$$C = D$$

10 积分

10.1 幂数, 指数, 对数

$$\int x^{a} dx = \frac{1}{a-1} x^{a-1} + C$$

$$\int b^{x} dx = \frac{b^{x}}{\ln b} + C$$
(10.1.1)

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$
(10.1.3)

10.2 三角函数

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \qquad (10.2.1)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \arcsin x + C \qquad (10.2.2)$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C \qquad (10.2.3)$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C \qquad (10.2.4)$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C \qquad (10.2.5)$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C \qquad (10.2.6)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C \qquad (10.2.7)$$

$$\int \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}} dx = \operatorname{arcsec} x + C \qquad (10.2.8)$$

$$\int \frac{1}{1 + x^2} dx = \tan x + C \qquad (10.2.9)$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C \qquad (10.2.10)$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C \qquad (10.2.11)$$

11 零散的一些

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \tag{11.0.1}$$

$$A_N = \sum_{k=0}^n q^k \qquad qA_N = \sum_{k=1}^{n+1} q^k$$

$$A_N - qA_N = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{k=1}^{n+1} q^k = 1 - q^{n+1}$$

$$A_N = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$\log_{10} x = \lg_x \tag{11.0.2}$$

$$\log_e x = \ln_x \tag{11.0.3}$$

$$\log_b xy = \log_b x + \log_b y \tag{11.0.4}$$

$$\log_{(b^n)} x = \frac{1}{n} \log_b x \tag{11.0.5}$$

$$\log_b x^n = n \log_b x \tag{11.0.6}$$

$$\log_b x = \frac{\log_c x}{\log_b b} \tag{11.0.0}$$

$$b^n = x$$
 $b^m = y$

$$b^{n+m} = xu$$

 $\log_b xy = n + m = \log_b x + \log_b y$

$$b^n = x$$

$$\log_b x = n$$

$$\frac{1}{n}\log_b x = 1 = \log_{(b^n)} x$$

$$b^{1} = x^{n} \qquad b^{\frac{1}{n}} = x$$
$$n \log_{b} x = 1 = \log_{b} x^{n}$$

$$\log_b x = \log_{c^{(\log_c b)}} c^{(\log_c x)} = \frac{\log_c x}{\log_c b}$$

$$(a+b)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m a^{n-m} b^m$$

$$a^{2} - b^{2} = (a - b) (1 + b)$$

$$a^{3} - b^{3} = (a - b) (a^{2} + ab + b^{2})$$

$$a^{n} - b^{n} = (a - b) \sum_{m=0}^{n-1} (a^{n-m}b^{m}) = (a - b) (a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

12 证明

12.1 1.2.1

$$\sinh x \cosh x = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}\right)$$
$$= \frac{1}{2} \sinh(2x)$$
$$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x$$

 $12.2 \quad 1.2.2$

$$\cosh^{2} x - \sinh^{2} x = \left(\frac{e^{x} + e^{-x}}{2} + \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}\right) \left(\frac{e^{x} + e^{-x}}{2} - \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}\right)$$

$$= e^{x} \times e^{-x}$$

$$= 1$$

12.3 1.2.3

$$\cosh^{2} x + \sinh^{2} x = \left(\frac{e^{x} + e^{-x}}{2}\right)^{2} + \left(\frac{e^{x} - e^{-x}}{2}\right)^{2}$$

$$= \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{4}$$

$$= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$$

$$= \cosh(2x)$$

12.4 1.2.4

$$\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$= \sinh^2 x + 1 + \sinh^2 x$$

$$= 2\sinh^2 x + 1$$

$$\cosh x = 2\sinh^2 \frac{x}{2} + 1$$

12.5 8.1.2

证明

12.5 8.1.2

12.6 8.1.4

1

由于
$$\lim_{n \to \infty} x_n = a,$$
且 $a > 0$
 $\varepsilon = \frac{a}{2},$ $\exists N > 0, n > N$
 $|x_n - a| < \varepsilon$
 $|x_n - a| < \frac{a}{2}$
 $-\frac{a}{2} < x_n - a < \frac{a}{2}$
 $\frac{a}{2} < x_n < 1$

2

用反证法, 反设 a < 0. 从某项起 $x_n < 0$ 矛盾

12.7 8.1.5

$$x_n = b_n - a_n$$

$$\lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} b_n - \lim_{n \to \infty} a_n$$

$$\lim_{n \to \infty} x_n = b - a > 0$$

$$\lim_{n \to \infty} x_n > 0$$

$$b_n - a_n = x_n > 0$$

$$b_n > a_n$$

12.8 8.1.1 12 证明

12.8 8.1.1

反设
$$\lim_{n \to \infty} x_n = a$$
, $\lim_{n \to \infty} x_n = b$, $\exists a < b$

$$\varepsilon = \frac{b - a}{3} \begin{cases} \exists N_1, \ n > N_1, \ |x_n - a| < \frac{b - a}{3} \\ \exists N_2, \ n > N_2, \ |x_n - b| < \frac{b - a}{3} \end{cases}$$

$$N = \max\{N_1, N_2\}, \ n > N \Rightarrow \begin{cases} n > N_1 \\ n > N_2 \end{cases}$$

$$b - a = |(x_n - a) - (x_n - b)|$$

$$\leqslant |x_n - a| + |x_n - b|$$

$$< \frac{b - a}{3} + \frac{b - a}{3}$$

$$< \frac{2(b - a)}{3}$$

12.9 8.2.1

 $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$

12.10 8.3.1 12 证明

12.10 8.3.1

$$\lim_{x\to x_o} f(x) = A \Rightarrow \begin{cases} \alpha \, \text{为} x \to x_0 \text{时的无穷小} \\ f(x) = \alpha + A \end{cases}$$

设 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$, 记 $f(x) - A = \alpha$

只需证 α 为无穷小。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \underline{\ } |0 < |x - x_0| < \delta, \, \mathrm{B} |f(x) - A| < \varepsilon$$

 $\mathbb{P} |\alpha - 0| < \varepsilon$

 α 为 $x \to x_0$ 时的无穷小

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \Leftarrow \begin{cases} \alpha \, \text{为} x \to x_0 \text{时的无穷小} \\ f(x) = \alpha + A \end{cases}$$

$$\forall \varepsilon>0, \ \exists \delta>0, \ \underline{\exists} 0<|x-x+0|<\delta, \ |\alpha|<\varepsilon$$

$$\exists \mathbb{I} \ |f(x)-A|<\varepsilon \lim_{x\to x_0}f(x)=A$$

12.11 8.3.2

设
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$
 对 $f(x)$ 为 $x \to$ 时无穷大 对于 $M = \frac{1}{\varepsilon}$. 存在 $\delta > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x)| > M = \frac{1}{\varepsilon}$ $\left|\frac{1}{f(x)}\right| < \varepsilon$ $\frac{1}{f(x)}$ 为 $x \to x_0$ 时的无穷小


12.12 8.4.2

$$\begin{split} f(x)g(x) &= [A+\alpha] \, [B+\beta] \\ &= AB + A\beta + B\alpha + \beta\alpha \\ &= AB + \gamma \qquad (\gamma为无穷小) \\ \lim \left[f(x)g(x) \right] &= AB + \gamma = \lim f(x) \lim g(x) \end{split}$$

12.13 8.4.8 12 证明

12.13 8.4.8

12.14 8.4.9



$$OB = OA = 1$$

$$\triangle AOB \leqslant 扇形面积 \leqslant \triangle AOD$$

$$\frac{1}{2}\sin x \leqslant \frac{1}{2}x \leqslant \frac{1}{2}\tan x$$

$$\sin x \leqslant x \leqslant \tan$$

$$1 \geqslant \frac{\sin x}{x} \geqslant \cos x$$

$$\lim_{x \to 0} 1 \geqslant \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \geqslant \lim_{x \to 0} \cos x$$

$$1 \geqslant \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \geqslant 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$12.15 \quad 8.4.10$

$$|1 - \cos x| = 1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$$

$$\leqslant 2\left(\frac{x}{2}\right)^2$$

$$0 \leqslant 1 - \cos x \leqslant \frac{x^2}{2}$$

$$\lim_{x \to 0} 0 \leqslant \lim_{x \to 0} (1 - \cos x) \leqslant \lim_{x \to 0} \frac{x^2}{2}$$

$$0 \leqslant \lim_{x \to 0} (1 - \cos x) \leqslant 0$$

$$\lim_{x \to 0} (1 - \cos x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} \cos x = 1$$

12.16 8.4.11

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x}$$
$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x}$$
$$= 1$$

12.17 8.4.12

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}x^2}$$
$$= \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2$$
$$= 1$$

12.18 8.4.13

$$x = \sin t, \ t = \arcsin x$$

$$x \to 0, \ t \to 0$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{t}{\sin t} = 1$$

12.19 8.4.14

$$x = \tan t, \ t = \arctan x$$

$$x \to 0, \ t \to 0$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{t \to 0} \frac{t}{\tan t} = 1$$

12.20 8.4.15

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \to 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$$

12.21 8.4.16

$$e^{x} - 1 = t, \ x = \ln(t+1)$$

$$x \to 0, \ t \to 0$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x} - 1}{x} = \lim_{t \to 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = 1$$

12.22 8.4.17

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^n - 1}{nx} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{e^{n \ln(1+x)} - 1}{n \ln(1+x)} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \right) = 1$$

$12.23 \quad 8.4.19$

$$x_{n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} = \sum_{m=0}^{n} C_{n}^{m} 1^{n-m} \left(\frac{1}{n}\right)^{m} = \sum_{m=0}^{n} C_{n}^{m} \left(\frac{1}{n}\right)^{m}$$

$$= C_{n}^{0} \left(\frac{1}{n}\right)^{0} + C_{n}^{1} \left(\frac{1}{n}\right)^{1} + \sum_{m=2}^{n} C_{n}^{m} \left(\frac{1}{n}\right)^{m}$$

$$= 1 + 1 + \sum_{m=2}^{n} \frac{n!}{m! (n-m)!} \left(\frac{1}{n}\right)^{m}$$

$$= 1 + 1 + \sum_{m=2}^{n} \frac{(n)(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} \left(\frac{1}{n}\right)^{m}$$

$$= 1 + 1 + \sum_{m=2}^{n} \frac{1}{m!} \left(\frac{n}{n}\right) \left(\frac{n-1}{n}\right) \cdots \left(\frac{n-m+1}{n}\right)$$

$$= 1 + 1 + \sum_{m=2}^{n} \frac{1}{m!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right)$$

$$x_{n+1} = 1 + 1 + \sum_{m=2}^{n+1} \frac{1}{m!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{m-1}{n+1}\right)$$

$$x_{n} < x_{n+1} \qquad \text{ \text{ \text{iii}} \text{\text{iiii}} \text{\text{iiii}}}
$$< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

$$< 1 + 1 + \frac{1}{2^{2}} + \frac{1}{2^{3}} + \cdots + \frac{1}{n^{2}} = 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$< 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$< 3 \qquad \text{ \text{\text{\text{I}}}}$$$$