



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

ИНСТИТУТ КИБЕРНЕТИКИ

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

## **Лабораторная работа 2**

по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика, часть 2»

Тема: Первичная обработка выборки из  
непрерывной генеральной совокупности

Выполнил:  
Студент 3-го курса  
Жолковский Д.А.

Группа: КМБО-01-16

МОСКВА 2019

**Лабораторная работа по Математической статистике № 2**  
**«Первичная обработка выборки из непрерывной генеральной**  
**совокупности»**

Задание 1. Получить выборку, сгенерировав 200 псевдослучайных чисел, распределенных по нормальному закону с параметрами

$$\mu = (-1)^V \cdot 0,1 \cdot V \quad \text{и} \quad \sigma^2, \text{ где } \sigma = 0,01 \cdot V + 1$$

Задание 2. Получить выборку, сгенерировав 200 псевдослучайных чисел, распределенных по показательному закону с параметром  $\lambda$ .

$$\lambda = 2 + (-1)^V \cdot 0,01 \cdot V$$

Задание 3. Получить выборку, сгенерировав 200 псевдослучайных чисел, распределенных равномерно на отрезке  $[a, b]$ .

$$a = (-1)^V \cdot 0,05 \cdot V, \quad b = a + 0,05 \cdot V + 1$$

$V$  – номер варианта.

Для каждого Задания:

Построить:

- 1) группированную выборку (интервальный вариационный ряд) и ассоциированный статистический ряд;
- 2) гистограмму относительных частот;
- 3) график эмпирической функции распределения.

Найти:

- 1) выборочное среднее;
- 2) выборочную дисперсию с поправкой Шеппарда;
- 3) выборочное среднее квадратическое отклонение;
- 4) выборочную моду;
- 5) выборочную медиану;
- 6) выборочный коэффициент асимметрии;
- 7) выборочный коэффициент эксцесса.

Составить таблицы:

- 1) сравнения относительных частот и теоретических вероятностей попадания в интервалы;

2) сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями.

$V=26$  – номер варианта.

Вычисления проводить с точностью до 0,00001.

### Краткие теоретические сведения

При построении группированной выборки (интервального вариационного ряда) число интервалов  $[a_0, a_1], (a_1, a_2], \dots, (a_{m-1}, a_m]$  определяется по формуле Стерджеса  $m = 1 + [\log_2 N]$ ,  $a_0 = X_{(1)}$ ,  $a_m = X_{(N)}$ ,  $d = a_m - a_0$ ,  $a_k - a_{k-1} = d/m$ .

Интервальный ряд (группированная выборка) имеет вид:

|                  |              |     |                  |
|------------------|--------------|-----|------------------|
| $[a_{i-1}, a_i]$ | $[a_0, a_1]$ | ... | $(a_{m-1}, a_m]$ |
| $n_i$            | $n_1$        | ... | $n_m$            |
| $w_i$            | $w_1$        | ... | $w_m$            |

Ассоциированный статистический ряд:

|         |         |     |         |
|---------|---------|-----|---------|
| $x_i^*$ | $x_1^*$ | ... | $x_m^*$ |
| $n_i$   | $n_1$   | ... | $n_m$   |
| $w_i$   | $w_1$   | ... | $w_m$   |

$$x_i^* = \frac{a_{i-1} + a_i}{2} - \text{середина интервала } (a_{i-1}, a_i] \text{ Полигон}$$

Эмпирическая функция распределения

$$F_N^{\exists}(x; x_1, x_2, \dots, x_N) = \sum_{x_i \leq x} \frac{1}{N}$$

Выборочное среднее

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^m x_i^* w_i$$

### Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда

$$S_B^2 = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^2 w_i - \frac{h^2}{12}, \text{ где } h = (a_m - a_0)/m$$

### Выборочный момент k-ого порядка

$$\overline{\mu}_k = \sum_{i=1}^m (x_i^*)^k w_i$$

### Выборочный центральный момент k-ого порядка

$$\overline{\mu}_k^o = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^k w_i$$

### Выборочное среднее квадратическое отклонение

$$\bar{\sigma} = \sqrt{S_B^2}$$

### Выборочная медиана

$$\overline{M}_e = \begin{cases} a_{k-1} - \frac{h}{w_k} \left( \frac{1}{2} - \sum_{i=1}^{k-1} w_i \right), & \sum_{i=1}^{k-1} w_i < 0,5 < \sum_{i=1}^k w_i \\ a_k, & \sum_{i=1}^k w_i = 0,5 \end{cases}$$

### Выборочная мода

$$\overline{M}_0 = a_{k-1} - h \frac{w_k - w_{k-1}}{2w_k - w_{k-1} - w_{k+1}}$$

### Выборочный коэффициент асимметрии

$$\overline{\alpha_s} = \frac{\overline{\mu_3^o}}{\overline{\sigma^3}}$$

### Выборочный коэффициент эксцесса

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{\overline{\mu_4^o}}{\overline{\sigma^4}} - 3$$

#### Нормальное распределение

| Характеристика                  | Значение   |
|---------------------------------|--|
| Вероятность                     | $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ |
| Математическое ожидание         | $a$  |
| Дисперсия                       | $\sigma^2$   |
| Среднее квадратичное отклонение | $\sigma$   |
| Мода                            | $a$  |
| Медиана                         | $A$  |
| Коэффициент асимметрии          | 0  |
| Коэффициент эксцесса            | 0  |

#### Показательное распределение

| Характеристика                  | Значение   |
|---------------------------------|--|
| Вероятность                     | $\begin{cases} 0, x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \end{cases}$ |
| Математическое ожидание         | $\lambda^{-1}$   |
| Дисперсия                       | $\lambda^{-2}$   |
| Среднее квадратичное отклонение | $\lambda^{-1}$   |
| Мода                            | 0  |
| Медиана                         | $\frac{\ln 2}{\lambda}$  |
| Коэффициент асимметрии          | 2  |
| Коэффициент эксцесса            | 6  |

### Равномерное распределение на отрезке $[a, b]$

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Вероятность                     | $\begin{cases} 0, x \notin (a, b) \\ \frac{1}{b-a}, x \in (a, b) \end{cases}$ |
| Математическое ожидание         | $\frac{a+b}{2}$   |
| Дисперсия                       | $\frac{(b-a)^2}{12}$  |
| Среднее квадратичное отклонение | $\frac{b-a}{2\sqrt{3}}$   |
| Мода                            | $\frac{a+b}{2}$   |
| Медиана                         | $\frac{a+b}{2}$   |
| Коэффициент асимметрии          | 0   |
| Коэффициент эксцесса            | $-\frac{6}{5}$  |

### Средства высокоуровневого интерпретируемого языка программирования Python, которые использованы в программе расчета

`scipy.stats` – модуль библиотеки `scipy` для работы со статистикой, в том числе и распределениями. Объектами класса являются типы распределений, методами – все методы, проходимые в курсе.

`numpy` – библиотека для эффективной работы с числами / массивами.

`itertools.islice` – метод библиотеки `itertools` для быстрого / эффективного взятия “слайсов”.

`math.log2` – метод библиотеки `math` для взятия двоичного логарифма.

`collections.Counter` – класс словарь библиотеки `collections`, отличающийся от стандартного словаря возможностью автоматически считать частоту объектов.

`matplotlib.pyplot` – библиотека для построения графиков.

`functools.reduce` – метод `reduce` библиотеки `functools`.

`copy.deepcopy` – метод для копирования сложных структур.

`random.choice` – метод для выбора из предложенных вариантов.

`collections.namedtuple` – именованная структура.

`np.unique` – возвращение уникальных элементов массива.

`np.asarray` – представление структуры в виде numpy массива.

`distribution.rvs` – генерация рандомной выборки.

`abs` – модуль числа.

`range` – создание последовательности.

`zip` – произведение множеств.

`.append` – добавление элемента в конец списка.

`matplotlib.rc` – доступ к полям в графике.

`plt.bar` – построение диаграммы.

`plt.show` – вывод графика.

`plt.savefig` – сохранение графика.

`plt.clf` – очистка поля для построения нового графика.

`sorted` – сортировка структуры.

`list` – преобразование входной структуры в список.

`islice` – срез структуры.

`plt.subplots` – создание “подграфиков”.

`ax.plot` – редактирование конкретной части графика.

`ax.set_title` – заголовок графика.

`ax.legend` – заголовок всей картинке.

`ax.set_ylabel` – название оси y.

`ax.set_xlabel` – название оси x.

`ax.set_xlim` – масштаб оси x.

`ax.set_ylim` – масштаб оси y.

`fig.tight_layout` – автоматический подбор оптимального масштаба.

`ax.set_axisbelow` – добавление подсетки.

`ax.minorticks_on` – отображение подсетки.

`distribution.stats` – расчет теоретической статистики.

`distribution.median` – теоретическая медиана.

`distribution.std` – теоретическое отклонение.

`np.array` – создание numpy массива.

`.reshape` – изменение размера массива numpy.

`np.round` – округление массива numpy.

`string.ascii_lowercase` – вывод англ алфавита.

`.to_csv` – сохранение таблицы в формате csv.

`str` – преобразование структуры в строку.

`pd.DataFrame` – создание таблицы.

`._asdict` – представление структуры в виде хэш таблицы.

`.format` – форматирование строки.

`enumerate` – умножение входящего множества на множество натуральных чисел.



## Результаты расчетов с комментариями

Задание 1) Распределение по нормальному закону

$$\mu = -0.9$$

$$\sigma = 1.09$$

Полученная выборка

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.0054  | -1.206  | -1.0945 | -0.6038 | -1.9171 | 0.6559  | 3.1601  | 2.3215  | -0.2131 | 1.69    |
| -3.2762 | -2.1668 | -0.9616 | -0.0637 | -0.0018 | -3.4326 | 1.1465  | -1.8645 | -1.4254 | -0.51   |
| -2.6086 | 2.2747  | 0.2823  | -1.3921 | -1.74   | 1.0894  | -0.318  | -0.3374 | -0.0297 | -2.8329 |
| 1.7613  | 1.4387  | -0.2434 | -2.1334 | -1.0177 | -2.4202 | -1.2955 | -0.8613 | -1.4735 | -0.4311 |
| -1.2338 | -0.31   | -2.4996 | -0.6525 | 0.866   | -1.1478 | -2.3337 | 0.0815  | -2.3772 | -1.7441 |
| -1.3118 | -2.1854 | -2.4218 | -1.9215 | -0.7592 | -2.1776 | 1.5536  | -1.2426 | -0.5593 | -0.3703 |
| -0.8892 | -0.6531 | -5.1531 | -2.3126 | 0.5019  | -1.3681 | -1.8703 | -1.6759 | -1.566  | -0.2172 |
| 1.1098  | -0.1361 | -2.112  | -2.1059 | 0.6242  | -2.1045 | -1.6247 | -1.1468 | -0.1162 | -2.0852 |
| -0.5836 | -2.1708 | -0.406  | 0.4     | -1.0297 | -2.2474 | -1.103  | -0.007  | 0.2898  | 0.1545  |
| -1.025  | -0.6954 | 0.0422  | -2.7492 | -1.0332 | -0.0959 | -0.8491 | -0.6216 | 1.112   | 0.5114  |
| -3.4971 | -1.1621 | -2.1053 | -4.5448 | -2.7498 | -0.2763 | -1.7919 | -1.5537 | 0.6847  | -4.3275 |
| -0.1745 | -1.6504 | -1.0327 | -1.8224 | -1.7821 | -0.3839 | -1.4182 | -2.6145 | -0.8222 | -1.6261 |
| -1.4556 | 0.0053  | -1.1956 | -0.8238 | -1.0639 | -1.2467 | -1.4377 | -2.1662 | 0.6975  | 0.5     |
| -0.7559 | -1.384  | 0.3893  | 1.9015  | 0.4301  | -0.7149 | -0.426  | -0.7909 | -0.6294 | 1.3118  |
| -1.1112 | -2.8299 | -1.9588 | -2.0703 | -3.5493 | 0.3809  | -1.77   | -3.6225 | -1.6602 | -0.4452 |
| -1.7775 | -0.9727 | 0.1616  | -1.9573 | -2.0215 | -2.1535 | -0.0089 | -0.5554 | -1.0469 | -1.2181 |
| -1.8538 | -0.2608 | -0.3394 | 0.0405  | -0.581  | -1.5098 | 0.2395  | -2.6143 | -0.1581 | -2.4969 |
| -2.1744 | -2.2356 | -0.1128 | -2.1151 | -1.8309 | -1.8739 | -2.1511 | -0.5134 | -1.3735 | -1.755  |
| -0.702  | -1.4616 | 0.1132  | 0.7608  | -1.9689 | -1.1977 | -1.548  | -2.3208 | -0.0779 | -0.5909 |
| -2.8815 | -1.4314 | -1.7223 | -2.5419 | -0.0671 | 0.8109  | -1.169  | -2.0622 | 1.9061  | -3.2561 |

## Упорядоченная выборка

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -5.1531 | -4.5448 | -4.3275 | -3.6225 | -3.5493 | -3.4971 | -3.4326 | -3.2762 | -3.2561 | -2.8815 |
| -2.8329 | -2.8299 | -2.7498 | -2.7492 | -2.6145 | -2.6143 | -2.6086 | -2.5419 | -2.4996 | -2.4969 |
| -2.4218 | -2.4202 | -2.3772 | -2.3337 | -2.3208 | -2.3126 | -2.2474 | -2.2356 | -2.1854 | -2.1776 |
| -2.1744 | -2.1708 | -2.1668 | -2.1662 | -2.1535 | -2.1511 | -2.1334 | -2.1151 | -2.112  | -2.1059 |
| -2.1053 | -2.1045 | -2.0852 | -2.0703 | -2.0622 | -2.0215 | -1.9689 | -1.9588 | -1.9573 | -1.9215 |
| -1.9171 | -1.8739 | -1.8703 | -1.8645 | -1.8538 | -1.8309 | -1.8224 | -1.7919 | -1.7821 | -1.7775 |
| -1.77   | -1.755  | -1.7441 | -1.74   | -1.7223 | -1.6759 | -1.6602 | -1.6504 | -1.6261 | -1.6247 |
| -1.566  | -1.5537 | -1.548  | -1.5098 | -1.4735 | -1.4616 | -1.4556 | -1.4377 | -1.4314 | -1.4254 |
| -1.4182 | -1.3921 | -1.384  | -1.3735 | -1.3681 | -1.3118 | -1.2955 | -1.2467 | -1.2426 | -1.2338 |
| -1.2181 | -1.206  | -1.1977 | -1.1956 | -1.169  | -1.1621 | -1.1478 | -1.1468 | -1.1112 | -1.103  |
| -1.0945 | -1.0639 | -1.0469 | -1.0332 | -1.0327 | -1.0297 | -1.025  | -1.0177 | -0.9727 | -0.9616 |
| -0.8892 | -0.8613 | -0.8491 | -0.8238 | -0.8222 | -0.7909 | -0.7592 | -0.7559 | -0.7149 | -0.702  |
| -0.6954 | -0.6531 | -0.6525 | -0.6294 | -0.6216 | -0.6038 | -0.5909 | -0.5836 | -0.581  | -0.5593 |
| -0.5554 | -0.5134 | -0.51   | -0.4452 | -0.4311 | -0.426  | -0.406  | -0.3839 | -0.3703 | -0.3394 |
| -0.3374 | -0.318  | -0.31   | -0.2763 | -0.2608 | -0.2434 | -0.2172 | -0.2131 | -0.1745 | -0.1581 |
| -0.1361 | -0.1162 | -0.1128 | -0.0959 | -0.0779 | -0.0671 | -0.0637 | -0.0297 | -0.0089 | -0.007  |
| -0.0018 | 0.0053  | 0.0054  | 0.0405  | 0.0422  | 0.0815  | 0.1132  | 0.1545  | 0.1616  | 0.2395  |
| 0.2823  | 0.2898  | 0.3809  | 0.3893  | 0.4     | 0.4301  | 0.5     | 0.5019  | 0.5114  | 0.6242  |
| 0.6559  | 0.6847  | 0.6975  | 0.7608  | 0.8109  | 0.866   | 1.0894  | 1.1098  | 1.112   | 1.1465  |
| 1.3118  | 1.4387  | 1.5536  | 1.69    | 1.7613  | 1.9015  | 1.9061  | 2.2747  | 2.3215  | 3.1601  |

## Группированная выборка (интервальный вариационный ряд)

|                      |                       |                       |                       |                       |                     |                    |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| (-0.9965,<br>0.0427) | (-2.0356,<br>-0.9965) | (-3.0748,<br>-2.0356) | (-4.1139,<br>-3.0748) | (-5.1531,<br>-4.1139) | (0.0427,<br>1.0818) | (1.0818,<br>2.121) | (2.121,<br>3.1601) |
| 57                   | 63                    | 36                    | 6                     | 3                     | 21                  | 11                 | 3                  |


## Ассоциированный статистический ряд

|         |         |         |         |         |        |        |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| -4.6335 | -3.5944 | -2.5552 | -1.5161 | -0.4769 | 0.5622 | 1.6014 | 2.6405 |
| 3.0     | 6.0     | 36.0    | 63.0    | 57.0    | 21.0   | 11.0   | 3.0    |
| 0.015   | 0.03    | 0.18    | 0.315   | 0.285   | 0.105  | 0.055  | 0.015  |


Проверка выполнения условия была выполнена в программе.

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \text{ где } n - \text{ количество } x_i$$

Гистограмма относительных частот



## График эмпирической функции распределения



Результаты расчетов требуемых характеристик

|   |         |
|---|---------|
| выборочное среднее                              | -1.064  |
| выборочная дисперсия<br>с поправкой Шеппарда    | 1.7304  |
| выборочное среднее<br>квадратическое отклонение | 1.3154  |
| выборочная мода                                 | -1.1854 |
| выборочная медиана                              | -1.1284 |
| выборочный<br>коэффициент асимметрии            | 0.2281  |
| выборочный<br>коэффициент эксцесса              | 0.6529  |

## Задание 2) Распределение по показательному закону

$$\lambda=1.91$$

Полученная выборка

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.0926 | 0.3663 | 0.0317 | 0.2599 | 0.2411 | 0.4506 | 0.2668 | 0.0253 | 0.3684 | 0.7742 |
| 0.1104 | 0.2941 | 0.4839 | 0.1207 | 0.1796 | 0.4361 | 0.0163 | 0.2491 | 0.7134 | 0.4086 |
| 0.5232 | 0.2328 | 0.2874 | 0.1906 | 0.9341 | 0.5523 | 0.4436 | 0.1724 | 0.4748 | 0.1172 |
| 1.0998 | 0.2663 | 0.3862 | 0.9662 | 0.031  | 0.1079 | 0.4423 | 0.2553 | 0.9253 | 0.0608 |
| 0.1252 | 0.3662 | 0.8639 | 0.2983 | 0.1004 | 0.1178 | 1.2647 | 0.018  | 0.4618 | 0.692  |
| 0.1396 | 2.4545 | 0.077  | 0.6364 | 0.1461 | 0.0444 | 0.1894 | 0.9661 | 0.3049 | 1.0175 |
| 0.5783 | 0.7796 | 0.6476 | 0.8734 | 0.0249 | 0.4115 | 0.589  | 0.6861 | 0.3013 | 0.3788 |
| 0.0975 | 1.1705 | 0.1082 | 0.4533 | 0.1225 | 0.0597 | 0.2345 | 0.6517 | 0.1113 | 0.2879 |
| 0.1945 | 0.4529 | 0.0221 | 0.337  | 0.1012 | 0.0823 | 0.012  | 0.2909 | 0.4029 | 0.1889 |
| 0.3592 | 0.4121 | 0.0294 | 0.0062 | 1.1717 | 1.2459 | 0.2138 | 0.2652 | 0.1494 | 0.0318 |
| 0.5029 | 0.5117 | 0.0193 | 0.0464 | 0.2866 | 0.125  | 0.1668 | 0.0919 | 0.0005 | 0.7517 |
| 0.1558 | 1.2171 | 0.4748 | 0.6094 | 0.4376 | 0.7227 | 0.1663 | 0.177  | 0.4588 | 0.2379 |
| 0.3717 | 0.378  | 0.8172 | 1.366  | 0.0407 | 1.143  | 0.308  | 0.6124 | 0.7319 | 0.4992 |
| 0.0168 | 0.5839 | 0.0376 | 0.3691 | 0.381  | 0.0834 | 2.8035 | 0.2937 | 0.6344 | 1.1279 |
| 0.5517 | 0.6034 | 0.0879 | 0.2323 | 0.3147 | 0.2311 | 0.1187 | 0.0687 | 1.4426 | 0.126  |
| 0.0879 | 0.1811 | 0.3239 | 0.1664 | 0.7125 | 0.3544 | 0.2097 | 0.882  | 0.4564 | 0.0138 |
| 0.0192 | 0.9744 | 0.1587 | 0.6887 | 0.3837 | 0.3764 | 0.0814 | 1.1794 | 0.4267 | 0.1523 |
| 0.2022 | 0.613  | 0.4328 | 0.5475 | 1.2378 | 0.0593 | 0.0999 | 0.6679 | 0.6207 | 0.4355 |
| 0.0547 | 0.1618 | 0.0087 | 0.2    | 0.634  | 0.5455 | 1.6948 | 0.9511 | 0.63   | 0.2899 |
| 0.3215 | 0.5637 | 0.4734 | 0.3473 | 1.3455 | 0.7006 | 0.5935 | 0.229  | 0.586  | 0.0099 |

Упорядоченная выборка

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0005 | 0.0062 | 0.0087 | 0.0099 | 0.012  | 0.0138 | 0.0163 | 0.0168 | 0.018  | 0.0192 |
| 0.0193 | 0.0221 | 0.0249 | 0.0253 | 0.0294 | 0.031  | 0.0317 | 0.0318 | 0.0376 | 0.0407 |
| 0.0444 | 0.0464 | 0.0547 | 0.0593 | 0.0597 | 0.0608 | 0.0687 | 0.077  | 0.0814 | 0.0823 |
| 0.0834 | 0.0879 | 0.0879 | 0.0919 | 0.0975 | 0.0999 | 0.1004 | 0.1012 | 0.1079 | 0.1082 |
| 0.1104 | 0.1113 | 0.1172 | 0.1178 | 0.1187 | 0.1207 | 0.1225 | 0.125  | 0.1252 | 0.126  |
| 0.1396 | 0.1461 | 0.1494 | 0.1523 | 0.1558 | 0.1587 | 0.1618 | 0.1663 | 0.1664 | 0.1668 |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.1724 | 0.177  | 0.1796 | 0.1811 | 0.1889 | 0.1894 | 0.1906 | 0.1945 | 0.2    | 0.2022 |
| 0.2097 | 0.2138 | 0.229  | 0.2311 | 0.2323 | 0.2328 | 0.2345 | 0.2379 | 0.2411 | 0.2491 |
| 0.2553 | 0.2599 | 0.2652 | 0.2663 | 0.2668 | 0.2866 | 0.2874 | 0.2879 | 0.2899 | 0.2909 |
| 0.2937 | 0.2941 | 0.2983 | 0.3013 | 0.3049 | 0.308  | 0.3147 | 0.3215 | 0.3239 | 0.337  |
| 0.3473 | 0.3544 | 0.3592 | 0.3662 | 0.3663 | 0.3684 | 0.3691 | 0.3717 | 0.3764 | 0.378  |
| 0.3788 | 0.381  | 0.3837 | 0.3862 | 0.4029 | 0.4086 | 0.4115 | 0.4121 | 0.4267 | 0.4328 |
| 0.4355 | 0.4361 | 0.4376 | 0.4423 | 0.4436 | 0.4506 | 0.4529 | 0.4533 | 0.4564 | 0.4588 |
| 0.4618 | 0.4734 | 0.4748 | 0.4748 | 0.4839 | 0.4992 | 0.5029 | 0.5117 | 0.5232 | 0.5455 |
| 0.5475 | 0.5517 | 0.5523 | 0.5637 | 0.5783 | 0.5839 | 0.586  | 0.589  | 0.5935 | 0.6034 |
| 0.6094 | 0.6124 | 0.613  | 0.6207 | 0.63   | 0.634  | 0.6344 | 0.6364 | 0.6476 | 0.6517 |
| 0.6679 | 0.6861 | 0.6887 | 0.692  | 0.7006 | 0.7125 | 0.7134 | 0.7227 | 0.7319 | 0.7517 |
| 0.7742 | 0.7796 | 0.8172 | 0.8639 | 0.8734 | 0.882  | 0.9253 | 0.9341 | 0.9511 | 0.9661 |
| 0.9662 | 0.9744 | 1.0175 | 1.0926 | 1.0998 | 1.1279 | 1.143  | 1.1705 | 1.1717 | 1.1794 |
| 1.2171 | 1.2378 | 1.2459 | 1.2647 | 1.3455 | 1.366  | 1.4426 | 1.6948 | 2.4545 | 2.8035 |

Группированная выборка (интервальный вариационный ряд)

|                  |                  |                  |                 |                 |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (0.0005, 0.3509) | (0.3509, 0.7012) | (0.7012, 1.0516) | (1.0516, 1.402) | (1.402, 1.7524) | (2.4532, 2.8035) |
| 101              | 64               | 18               | 13              | 2               | 2                |


Ассоциированный статистический ряд

|        |       |        |        |        |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 0.1757 | 0.526 | 0.8764 | 1.2268 | 1.5772 | 2.6284 |
| 101.0  | 64.0  | 18.0   | 13.0   | 2.0    | 2.0    |
| 0.505  | 0.32  | 0.09   | 0.065  | 0.01   | 0.01   |

Проверка выполнения условия была выполнена в программе.


$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \text{ где } n - \text{ количество } x_i$$

Гистограмма относительных частот





## График эмпирической функции распределения



### Результаты расчетов требуемых характеристик

|   |        |
|---|--------|
| выборочное среднее                              | 0.4577 |
| выборочная дисперсия с поправкой<br>Шепарда     | 0.1453 |
| выборочное среднее квадратическое<br>отклонение | 0.3812 |
| выборочная мода                                 | 0.2555 |
| выборочная медиана                              | 0.3474 |
| выборочный коэффициент асимметрии               | 2.5499 |
| выборочный коэффициент эксцесса                 | 9.6164 |

Задание 3) Равномерное распределение на отрезке  $[a, b]$

$$a = -0.45 \quad b = 1.0$$

Полученная выборка

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -0.1375 | 0.3458  | 0.5186  | 0.3008  | 0.5311  | -0.4123 | 0.0358  | -0.1347 | 0.2798  | -0.3736 |
| -0.2411 | 0.5288  | 0.5085  | -0.2646 | 0.4524  | 0.3351  | 0.0628  | -0.0162 | 0.2736  | 0.0627  |
| -0.2175 | -0.0179 | 0.191   | -0.1138 | -0.3769 | 0.4278  | 0.0351  | 0.5141  | -0.2142 | 0.3623  |
| 0.3829  | -0.1192 | -0.2881 | 0.3501  | 0.0121  | -0.1385 | -0.3478 | 0.2789  | 0.3773  | -0.1794 |
| -0.3638 | -0.0057 | 0.5406  | -0.3063 | -0.3029 | -0.43   | 0.2227  | 0.2988  | 0.2504  | -0.0918 |
| 0.4313  | -0.1752 | 0.3455  | 0.3863  | 0.135   | 0.4417  | -0.3221 | 0.515   | -0.0787 | 0.501   |
| 0.5206  | -0.1343 | -0.184  | 0.0526  | 0.256   | -0.1551 | -0.1833 | -0.3315 | 0.4645  | -0.2128 |
| 0.3623  | 0.3531  | 0.2415  | 0.2188  | 0.4706  | -0.292  | 0.1785  | -0.1667 | 0.1977  | 0.3198  |
| -0.4273 | 0.2412  | 0.0833  | 0.0899  | -0.1286 | -0.0931 | 0.2716  | -0.3841 | -0.3533 | 0.4872  |
| 0.0233  | -0.4448 | -0.1029 | 0.3905  | 0.44    | -0.2303 | 0.3822  | -0.1592 | 0.4866  | 0.3961  |
| 0.1102  | -0.0921 | -0.2191 | -0.0773 | 0.2849  | -0.2308 | 0.1324  | -0.0104 | -0.3817 | 0.0195  |
| -0.1351 | -0.2425 | 0.0634  | -0.0008 | -0.1504 | -0.0849 | 0.3379  | 0.2422  | -0.2818 | -0.0576 |
| -0.4295 | -0.2044 | 0.0882  | 0.4028  | -0.3545 | 0.3439  | -0.1299 | -0.2516 | 0.2704  | 0.4668  |
| 0.0969  | 0.3146  | 0.087   | 0.4708  | -0.2746 | -0.2073 | -0.3209 | -0.2805 | -0.2201 | -0.2765 |
| 0.2388  | 0.3004  | 0.186   | 0.3231  | 0.2982  | -0.1472 | -0.0894 | 0.4522  | -0.2966 | -0.1218 |
| 0.5391  | 0.5152  | 0.1833  | 0.347   | 0.4625  | -0.1661 | -0.418  | 0.183   | 0.2746  | -0.1203 |
| -0.0192 | -0.1907 | 0.2291  | 0.0496  | -0.3748 | 0.2398  | -0.0715 | -0.4383 | 0.2209  | -0.4013 |
| 0.0658  | 0.3476  | 0.0959  | 0.503   | 0.13    | -0.0575 | 0.3071  | 0.3219  | 0.0676  | 0.0208  |
| -0.3178 | -0.1229 | 0.0693  | 0.4062  | -0.1186 | 0.2399  | -0.2286 | -0.1922 | 0.012   | 0.5048  |
| 0.2664  | -0.2087 | 0.4571  | 0.4347  | 0.2758  | -0.0968 | -0.3369 | -0.3135 | -0.0334 | 0.4394  |

Упорядоченная выборка

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -0.4448 | -0.4383 | -0.43   | -0.4295 | -0.4273 | -0.418  | -0.4123 | -0.4013 | -0.3841 | -0.3817 |
| -0.3769 | -0.3748 | -0.3736 | -0.3638 | -0.3545 | -0.3533 | -0.3478 | -0.3369 | -0.3315 | -0.3221 |
| -0.3209 | -0.3178 | -0.3135 | -0.3063 | -0.3029 | -0.2966 | -0.292  | -0.2881 | -0.2818 | -0.2805 |
| -0.2765 | -0.2746 | -0.2646 | -0.2516 | -0.2425 | -0.2411 | -0.2308 | -0.2303 | -0.2286 | -0.2201 |
| -0.2191 | -0.2175 | -0.2142 | -0.2128 | -0.2087 | -0.2073 | -0.2044 | -0.1922 | -0.1907 | -0.184  |
| -0.1833 | -0.1794 | -0.1752 | -0.1667 | -0.1661 | -0.1592 | -0.1551 | -0.1504 | -0.1472 | -0.1385 |
| -0.1375 | -0.1351 | -0.1347 | -0.1343 | -0.1299 | -0.1286 | -0.1229 | -0.1218 | -0.1203 | -0.1192 |
| -0.1186 | -0.1138 | -0.1029 | -0.0968 | -0.0931 | -0.0921 | -0.0918 | -0.0894 | -0.0849 | -0.0787 |

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -0.0773 | -0.0715 | -0.0576 | -0.0575 | -0.0334 | -0.0192 | -0.0179 | -0.0162 | -0.0104 | -0.0057 |
| -0.0008 | 0.012   | 0.0121  | 0.0195  | 0.0208  | 0.0233  | 0.0351  | 0.0358  | 0.0496  | 0.0526  |
| 0.0627  | 0.0628  | 0.0634  | 0.0658  | 0.0676  | 0.0693  | 0.0833  | 0.087   | 0.0882  | 0.0899  |
| 0.0959  | 0.0969  | 0.1102  | 0.13    | 0.1324  | 0.135   | 0.1785  | 0.183   | 0.1833  | 0.186   |
| 0.191   | 0.1977  | 0.2188  | 0.2209  | 0.2227  | 0.2291  | 0.2388  | 0.2398  | 0.2399  | 0.2412  |
| 0.2415  | 0.2422  | 0.2504  | 0.256   | 0.2664  | 0.2704  | 0.2716  | 0.2736  | 0.2746  | 0.2758  |
| 0.2789  | 0.2798  | 0.2849  | 0.2982  | 0.2988  | 0.3004  | 0.3008  | 0.3071  | 0.3146  | 0.3198  |
| 0.3219  | 0.3231  | 0.3351  | 0.3379  | 0.3439  | 0.3455  | 0.3458  | 0.347   | 0.3476  | 0.3501  |
| 0.3531  | 0.3623  | 0.3623  | 0.3773  | 0.3822  | 0.3829  | 0.3863  | 0.3905  | 0.3961  | 0.4028  |
| 0.4062  | 0.4278  | 0.4313  | 0.4347  | 0.4394  | 0.44    | 0.4417  | 0.4522  | 0.4524  | 0.4571  |
| 0.4625  | 0.4645  | 0.4668  | 0.4706  | 0.4708  | 0.4866  | 0.4872  | 0.501   | 0.503   | 0.5048  |
| 0.5085  | 0.5141  | 0.515   | 0.5152  | 0.5186  | 0.5206  | 0.5288  | 0.5311  | 0.5391  | 0.5406  |

Группированная выборка (интервальный вариационный ряд)

|                      |                       |                       |                       |                    |                    |                     |                     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| (-0.0753,<br>0.0479) | (-0.1985,<br>-0.0753) | (-0.3217,<br>-0.1985) | (-0.4448,<br>-0.3217) | (0.0479,<br>0.171) | (0.171,<br>0.2942) | (0.2942,<br>0.4174) | (0.4174,<br>0.5406) |
| 17                   | 34                    | 27                    | 20                    | 18                 | 27                 | 28                  | 29                  |


Ассоциированный статистический ряд

|         |         |         |         |        |        |        |       |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| -0.3833 | -0.2601 | -0.1369 | -0.0137 | 0.1094 | 0.2326 | 0.3558 | 0.479 |
| 20.0    | 27.0    | 34.0    | 17.0    | 18.0   | 27.0   | 28.0   | 29.0  |
| 0.1     | 0.135   | 0.17    | 0.085   | 0.09   | 0.135  | 0.14   | 0.145 |


Проверка выполнения условия была выполнена в программе.

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \text{ где } n - \text{ количество } x_i$$

Гистограмма относительных частот



## График эмпирической функции распределения



### Результаты расчетов требуемых характеристик

|   |         |
|---|---------|
| выборочное среднее                              | 0.0626  |
| выборочная дисперсия с поправкой<br>Шеппарда    | 0.0812  |
| выборочное среднее квадратическое<br>отклонение | 0.285   |
| выборочная мода                                 | -0.1626 |
| выборочная медиана                              | 0.0615  |
| выборочный коэффициент асимметрии               | -0.0055 |
| выборочный коэффициент эксцесса                 | -1.3026 |

## Анализ результатов и выводы

### 1) Распределение по нормальному закону

| Название показателя                        | Экспериментальное значение | Теоретическое значение | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Выборочное среднее                         | 1.7304                     | 1.4116                 | 0.3188                | 0.2258                   |
| Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда  | -1.064                     | -0.9                   | 0.164                 | -0.1823                  |
| Выборочное среднее квадратичное отклонение | 1.3154                     | 1.1881                 | 0.1273                | 0.1072                   |
| Выборочная мода                            | -1.1284                    | -0.9                   | 0.2284                | -0.2538                  |
| Выборочная медиана                         | 0.6529                     | 0.0                    | 0.6529                | inf                      |
| Выборочный коэффициент асимметрии          | -1.1854                    | -0.9                   | 0.2854                | -0.3171                  |
| Выборочный коэффициент эксцесса            | 0.2281                     | 0.0                    | 0.2281                | inf                      |

| Интервал             | $w_i$                  | $p_i$                       | $ w_i - p_i $            |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| [-5.15308, -4.11393] | 0.015                  | 0.0032                      | 0.0118                   |
| (-4.11393, -3.07478] | 0.03                   | 0.0302                      | 0.0002                   |
| (-3.07478, -2.03563] | 0.18                   | 0.136                       | 0.044                    |
| (-2.03563, -0.99648] | 0.315                  | 0.2981                      | 0.0169                   |
| (-0.99648, 0.042667] | 0.285                  | 0.3186                      | 0.0336                   |
| (0.04266, 1.08181]   | 0.105                  | 0.1661                      | 0.0611                   |
| (1.08181, 2.12096]   | 0.055                  | 0.0422                      | 0.0128                   |
| (2.12096, 3.16012]   | 0.015                  | 0.0052                      | 0.0098                   |
|                      | $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ | $\sum_{i=1}^n p_i = 0.9995$ | $\Delta_{\max} = 0.0611$ |



## 2) Распределение по показательному закону

| Название показателя                        | Экспериментальное значение | Теоретическое значение | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Выборочное среднее                         | 0.1453                     | 0.2741                 | 0.1288                | 0.4699                   |
| Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда  | 0.4577                     | 0.5236                 | 0.0658                | 0.1258                   |
| Выборочное среднее квадратичное отклонение | 0.3812                     | 0.5236                 | 0.1424                | 0.2719                   |
| Выборочная мода                            | 0.3474                     | 0.3629                 | 0.0155                | 0.0428                   |
| Выборочная медиана                         | 9.6164                     | 6.0                    | 3.6164                | 0.6027                   |
| Выборочный коэффициент асимметрии          | 0.2555                     | 0.0                    | 0.2555                | inf                      |
| Выборочный коэффициент эксцесса            | 2.5499                     | 2.0                    | 0.5499                | 0.2749                   |

| Интервал           | $w_i$                  | $p_i$                       | $ w_i - p_i $          |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| [0.00046, 0.35085] | 0.505                  | 0.4875                      | 0.0175                 |
| (0.35085, 0.70123] | 0.32                   | 0.2496                      | 0.0704                 |
| (0.70123, 1.05162] | 0.09                   | 0.1278                      | 0.0378                 |
| (1.05162, 1.402]   | 0.065                  | 0.0655                      | 0.0005                 |
| (1.402, 1.75239]   | 0.01                   | 0.0335                      | 0.0235                 |
| (2.45316, 2.80354] | 0.01                   | 0.0045                      | 0.0055                 |
|                    | $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ | $\sum_{i=1}^n p_i = 0.9684$ | $\Delta_{\max}=0.0704$ |

3) Равномерное распределение на отрезке  $[a, b]$ 

| Название показателя                        | Экспериментальное значение | Теоретическое значение | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Выборочное среднее                         | 0.0812                     | 0.0833                 | 0.0021                | 0.0255                   |
| Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда  | 0.0626                     | 0.05                   | 0.0126                | 0.2528                   |
| Выборочное среднее квадратичное отклонение | 0.285                      | 0.2887                 | 0.0037                | 0.0129                   |
| Выборочная мода                            | 0.0615                     | 0.05                   | 0.0115                | 0.2309                   |
| Выборочная медиана                         | -1.3026                    | -1.2                   | 0.1026                | -0.0855                  |
| Выборочный коэффициент асимметрии          | -0.1626                    | 0.275                  | 0.4376                | 1.5911                   |
| Выборочный коэффициент эксцесса            | -0.0055                    | 0.0                    | 0.0055                | inf                      |

| Интервал               | $w_i$                  | $p_i$                       | $ w_i - p_i $            |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| $[-0.44483, -0.32166]$ | 0.1                    | 0.1232                      | 0.0232                   |
| $(-0.32166, -0.19849]$ | 0.135                  | 0.1232                      | 0.0118                   |
| $(-0.19849, -0.07531]$ | 0.17                   | 0.1232                      | 0.0468                   |
| $(-0.07531, 0.04785]$  | 0.085                  | 0.1232                      | 0.0382                   |
| $(0.04785, 0.17103]$   | 0.09                   | 0.1232                      | 0.0332                   |
| $(0.17103, 0.29420]$   | 0.135                  | 0.1232                      | 0.0118                   |
| $(0.2942, 0.41738]$    | 0.14                   | 0.1232                      | 0.0168                   |
| $(0.41738, 0.54055]$   | 0.145                  | 0.1232                      | 0.0218                   |
|                        | $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ | $\sum_{i=1}^n p_i = 0.9854$ | $\Delta_{\max} = 0.0468$ |

Вывод: теоретические и экспериментальные в основном не сильно отличаются друг от друга, но были случаи, в которых достаточно большое относительное отклонение, но это из-за того, что взяли только 200 чисел.

### **Список использованной литературы**

1. Лобузов А.А. Математическая статистика [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению лабораторных работ / под ред. Ю. И. Худака. Москва: Московский технологический университет (МИРЭА), 2017. 36 с.
2. Чернова Н. И. Математическая статистика: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007. 148 с

## Приложение (Листинг программы)

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import sys
import argparse

from scipy import stats as st
import numpy as np
import pandas as pd

from copy import deepcopy
from collections import namedtuple
from collections import Counter
from functools import reduce
from copy import deepcopy
from random import choice
from itertools import islice
from math import log2
import string

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib

def createParser():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('-v', '--variant', default=9, type=int)
    parser.add_argument('-n', '--n', default=200, type=int)
    return parser

def findInterv(val: float, arr: list) -> int:
    test = lambda x, item: True if item[0] <= x <= item[1] else False
    for i, item in enumerate(arr):
        if test(val, item):
            return i
    return None

def expStats(sec_counter, first_counter, h):
    tmp = list(sec_counter.items())
    tmp.insert(0, 0.0)
    mean = reduce(lambda a, b: a + b[0] * b[1][1], tmp)
    s2 = reduce(lambda a, b: a + (b[0] - mean) ** 2 * b[1][1], tmp) - (h **
2) / 12
    ds = s2 ** 0.5

    ak, most_common = first_counter.most_common(1)[0]
    wn = sorted(first_counter.items(), key=lambda x: x[0])
    k = {val: i for i, (key, val) in enumerate(sorted(first_counter.items(),
key=lambda x: x[0]))}[most_common]
    wk = lambda k: sorted(sec_counter.items(), key=lambda x: x[0])[k][1][1]
```

```

mode = ak[0] + h * ((wk(k) - wk(k-1)) / (2 * wk(k) - wk(k-1) - wk(k+1)))

w = [val[1] for key, val in sorted(sec_counter.items(), key=lambda x: x)]
sums = [reduce(lambda a, b: a + b, w[:i+1]) for i in range(len(w))]
dsums = {el: i+1 for i, el in enumerate(sums)}
try:
    prk = [(dsums[l], dsums[r]) for l, r in list(zip(sums, islice(sums,
1, None)))] if 1 <= 0.5 < r[0][1]
    a = [key for key, val in sorted(first_counter.items(), key=lambda x:
(x[0]))]
    a = np.unique(np.asarray(a).reshape(-1, 1)).tolist()
    med = a[prk-1] + (h / w[prk-1]) * (0.5 - sums[prk-2])
except:
    prk = 1
    a = [key for key, val in sorted(first_counter.items(), key=lambda x:
(x[0]))]
    a = np.unique(np.asarray(a).reshape(-1, 1)).tolist()
    med = a[prk-1] + (h / w[prk-1]) * (0.5)

mk = lambda k: sum(map(lambda item: item[0] ** k * item[1][1],
sec_counter.items()))
mck = lambda k: sum(map(lambda item: (item[0] - mean) ** k * item[1][1],
sec_counter.items()))
skew, kurtosis = mck(3) / (ds ** 3), (mck(4) / (ds ** 4)) - 3

return mean, s2, ds, mode, med, skew, kurtosis

class LabFitter3000(object):
    '''IN: distribution name, params, scipy class
    OUT: path to figs, experimental stats, theoretical stats'''
    def __init__(self, obj, N, name, *params):
        self.distribution = obj
        self.N = N
        self.distribution_name = name
        self.params = params
        self.rvs = None
        self.h = None
        self.first_counter = None
        self.sec_counter = None
        self.pathes = []
        self.experimental_stats = None
        self.theoretical_stats = None
        self.Stats = namedtuple('Stats', 'mean variance std mode med skew
kurtosis')

    def create_rvs(self):
        self.rvs = list(self.distribution.rvs(size=self.N))

    def create_first_counter(self):
        m = int(1 + log2(self.N))
        sr = sorted(self.rvs)

```

```

f, l = sr[0], sr[-1]
d = abs(l - f)
self.h = d / m
interv = [f + self.h * i for i in range(m)]
interv.append(l)
interv = list(zip(interv, islice(interv, 1, None)))

self.first_counter = Counter()
for val in sr:
    self.first_counter[interv[findInterv(val, interv)]] += 1

def create_second_counter(self):
    self.sec_counter = {(key[1] + key[0]) / 2: (val, val / self.N)
                        for key, val in self.first_counter.items()}

def hist(self, show: bool = False):#, sec_counter: dict, h: float, show:
bool = False, path: str = 'Data/hist.png'):
    matplotlib.rc('xtick', labelsize=10)
    matplotlib.rc('ytick', labelsize=10)
    tmp = {key: val[1] / self.h for key, val in self.sec_counter.items()}
    plt.bar(list(tmp.keys()),
            list(tmp.values()),
            color='b',
            edgecolor='black',
            width=self.h)
    if show:
        plt.show()
    else:
        path = 'Data/' + self.distribution_name + '_hist.png'
        plt.savefig(path)
        plt.clf()

def cdf(self, show: bool = False, sizex: int = 30, sizey: int = 30):#,
sr: list, N: int, sizex: int = 30, sizey: int = 30, show: bool = False, path:
str = 'Data/cdf.png'):

    matplotlib.rc('xtick', labelsize=50)
    matplotlib.rc('ytick', labelsize=50)
    sr = sorted(self.rvs)
    items = list(zip(sr, islice(sr, 1, None)))
    delta = 0.00001
    Xlist = [[x * delta for x in range(int(item[0] / delta), int(item[1]
/ delta))]
            for item in items]
    Ylist = [[i / self.N] * len(Xlist[i]) for i in range(self.N-1)]

    #####

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(sizex, sizey))

    for X, Y in zip(Xlist, Ylist):

```

```

        ax.plot(X, Y, label='', color='black')
    ax.set_title('Эмпирическая функция распределения')
    ax.legend(loc='upper left')
    ax.set_ylabel('y')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_xlim(xmin=sr[0], xmax=sr[-1])
    ax.set_ylim(ymin=0, ymax=1)
    fig.tight_layout()
    if size_x != 5:
        ax.set_axisbelow(True)
        ax.minorticks_on()
        ax.grid(which='major', linestyle='-', linewidth='0.5',
color='red')
        ax.grid(which='minor', linestyle=':', linewidth='0.5',
color='black')
    else:
        ax.grid()
    if show:
        plt.show()
    else:
        path = 'Data/' + self.distribution_name + '_cdf.png'
        plt.savefig(path)
        plt.clf()

    def create_theoretical_stats(self, mode_generator):
        mean, variance, skew, kurtosis =
self.distribution.stats(moments='mvsk')
        med = self.distribution.median()
        std = self.distribution.std()
        mode = mode_generator(*self.params)

        self.theoretical_stats = self.Stats(mean=float(mean),
                                            variance=float(variance),
                                            std=std,
                                            mode=mode,
                                            med=med,
                                            skew=float(skew),
                                            kurtosis=float(kurtosis))

    def create_experimental_stats(self, exp_stats_generator):
        mean, variance, std, mode, med, skew, kurtosis =
exp_stats_generator(self.sec_counter,

self.first_counter,

self.h)
        self.experimental_stats = self.Stats(mean=mean,
                                            variance=variance,
                                            std=std,
                                            mode=mode,
                                            med=med,

```

```

skew=skew,
kurtosis=kurtosis)

def save_rvs(self, shape: int = 20, dec = 4):
    rvs = np.array(self.rvs)
    rvs = rvs.reshape(shape, -1)
    rvs = np.round(rvs, dec)
    df_rvs = pd.DataFrame(rvs,

columns=list(string.ascii_lowercase)[:rvs.shape[1]])
    df_rvs.to_csv('Data/' + self.distribution_name + '_rvs.csv',
                  sep=';',
                  encoding='utf-8',
                  index=False)

    sorted_rvs = np.array(sorted(self.rvs))
    sorted_rvs = sorted_rvs.reshape(shape, -1)
    sorted_rvs = np.round(sorted_rvs, dec)
    df_sorted_rvs = pd.DataFrame(sorted_rvs,

columns=list(string.ascii_lowercase)[:sorted_rvs.shape[1]])
    df_sorted_rvs.to_csv('Data/' + self.distribution_name +
'_sorted_rvs.csv',

                        sep=';',
                        encoding='utf-8',
                        index=False)

def save_dict(self):
    res = {str((round(key[0], 4), round(key[1], 4))): [val]
            for key, val in self.first_counter.items()}
    df = pd.DataFrame(res)
    df.to_csv('Data/' + self.distribution_name + '_first_counter.csv',
              sep=';',
              encoding='utf-8')
    res = {round(key, 4): val
            for key, val in self.sec_counter.items()}
    df = pd.DataFrame(res)
    df.to_csv('Data/' + self.distribution_name + '_second_counter.csv',
              sep=';',
              encoding='utf-8')

def save_stats(self, dec = 4):
    experimental = self.experimental_stats._asdict()
    df = pd.DataFrame(list(np.round(list(experimental.values()), dec)),
                      index=experimental.keys(),
                      columns=[['values']])
    df.to_csv('Data/' + self.distribution_name +
'_experimental_stats.csv',
              sep=';',
              encoding='utf-8')

```



```

theoretical = self.theoretical_stats._asdict()
df = pd.DataFrame(list(np.round(list(theoretical.values()), dec)),
                  index=theoretical.keys(),
                  columns=[['values']])
df.to_csv('Data/' + self.distribution_name +
'_theoretical_stats.csv',
         sep=';',
         encoding='utf-8')

all_stats = list(zip(self.experimental_stats._asdict().keys(),
list(zip(self.experimental_stats, self.theoretical_stats))))
result = {key: (round(e, dec), round(t, dec), round(abs(e-t), dec),
round(abs(e-t)/t, dec))
         for key, (e, t) in all_stats}
df = pd.DataFrame(list(result.values()),
                  index=list(result.keys()))
df.to_csv('Data/' + self.distribution_name + '_all_stats.csv',
         sep=';',
         encoding='utf-8')

def create_and_save_p(self, dec = 4):
    cur_r = self.distribution
    cur_x = sorted(list(self.first_counter.keys()))
    cur_w = [self.sec_counter[key][1]
             for key in sorted(list(self.sec_counter.keys()))]

    p = [cur_r.cdf(b) - cur_r.cdf(a) for a, b in cur_x]
    s = sum(p)
    wp = [abs(a - b) for a, b in zip(cur_w, p)]
    m = max(wp)
    new_w = deepcopy(cur_w)
    new_w.append(1.0)
    p.append(s)
    wp.append(m)
    new_x = deepcopy(cur_x)
    new_x.append('-')

    df = pd.DataFrame(np.round(np.array([new_w, p, wp]).T, 4),
                    index=new_x)
    df.to_csv('Data/' + self.distribution_name + '_wp' + '.csv',
            sep=';',
            encoding='utf-8')

def fitter(obj, mode_generator):
    obj.create_rvs()
    obj.create_first_counter()
    obj.create_second_counter()
    obj.hist()
    obj.cdf()
    obj.create_theoretical_stats(mode_generator)

```

```

obj.create_experimental_stats(expStats)
obj.save_rvs()
obj.save_dict()
obj.save_stats()
obj.create_and_save_p()
return obj

if __name__ == '__main__':
    parser = createParser()
    namespace = parser.parse_args(sys.argv[1:])
    variant = namespace.variant
    N = namespace.n

    mode = { 'norm': lambda a, sgm: a,
             'expon': lambda lmbd: 0,
             'uniform': lambda a, b: sum([a, b])/2}

    Obj = namedtuple('Obj', 'name params distribution')

    mu = (-1) ** variant * 0.1 * variant
    sgm = (0.01 * variant + 1) ** 2

    lmbd = 2 + (-1) ** variant * 0.01 * variant

    a = (-1) ** variant * 0.05 * variant
    b = a + 0.05 * variant + 1

    print('mu = {0}\nsgm = {1}\nlmbd = {2}\na = {3}\nb = {4}'.format(mu,
                                                                    sgm **
                                                                    (1/2),
                                                                    lmbd,
                                                                    a,
                                                                    b))

    Data = [Obj(name='norm',
                params=[mu, sgm],
                distribution=st.norm(mu, sgm)),
            Obj(name='expon',
                params=[1/lmbd],
                distribution=st.expon(scale=1/lmbd)),
            Obj(name='uniform',
                params=[a, b],
                distribution=st.uniform(a, b))]

    result = []
    for obj in Data:
        result.append(LabFitter3000(obj.distribution, N, obj.name,
                                   *obj.params))

    result = [fitter(lf, mode[Data[i].name]) for i, lf in enumerate(result)]

```