

PRML 演習 2.23


@daimatz

(演習 2.23) (2.48) の固有ベクトル展開を用いて座標系を対角化することで，マハラノビス距離 Δ が定数になる超楕円体の内部の体積が，

$$V_D |\Sigma|^{1/2} \Delta^D \quad (2.286)$$

になることを示せ．ただし， V_D は D 次元単位球の体積で，マハラノビス距離は (2.44) で定義される．

(感覚的な説明しかできない…)



(2.50), (2.51) を用いると，マハラノビス距離 Δ は

$$\Delta^2 = \sum_{i=1}^D \frac{y_i^2}{\lambda_i}$$

を満たす．

2次元単位球の体積 (単位円の面積) は

$$V_2 = \pi$$

2次元楕円体

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$$

の体積 (楕円の面積) は

$$W_2 = \pi a b r^2 = a b r^2 V_2$$

同様にして， n 次元単位球の体積を V_n とすると， n 次元楕円体

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{a_i^2} = r^2$$

の体積 W_n は

$$W_n = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) r^n V_n$$

マハラノビス距離が一定となるような点の集合は

$$\sum_{i=1}^D \frac{y_i^2}{\lambda_i} = \Delta^2 \quad (= \text{const})$$

をみたすような楕円体となるので， y 空間上でその体積は

$$\left(\prod_{i=1}^D \lambda_i^{1/2} \right) \Delta^D V_D = |\Sigma|^{1/2} \Delta^D V_D$$

となる． y に拡大・回転変換するために使ったベクトルの大きさは1なので， x 空間上でも体積は同じである．