

QUEMADURAS TIPO Y CLASIFICACIÓN

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

Lesión tisular de la piel que puede ser causada por diferentes tipos de agresiones (térmica, eléctrica, química, radiación, etc.), y que compromete las funciones de la piel (protección, termorregulación, metabólica, neurosensorial, inmunológica y social).

DIAGNÓSTICO

La gravedad de la quemadura depende de varios factores, que son:

- Superficie
- Profundidad
- Agente etiológico
- Otros: edad, patología asociada, traumatismos asociados, inhalación o daño de vía aérea, localización de quemadura.

Características de las quemaduras según profundidad


	Epidérmica (grado I)	D. Superficial (Grado IIA)	D. Profunda (Grado IIB)	D. Total (Grado III)	Subdérmica (Grado IV)
Capa afectada	Epidermis	Epidermis + capa superficial de la dermis	Epidermis + capa dérmica más profunda	Toda la piel	Toda la piel + otros tejidos (fascia, tendón, músculo, hueso, etc)
Causas posibles	Exposición solar fogonazo - flash	Líquidos calientes. Fogonazos. Llamas. Exposición breve a químicos diluidos.	Líquidos calientes. Llamas. Exposición prolongada a químicos diluidos.	Llama. Electricidad. Exposición a químicos concentrados, contacto.	Eléctricas. Exposición prolongada a llama, químicos, contacto.
Color	Rosado	Rosado. Rojo brillante. Blanquean a la presión.	Rojo oscuro. Blanco. Moteado rojo/blanco. No blanquean a la presión	Blanco. Carbonizado.	Carbonizado. Exposición estructuras profundas.
Superficie	Seca. Vesículas	Ampollas. Gran exudado.	Pocas ampollas. Algo húmedas.	Seca. Trombosis vasos.	
Sensación	Dolorosa	Dolorosa	Disminución de la sensación dolorosa	Anestesia. Sensación de presión profunda.	Anestesia piel. Dolor de estructuras profundas.
Textura	Suave, edema mínimo. Posterior exfoliación superficial.	Engrosada por edema, flexible	Edema moderado con menor elasticidad.	Correosa. Apergaminada.	Correosa.
Cicatrización	1ª semana	1ª - 3ª semanas.	> 3 semanas	No	No
Secuelas	No secuelas	Alteración en pigmentación	Deformidades, retracciones, contracturas hipertrofias.	Importantes secuelas funcionales y estéticas.	Importantes secuelas funcionales y estéticas. Amputaciones.
Tratamiento	cuidados locales	Cuidados locales	Tratamiento quirúrgico	Tratamiento quirúrgico	Tratamiento quirúrgico

Clasificación de las quemaduras según superficie quemada

La palma (sin dedos) de la mano del paciente, tanto adulto como niño, corresponde al 1% de su superficie corporal.

Regla de los "9" de Wallace: La superficie corporal quemada se calcula en áreas de 9%: la cabeza y el cuello (9%), el tórax y abdomen (18%), espalda y glúteos (18%), cada miembro inferior (18%)

y cada extremidad superior (9%). El periné completa el 1% restante de la superficie corporal total.



Clasificación de las quemaduras según etiología

- Escaldadura
- Llama
- Sólido caliente
- Eléctrica (por paso de corriente, a diferencia de la producida por flash eléctrico, que es por llama)
- Química

Esta clasificación tiene también su importancia, dado que algunos grupos (como las quemaduras químicas y las eléctricas) se comportan de manera específica y merecen una vigilancia especial.

TRATAMIENTO

Según el tipo y clínica del paciente.

Curas de herida según corresponda.

Analgesia según tipo de quemadura.

Se verá el manejo de cada tipo de quemadura en su apartado correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Achauer BM. Atención del paciente quemado. México DF: El Manual Moderno;1988. p. 67-120.
- Prodigy guidance. September 2004. Burns and scalds [Internet] [Acceso en Octubre 2019]. Disponible en: <http://www.prodigy.nhs.uk/guidance.asp?gt=Burns%20and%20scalds>.
- Manual de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. [Internet]. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. SECPRE [acceso Octubre de 2019].