

PATOLOGÍA UNGUEAL

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN.

El aparato ungueal protege la piel distal de los dedos y facilita las funciones prensiles. Está compuesto por la placa ungueal (cuya parte proximal se denomina lúnula), el lecho ungueal, la matriz ungueal, el pliegue ungueal proximal y el hiponiquio (Fig.1).

Los queratinocitos que constituyen la matriz ungueal se forman a partir del epitelio germinativo de la matriz ungueal. El crecimiento completo de las uñas de las manos ocurre entre 6 y 8 meses, mientras que el de las uñas de los pies, entre 12 y 18 meses. El aparato ungueal puede alterarse por dermatosis infecciosas, inflamatorias, traumáticas, tóxicas, tumorales o genéticas.




Figura 1: Anatomía del aparato ungueal

BIBLIOGRAFÍA

- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.
- Haneke E. Nail surgery. J Cutan Aesthet Surg. 2011;4(3):163.
- Daniel III CR, Jellinek NJ, Rubin AI, Scher RK. Scher and Daniel's Nails Diagnosis, Surgery, Therapy [Internet]. 2018 [citado octubre de 2019]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65649-6>