

FÁRMACOS DE USO EN ORL

Luis Alfredo Alonso Cuesta, Gerardo Jose Martin Siguenza, Juan Manuel Santos Escudero, María del Mar Bances Robles, Julio Tito Camino Acha.

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
Tapón de cerumen	Gotas anticeruminosas	2-4 gotas cada 8h x 3 días	Anticerumen Liade Otocerumen gotas Taponoto
Otitis externa difusa	Amoxicilina/ Acido clavulánico	875/125mg: 1 cada 8h x 10 días	Augmentine 500/125mg Augmentine 875/125mg
	Ciprofloxacino gotas con sin corticoide	4 gotas cada 12 horas durante 7 días	Aceoto gotas. Aceoto Plus (ciprofloxacino/flucinolona) Baycip gotas Cetraxal gotas Cetraxal plus Ciflot gotas
	Fluocinolona, Polimixina b, Neomicina gotas	3-4 gotas cada 8 horas 7-10 días.	Synalar ótico gotas
	Dexametasona, Polimixina B, Trimetoprim gotas:	4 gotas/8h 7-10días	Otix gotas
	Dexametasona, Gentamicina gotas:	3 gotas cada 8horas 7-10 días	COLIRCUSÍ GENTAMICINA 3 mg/ml colirio en solución
Otitis externa circunscrita	Cloxacilina 500mg	1 cada 6 horas durante 7 días	ORBENIN Cáps. 500 mg
	Mupirocina pomada:	1 aplicación cada 8horas durante 7 días	Bactroban 20 mg/g pomada Plasmine20 mg/g pomada
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	1 comprimido cada 8h si dolor.	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg comprimido
Otomicosis	Alcohol 70º boricado a saturación más ácido acético al 2%	2 gotas cada 8h durante 15 días	Alcohol 70º boricado a saturación más ácido acético al 2%
	Beclometasona dipropionato / Clioquinol	2-3 gotas cada 8h, durante 7 días	Menaderm otológico
	Clotrimazol 10 mg/ml solución	2-3 veces/día	Canestén 10 mg/ml solución para pulverización cutánea
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Eccema del CAE	Metilprednisolona acetonato tópico:	1 aplicación cada 12horas durante 5 días	Lexema crema
Otitis media aguda no supurada	Amoxicilina 500mg.	1 cada 8horas durante 10 días	Clamoxyl
	Amoxicilina-acido clavulánico 500/125mg; 875/125mg:	1 cada 8horas durante 10días	Augmentine 500/125mg; Augmentine 875/125mg
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Otitis media crónica reagudizada	Ciprofloxacino gotas	2-4 gotas cada 12 horas durante 7 días	Aceoto gotas, Aceoto Plus (ciprofloxacino/flucinolona) Baycip gotas Cetraxal ótico Ciflot gotas
	Fluocinolona 0,25 mg + Neomicina 3,5 mg + Polimixina B gotas.	4-5 gotas cada 8 horas durante 6-7 días.	Synalar ótico

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
	Ciprofloxacino 500 mg comprimidos	1 comprimido cada 12 horas durante 10 días	Cetraxal Baycip
Otitis seromucosa/ Ototubaritis	Oximetazolina hidrocloreto 0,5 mg/ml spray nasal.	2 pulverizaciones cada 6 horas durante 5-7 días.	Utabón Nebulicina
	Fenilefrina 0,5% spray nasal.	1-2 pulverizaciones cada 8 horas durante 5-7 días	Disneumon Pernasal
	Fluocinolona 0,1 mg + Fenilefrina 1,25 mg + Neomicina 3,5 mg + Polimixina B.	4-5 gotas ó 2 pulverizaciones cada 8 horas durante 6-7 días.	Synalar nasal
	Cetirizina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos.	1 comprimido cada 12 horas durante 5-7 días.	Stopcold
	Loratadina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos.	1 comprimido vía oral cada 12 horas durante 5-7 días	Narine
	Furoato de fluticasona 27,5 mg/ml spray nasal.	2 pulverizaciones cada 24 horas 15-20 días	Avamys
	Mometasona furoato spray nasal.	:2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasonex
	Triamcinolona acetónido spray nasal.	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasacort
	Budesonida spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Budesonida Aldo-Unión
	AINES: Ibuprofeno 600mg Dexketoprofeno 25mg Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Vértigo periférico	Sulpiride 50 mg cápsulas.	1 cápsula cada 8 horas durante 7-10 días.	Sulpiride (Dogmatil)
	Betahistina comprimidos de 8 ó 16 mg.	1 comprimido cada 8 horas durante 15-20 días.	Serc 8, Serc 16.
	Diazepam comprimidos de 5 ó 10 mg:	1 comprimido cada 12 horas durante 10-15 días.	valium
	Lorazepam 0,25mg; 0,5mg; 1mg	1 comprimido sublingual cada 8h durante 10 -15 días.	Lorazepam
Síndrome de Menière	Betahistina (dihidrocloreto de betahistina)24	1cada 12 horas durante 10 días.	Serc24 mg comprimidos
Parálisis facial periférica	Deflazacort 30 mg comprimidos.	iniciar con 60mg 1 cada 24 h durante 5días 45mg 1 cada/24h durante 5días. 30mg 1 cada 24h durante 5días y 15mg 1 cada 24h durante 5 días luego suspender.	Zamene Dezacor
	Metilprednisolona 40 mg comprimidos	iniciar con 40 mg cada 24 horas y seguir una pauta descendente durante 7-10 días	Urbason
	Aciclovir 200 mg comprimidos.	1 comprimido cada 6 horas durante 7-10 días	Aciclovir
	Famciclovir 750 mg comprimidos.	1 comprimido cada 24 horas durante 7 días	Famciclovir
	Vitamina B12, B6, B1 comprimidos.	1 comprimido cada 8 horas durante 10-15 días	Hidroxil
Disfonía Aguda	Deflazacort 30 mg comprimidos.	Iniciar con 30 mg cada 8 horas y seguir una pauta descendente durante 7-10 días.	Zamene Dezacor

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
	Metilprednisolona 40 mg comprimidos.	iniciar con 40 mg cada 8 horas y seguir una pauta descendente durante 7-10 días	Urbason
	Reposo vocal y AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Laringitis aguda infecciosa	Reposo vocal y AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor x 7 días	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
	Amoxicilina-ácido clavulánico	1 cada 8 horas durante 7 días	Augmentine 500/125mg Augmentine 875/125mg
Faringitis aguda	AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Amigdalitis Aguda	Amoxicilina-ácido clavulánico 500/125 mg ó 875/125mg oral.	1 cada 8 horas durante 7 -10 días	Augmentine
	Cefuroxima axetilo 250mg ó 500 mg comprimidos	1 comprimido 250 mg cada 12h durante 7 días. 1 comprimido 500mg cada 12h durante 7 días.	Zinnat 250mg ó 500mg comprimidos
	Cefditoreno 200 ó 400mg	1 comprimido cada 12 horas durante 10 días	Spectracef 200mg ó 400mg. Meiact 200mg ó 400mg.
	Clindamicina 300 mg cápsulas. Reposo, analgesia, antitérmicos e hidratación.	1 cápsula cada 8 horas durante 7- 10 días	Dalacin
Mononucleosis infecciosa			
	20 % sobreinfección bacteriana. Usar clindamicina 150 mg	1 cada/8 h durante 7 días oral.	Clindamicina
Sinusitis Aguda	Cetirizina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos.	1 comprimido cada 12 horas durante 7-10 días	Stopcold
	Loratadina 5 mg + Pseudoefedrina 120 mg comprimidos	1 comprimido cada 12 horas durante 7-10 días	Narine
	Amoxicilina-ácido clavulánico 500/125 mg ó 875/125mg oral:	1 cada 8 horas durante 10 días	Augmentine
	Cefuroxima 500 mg comprimidos	1 comprimido cada 12 horas durante 7-10 días	Zinnat
	Cefditoreno pivoxilo 400 mg comprimidos	1 comprimido cada 24 horas durante 7 días	Meiact Spectracef
	Furoato de fluticasona 27,5 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Avamys
	Mometasona furoato 50 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasonex
	Triamcinolona acetónido 50 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasacort
	Budesonida nasal 100 µg/dosis spray nasal: 2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Budesonida Aldo-Union

DIAGNOSTICO	PRINCIPIOS ACTIVOS	Dosis	NOMBRE COMERCIAL
	AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
Rinitis / Congestión nasal	Oximetazolina hidrocloreto 0,5 mg/ml spray nasal	2 pulverizaciones cada 6 horas durante 5-7 días	Utabón Nebulicina
	Fenilefrina 0,5% spray nasal	1-2 pulverizaciones cada 8 horas durante 5-7 días	Disneumon Pernal
	Furoato de fluticasona 27,5 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Avamys
	Mometasona furoato 50 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasonex
	Triamcinolona acetónido 50 µg/dosis spray nasal:	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Nasocort
	Budesonida nasal 100 µg/dosis spray nasal	2 pulverizaciones cada 24 horas durante 15-20 días	Budesonida Aldo-Union
	AINES: Ibuprofeno 600mg o Dexketoprofeno 25mg o Diclofenaco 50mg	cada 8h si dolor	Neobrufen 600 mg Enantyum 25mg Voltaren 50mg
	Antihistaminicos: Cetirizina 10mg	1 cada 24hx 7 días.	ZYRTEC® ALERLISIN

BIBLIOGRAFÍA

- Ponencia Oficial del LXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial. 2011: Farmacología aplicada en Otorrinolaringología. Jesús Iniesta Turpín. Rafael Pérez Aguilera. Luis Amorós Rodríguez
- <http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-antibioticos-betalactamicos-S0213005X08000323>
- Guías rápidas para el manejo de los procesos otorrinolaringológicos en atención primaria 2012. Sociedad Andaluza de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial