

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: PIERNA

A.R. Trapote Cubillas, E. Matilla Basoa, J. Fernández Díaz.

FRACTURA DIAFISARIA DE TIBIA Y PERONÉ



Fractura diafisaria de tibia y peroné. Fractura de meseta tibial externa

Introducción:

Las fracturas diafisarias de tibia son frecuentes en adultos jóvenes, debido a mecanismos de alta energía (caídas, lesiones deportivas, traumatismos directos, accidentes de tráfico...). La mayoría de las fracturas diafisarias de tibia se asocian a fracturas de peroné.

Exploración física:

Clínicamente se objetiva deformidad, dolor a la palpación, edema y hematoma.

Es frecuente encontrar una fractura abierta por la localización superficial del hueso.

En las fracturas diafisarias de tibia ha de descartarse la presencia de síndrome compartimental.

Pruebas complementarias:

Rx anteroposterior y lateral de la tibia: incluyendo la rodilla y el tobillo, tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral.

Tratamiento:

El tratamiento consiste en control del dolor e inmovilización. En el caso de las fracturas estables con mínimo desplazamiento se realiza tratamiento ortopédico con yeso inguinopédico; mientras que en las fracturas inestables o abiertas el tratamiento es quirúrgico.

**FRACTURAS AISLADAS DE CABEZA DE PERONÉ**

Se producen por un traumatismo directo en la región lateral de la pierna. Hay que realizar estudio radiográfico de la rodilla y del tobillo para buscar lesiones asociadas.

El tratamiento consiste en control del dolor, no siendo precisa la inmovilización.

BIBLIOGRAFÍA

- “Manual del residente de C.O.T.” 2014, SECOT, Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ISBN: 978-84-697-0756-2
- “Fundamentos. Traumatismos en Urgencias” 2012, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-84-15419-44-0
- “Manual de Fracturas” 5ª Edición, 2016, Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-16004-82-9