

ANTÍDOTOS EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA

M^a Carmen Alcalá Navas, Amalia Callado Pérez, Ana Callado Pérez, Francisco Jesús Callado Moro.

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
ACEITE DE PARAFINA	Detergentes iónicos.		
N-ACETILCISTEINA	Paracetamol o tetraclouro de carbono.	Inicial (70 Kg): 10,5 g IV. Preparar 5 amp (50 ml: 10 g) en 250 ml de SG 5% y pasar en 30 min. (150 mg/Kg en 30 minutos). Perfusión: En las primeras 4 horas, a 50 mg/Kg (2 amp en 500 ml de SG 5% a pasar en 4 horas: 125 ml/h). En las siguientes 16 horas, a 100 mg/Kg (4 amp en 500 ml de SG 5% en 16 horas: 31 ml/h).	HIDONAC ANTÍDOTO 20% FLUMIL 10%
ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)	Metahemoglobinemia en pacientes con déficit G6PDH. Cromo.	IV: 1 g en perfusión lenta, puede repetirse hasta tres veces al día. Cromo: IV 1 g/h durante 10 horas.	VITAMINA C 1 g/5 ml
ÁCIDO FOLÍNICO (VER FOLINATO CÁLCICO)			
ADRENALINA	Resucitación cardiopulmonar. Asma. Anafilaxia	En RCP: 1 mg cada 5 min IV (o ET disuelta en SSF). Resto: IV o SC: 0,3-0,5 mg (diluir en 9 ml de SSF). Niños: 0,01-0,05 mg/Kg SC o IV.	ADRENALINA 1 mg/ml
ALMIDÓN (FÓRMULA MAGISTRAL)	Yodo y derivados.	Preparar una emulsión al 10% para lavado gástrico. Agregar 15 g en 500 ml agua.	Sobres de 10 mg Fórmula Magistral. (80 g por litro de agua)
ANTICUERPOS ANTIDIGOXINA	Digoxina.	Ante niveles plasmáticos desconocidos se aconseja 480 mg iniciales.	DIGIFAB 40 mg (Medicamento Extranjero)
APOMORFINA	Provocación del vómito (emético).		APO-GO PEN 10 mg/ml
ATROPINA SULFATO	Insecticidas organofosforados y carbamatos. Sustancias con acción colinérgica.	Intoxicación por organofosforados: bolo inicial de 0,5-2 mg y luego administrar 1 mg cada 5-10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización (midriasis, taquicardia >120 lpm...).	ATROPINA 1 mg/1 ml
AZUL DE METILENO	Metahemoglobinemia tóxica. Nitritos.	IV: 0.1-0.2 ml/kg solución al 1% lenta en 5 min. Se puede repetir dosis a los 30-60 minutos. Niños idénticas dosis. Máximo 7 mg/kg.	AZUL DE METILENO 1% (Fórmula Magistral)
AZUL DE PRUSIA	Talio.	VO o por SNG: 10 g cada 8 horas emulsionados en 50 ml de Manitol 20% durante 10 días.	
BICARBONATO SÓDICO	Inhalación de cloro, antidepresivos tricíclicos, cardiotóxicos que bloquean la bomba de sodio. Fenotiacinas y salicilatos.	En intoxicación por antidepresivos tricíclicos: 0,5-2 mEq/Kg (50-100 ml de 1 M) en bolo IV en 5-10 minutos. Intentar mantener pH > 7,45.	BICARBONATO SÓDICO 1M 10 mEq/10 ml
BIPERIDENO	Síndromes extrapiramidales por antipsicóticos, neurolépticos, antieméticos, butirofenonas y antihistamínicos.	IV: 1 amp (diluida en 10 ml de SSF) en bolo lento (3 – 5 min). Se puede repetir a los 30 minutos. (máximo: 8 mg/día) Se puede poner IM.	AKINETÓN 5 mg/1 ml

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
BROMURO DE EDROFRONIO	Relajantes musculares (Tracrium®, Nimbex®, Mivacron®, etc)	Preparar 10 mg (0,8 ml) en 10 ml de SSF (1 mg: 1ml). En reversión de relajantes: bolo de 10 mg en 30 segundos, (se puede repetir).	ANTICUDE 25 mg/2 ml
CARBÓN ACTIVADO ADSORBENTE	Adsorción de tóxicos.	VO: 1 g/Kg. Iniciar con 50 g en 300 ml de agua, y posteriormente si precisa 30- 50 g en 150 ml de agua cada 4 horas.	CARBOLIQ 200 mg/ml 250 ml
CARNITINA (L-Carnitina)	Ácido Valproico.	Adultos: 100 mg/kg de L-Carnitina en una única dosis, seguido de infusiones de 50 mg/kg cada 8 horas, por vía iv: administrar en inyección intravenosa directa (2-3 minutos) o en infusión: diluido a concentración de 0,5 mg/mL en suero salino 0,9% o ringer lactato.	CARNICOR 1 g/5 ml
CLORURO SÓDICO	Bromo.		
DANTROLENO	Hipertermia maligna.	IV: 2.5 mg/kg en bolo de 2-3 min repetibles hasta dosis total acumulada 10 mg/kg; tras crisis mantener 1-2 mg/kg/6h en 1-3 días.	DANTRIUM 20 mg (Medicamento Extranjero)
DESFERROXAMINA	Hierro. Toxicidad por aluminio.	IM: 2 mg en 10 ml agua destilada. IV: en casos graves infusión continua 15 mg/kg/h (máx. 80 mg/kg/día).	DESFERIN 500 mg
DIAZEPAM	Cloroquina.	IV: 2 mg/kg en 30 min seguidos de una perfusión continua de 1-2 mg/kg/día manteniendo el tratamiento mínimo 48 horas.	VALIUM
DIMERCAPROL (BAL)	Sales inorgánicas de arsénico, oro, mercurio, antimonio, bismuto, níquel, plomo.	IM: vial 2.5-5 mg/kg/4 h. dos días 2.5 mg/kg/12 h. el tercer día 2.5 mg/kg/24 h. durante 6 días.	BAL 200 mg/2 ml (Medicamento Extranjero)
D-PENICILAMINA (VER PENICILAMINA)	Metales pesados (plomo, arsénico, mercurio, cobre).		CUPRIPEN
EDETATO CÁLCICO DISÓDICO (EDTA)	Plomo, zinc, cadmio, cobalto, oro, mercurio, cobre.	IV: 25-75 mg/kg/día en 500 ml SSF, 2-3 dosis durante 5 días. (Dosis máx. 2 g/día).	CALCIUM EDET SODIUM 500 mg/10 ml (Medicamento Extranjero)
EDTA DICOBÁLTICO	Ácido cianhídrico o sales solubles de cianuro.	IV: 600 mg, repetibles a los 15 min 300 mg.	KELOCYANOR
EMULSIÓN LIPÍDICA INTRAVENOSA (ELI)	Intoxicaciones graves por fármacos muy liposolubles.		S. INTRALIPID 20% 250 ml
ETANOL (ALCOHOL ABSOLUTO)	Metanol, etilenglicol.	IV: diluir en SG hasta el 5-10%, infusión en 15 min de 1ml/kg. Dosis mantenimiento 0.16 ml/kg/h.	ALCOHOL ABSOLUTO 10 ml (Fórmula Magistral)
FISOSTIGMINA	Fármacos o productos con acción anticolinérgica (atropina, hiosciamina, escopolamina, estramonio, belladona)	IV: 0.02 mg/kg en 2 minutos. Repetir cada 30 min o iniciar perfusión IV de 8 mg en 500 ml SG 5% en 4 horas.	ANTICHOLIUM 2 mg/5 ml (Medicamento Extranjero)
FITOMENADIONA (VITAMINA K)	Anticoagulantes cumarínicos. Rodenticidas.	Casos leves: 10 mg IM. Casos graves: 20 mg IM y 20 mg en 50 ml SSF IV.	KONAKION 10 mg/ml

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
FLUMAZENILO (ANEXATE)	Benzodiazepinas.	Bolos IV de 0,25 - 0,50 mg cada minuto hasta obtener respuesta (máximo 6-8 bolos ó 2 mg). Mantenimiento a pasar a 0,1-0,4 mg/h (en adulto de 70 Kg). Preparación de la perfusión: 1 amp en 100 ml de SG 5%.	FLUMAZENIL GES 1 mg/10 ml
FOLINATO CÁLCICO O LEUCOVORINA CÁLCICA (FRIGORÍFICO)	Metotrexato (MTX). Trimetropin (TMP). Pirimetamina (PRM). Metanol.	MTX: 60 mg/ 12 h IV seguidos de 15 mg/6 h VO, durante 5-7 días. TMP: 3-6 mg IV seguidos de 15 mg/día VO, durante 5-7 días. PRM: 6-15 mg IV. Metanol: 50 mg/4 h durante 5 días.	FOLINATO CÁLCICO 50 mg/5 ml (FRIGORÍFICO)
GLUCAGÓN (FRIGORÍFICO)	Bloqueantes B adrenérgicos, antagonistas de calcio e insulina.	IV, SC o IM: 0,5-1 mg (se puede repetir a los 15 minutos). Niños: 0,03-0,1 mg/Kg/dosis (sin pasar de 1 mg/dosis), que se puede repetir si precisa a los 20 minutos.	GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg (FRIGORÍFICO)
GLUCONATO CÁLCICO	Ácido oxálico, ácido fluorhídrico, etilenglicol, magnesio, fluoruros, antagonistas de calcio.	VO: 10-20 mg en 25 ml agua IV: 10 ml sol. 10% lenta que se puede repetir cada 4-6 horas.	SUPLECAL 10% 10 ml
GLUCOSA HIPERTÓNICA	Insulina, antidiabéticos orales e intoxicaciones que cursen con hipoglucemia. Coma de origen desconocido.	IV: 50 ml SG 50% seguidos de perfusión continua con dosis en función de la glucemia.	S. GLUCOSADO 50% 100 ml
HEPARINA SÓDICA	Ácido aminocaproico (CAPROAMIN) o tranexámico.	IV: 30.000-50.000 UI/día.	
HIDROXOCOBALAMINA (VITAMINA B12)	Humo de incendio con sospecha de inhalación de cianhídrico. Cianuro.	IV: inicial 1 g (máximo 4 g). Con 1.800 mg se neutralizan 100 g de cianuro.	CYANOKIT 5 g
ISOPROTERENOL O ISOPRENALINA	Bloqueadores B-adrenérgicos con bradicardia < 50 l/min y TAS <80 mm Hg.	IV: 0.02-0.04 mg/kg/minutos. Puede repetirse la dosis según la clínica.	ALEUDRINA 0.2 mg
JARABE DE IPECACUANA (FÓRMULA MAGISTRAL)	Emético.	VO: 15-30 ml de jarabe seguidos inmediatamente por 240 ml de agua; si no emesis repetir a los 20-30 min; si no se produce la emesis proceder al lavado gástrico. Niños 6 m-1 a: 5-10 ml jarabe seguidos de 60-240 ml de agua. Niños 1- 12 a: 15 ml jarabe seguidos de 120-240 ml agua.	JARABE DE IPECACUANA (Fórmula Magistral)
LACTATO DE SODIO	Salicilatos (alcalinizador orina). Antidepresivos tricíclicos o Fenotiacidas con hipotensión o bloqueo de conducción.	IV: Dosis de 50 ml/ 2-4 horas.	1/6 M de 250 y 500 ml
MAGNESIO SULFATO	Hipomagnesemia por flúor y bario. Fármacos causantes de Torsade de Pointes.	Torsade de Pointes: IV: 1 amp (12 mEq de Mg) en 1-2 min, seguidos de una infusión a 2-20 mg/min.	MAGNESIO SULFATO 15% SULMETIN

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
NALOXONA	Opiáceos. Reversión de los efectos morficomiméticos administrados durante una intervención.	Bolos: 0,4 mg IV (se puede repetir cada 2-3 min hasta 3 ó 4 veces). Perfusión: 3-12 ug/Kg/h (0,2-0,8 mg/h en adulto de 70 Kg). Preparación: 5 amp. en 100 ml de SSF (1 ml: 0,02 mg: 20 ug).	NALOXONA 0,4 mg/1 ml
NEOSTIGMINA (PROSTIGMINA)	Curarizantes, bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, anticolinérgicos.	Anticolinérgicos: 0.25 mg SC. En niños 0.05-0.3 mg/kg. Curarizantes: 0.5-3 mg IV lenta, (máx. 5 mg).	NEOSTIGMINA 2,5 mg/5 ml
NITROPRUSIATO SÓDICO	Ergotamina, metisergida e HTA inducida por altas dosis de clonidina.	IV: 3 mg/kg/min (Dosis máx. 10 mg/kg/min).	
OXÍGENO	Monóxido de carbono. Hipoxia.		
PENICILAMINA	Cobre, oro, mercurio, zinc, plomo, arsénico, magnesio, calcio.	VO: 25 mg/kg/día repartidos en 2-3 dosis (máx. 2 g/día), o 500 mg/6h. Niños: 30-40 mg/kg/día en tres dosis.	CUPRIPEN comp 250 mg SUFORTANON comp 250 mg
PENICILINA G SÓDICA (BENCILPENICILINA) (SILIBILINA)	Amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas.	12.00 u/kg/h cada 4 horas. (Dosis máx. 21.000.000 U/día)	PENIBIOT 2 MU
PERMANGANATO POTÁSICO (FÓRMULA MAGISTRAL)	Estricnina, fósforo.		
PIRIDOXINA (VITAMINA B6)	Isoniazida, etilenglicol, setas convulsivantes.	Intoxicación isoniazida: una dosis de piridoxina igual a la dosis de isoniazida ingerida (1-4 g de piridoxina IV seguido por 1 g IM cada 30 min hasta completar cantidad total).	BENADON 300 mg/2 ml
POLIETILEGLICOL	Laxante osmótico.		CASENGLICOL 70,5 g
PRALIDOXIMA (PAM)	Insecticidas organofosforados y carbamatos.	IV: 1-2 g en 100 ml SSF a pasar en 15-30 minutos. Si es necesario repetir dosis en 1 hora. IM o SC: 1-2 g seguido de 1-2 dosis adicionales si es necesario. En casos severos hasta máx.12 g/24 h. VO: 1-3 g hasta cinco veces al día.	CONTRATHION 200 mg (Medicamento Extranjero)
PRAXBIND (IDARUCIZUMAB)	Anticoagulante Dabigatrán.	Dos viales 50 ml (2 x 2.5 g) constituyen una dosis completa IV: dosis completa de 5 g en dos inyecciones en bolo separadas. Perfusión IV: dosis completa de 5 g en 2 infusiones consecutivas IV durante 5-10 minutos cada una.	PRAXBIND 2,5 g
PROPRANOLOL	Estimulantes B-adrenérgicos que cursen con arritmias cardíacas.	IV: 1-2 mg/min lentos, se puede repetir cada 2 min hasta 5-10 mg. Dosis máxima en niños 1 mg. VO: 40 mg/ 6-8 h. En niños 1-4 mg/kg/día en 4 dosis.	SUMIAL

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
PROTAMINA SULFATO (FRIGORÍFICO)	Heparina.	IV: 1 mg lento neutraliza sobre las 100 UI de Heparina si se administra en los primeros 15 min tras la administración de la misma. Pasados los 30 min la dosis de Protamina debe de ser de 0,5 mg por cada 100 UI de Heparina administrada. Dosis máxima: 50 mg (1 vial) Controlar el TTPA y el tiempo de protrombina a los 10-15 minutos.	PROTAMINA 1% 50 mg/5 ml (FRIGORÍFICO)
SILIBILINA	Amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas.	IV: perfusión en dos horas de 20-50 mg/kg/día en SG 5% o SSF divididos en 4 dosis.	LEGALON
SUERO ANTIBOTULÍNICO	Toxina Clostridium Botulínico.	IM o SC: 0.5-1 ml/kg a una dilución 1:10 en SSF.	
SUERO ANTIOFÍDICO	Mordedura de víboras.	SC o IM: 0.1 ml pudiéndose repetir 0.25 ml a los 15 minutos. IV: 4.65 ml en 500 ml SSF en perfusión 4 horas.	SNAKE VENOM ANTISERUM
SULFATO DE COBRE 1%	Fósforo elemental.		
SULFATO DE MAGNESIO	Sales de Bario		
TIOSULFATO SÓDICO	Cianuro, Nitroprusiato		
TIERRA DE FULLER	Paraquat y Diquat.	200 ml de suspensión al 30% de tierra de Fuller en agua en las primeras 2 horas posteriores a la ingesta. Se debe continuar el suministro oral de suspensión al 30% de tierra de Fuller cada 8 horas, por lo menos 48 horas	
YODO	Yodo radioactivo.		