

SARNA O ESCABIOSIS

J.T. Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La sarna humana está producida por el ácaro *Sarcoptes Scabiei*, tiene distribución mundial, siendo más frecuente en climas tropicales y subtropicales, su aparición en brotes se puede presentar en el ámbito familiar, residencias de tercera edad, albergues, centros de acogida, instituciones de desintoxicación de drogodependencias, etc.

El cuadro clínico característico incluye prurito y lesiones en la piel como los surcos acarinos, vesículas y nódulos. Produciendo complicaciones por las reacciones inflamatorias y lesiones dérmicas por el rascado.

En personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas, pacientes ancianos o institucionalizados, la infestación puede ser generalizada y grave como una dermatitis con una distribución más amplia, con descamación, vesículas y costras conocida como sarna noruega o sarna costrosa, siendo esta una forma grave y altamente contagiosa de sarna, presentado una rápida multiplicación de ácaros vivos hasta un millón.

El ácaro es un parásito obligado que penetra la piel humana, reside y se reproduce en la piel.

DIAGNÓSTICO

Es principalmente clínico y se confirma con estudio microscópico de la epidermis: raspados cutáneos, a veces en el raspado cutáneo no se llega a evidenciar el parásito, sin poder descartar la sarna, el dermatoscopio y los análisis de sangre pueden ayudar al diagnóstico: en la analítica de sangre se observa eosinofilia y aumento de niveles séricos de anticuerpos IgE.

El síntoma principal es el prurito, que aumenta por la noche, llegando a interrumpir el sueño y erupciones cutáneas, como los surcos acarinos de unos milímetros de longitud en la epidermis, principalmente en las zonas laterales de los dedos, pliegues de la piel y en las nalgas. También existen pápulas dispersas y edematosas, erosiones, costras y excoriaciones como consecuencia del rascado. Las manifestaciones son intensas en personas inmunodeprimidas, con higiene deficiente o con dermatitis atópica. Puede presentarse en diversas etapas de la vida: niños, jóvenes y ancianos y en función del estado inmunológico, con diferentes variantes clínicas.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser simultáneo en todo el núcleo familiar y en las parejas sexuales, independientemente de la presencia de síntomas. En ancianos y niños pequeños, las cremas también deben aplicarse en la cabeza, excluyendo el área alrededor de la boca y de los ojos.

Las cremas se aplican después de una ducha de >10 min de duración, para mejorar la penetración del fármaco en la epidermis. La crema se debe untar con rigurosidad por todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, con especial atención en los pliegues, espacios interdigitales, área genital y espacios subungueales.

El tratamiento de la sarna consiste:

- **Permetrina crema al 5%:** deberá de permanecer en contacto con la piel entre 8 a 14 horas, luego ducharse. El tratamiento puede repetirse después de 7-14 días, ósea 2 aplicaciones separadas de al menos una semana.
- **Ivermectina** vía oral en dos dosis con 1 semana de intervalo. La posología recomendada es de 200 microgramos/ Kg de peso corporal.
- **Vaselina Azufrada 8 %(6-10 %):** fórmula magistral. Aplicarlo durante 3 noches seguidas y repetir a la semana. Se recomienda:
 - Ducharse con agua templada por la tarde/noche y esperar 1h para aplicarse la crema, con el cuerpo seco.

- Aplicar por todo el cuerpo, excepto cara y cuero cabelludo. Desde mandíbula hacia abajo con especial atención: detrás de las orejas, genitales, uñas cortas y aplicarse debajo de las uñas y región interdigital de mano y pies, tobillos, región interglútea. Formulación muy segura, se puede utilizar en embarazadas y en niños pequeños.

- Antihistamínicos vía oral. Para aliviar el prurito. Atarax, Cetirizina, etc.

BIBLIOGRAFÍA

- https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_escabiosis_octubre2022.pdf
- <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-piel/infecciones-cut%C3%A1neas-parasitarias/infestaci%C3%B3n-por-sarna>
- <https://empendium.com/manualmibe/compendio/chapter/B34.II.18.1.21.104.36.3>.
- Ficha técnica Perme-cure 50 mg/g crema: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/64052/FT_64052.pdf
- Ficha técnica IVERMECTINA TEVA 3 MG COMPRIMIDOS: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/88545/FT_88545.html
- https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_osaesk_sarna/eu_def/adjuntos/Sarna-VASELINA-AZUFRADE-castellano-.pdf