

BOMBAS DE PERFUSIÓN

J.T. Camino A.

ACETILCISTEÍNA

Fluimucil antídoto 20%. Vial 2g/10 ml (200 mg/ml)

Dosis

- **Adultos y adolescentes (> 40 kg de peso corporal)**

Primera perfusión en 1 hora: 150 mg/kg en 200 ml de solución durante 1 hora.

Segunda perfusión en 4 horas: 50 mg/kg en 500 ml durante las 4 horas siguientes.

Tercera perfusión en 16 horas: 100 mg/kg en 1000 ml durante las 16 horas siguientes.

- **Niños**

Los niños se deben tratar con las mismas dosis y pauta que los adultos. Sin embargo, el volumen de solución a perfundir debe modificarse tomando en consideración la edad del paciente y el peso corporal debido al posible riesgo de congestión vascular pulmonar por sobrecarga de fluidos.

El ciclo completo de tratamiento con acetilcisteína comprende 3 perfusiones intravenosas consecutivas:

Primera perfusión: 150 mg/kg de peso corporal en perfusión durante 1 hora (150 mg/kg/h), administrada como solución de 50 mg/ml a una velocidad de 3 ml/kg/h.

Segunda perfusión: 50 mg/kg de peso durante 4 horas (12,5 mg/kg/h), administrada como solución de 6,25 mg/ml a una velocidad de 2 ml/kg/h.

Tercera perfusión: 100 mg/kg de peso corporal en perfusión durante 16 horas (6,25 mg/kg/h), administrada como solución de 6,25 mg/ml a una velocidad de 1 mg/kg/h.

Preparación de la solución

1ª dosis. Preparar una solución de 50 mg/ml. Diluir 10 ml de acetilcisteína (200 mg/ml) con 30 ml de glucosa al 5% o cloruro de sodio al 0,9% para obtener un volumen total de 40 ml.

2ª dosis. Preparar una solución de 6,25 mg/ml. Diluir 10 ml de acetilcisteína (200 mg/ml) con 310 ml de glucosa al 5% o cloruro de sodio al 0,9% para obtener un volumen total de 320 ml.

3ª dosis. Preparar una solución de 6,25 mg/ml. Diluir 10 ml de acetilcisteína (200 mg/ml) con 310 ml de glucosa al 5% o cloruro de sodio al 0,9% para obtener un volumen total de 320 ml. Precaución no administrar junto con antibióticos tipo antibióticos β -lactámicos

Vía de administración

- Vía IV como perfusión.

Indicaciones

- Tratamiento en intoxicación por paracetamol y tetracloruro de carbono.

ACETILSALICILATO DE LISINA

Inyesprin® vial 900 mg + 5 ml de agua (180 mg/ml).

(Equivalente a 500 mg de A.A.S.)

Dosis

- Adultos: administrar un vial de 1 a 3 veces al día. Máximo 4 viales/día.
- Niños: 20 a 50 mg/Kg/día. No usar por vía intravenosa en niños.

Vía de administración

- Vía IM profunda, IV directa, o bien en perfusión IV con solución de cloruro sódico 0,9%, glucosa, o sorbitol.
- Dosis IV: 900 - 1800 mg diluido en 100 ml de suero fisiológico 0,9% a pasar en 15 minutos.

Indicaciones

- Dolores reumáticos, neurálgicos, post-traumáticos, post-operatorios, post-parto y neoplásicos. Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.
- Prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica.
- Fiebre de cualquier causa
- Tratamiento del dolor en pleuritis y pericarditis

BIBLIOGRAFÍA

Ficha técnica del medicamento: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>