

ESCALA CHA₂DS₂-VASC

	Factor de riesgo	Puntos
C	INSUFICIENCIA CARDÍACA • Diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca congestiva • Signos/síntomas de IC • Evidencia objetiva de FEVI reducida (<40%) • Miocardiopatía hipertrófica	+1
H	HIPERTENSIÓN ARTERIAL • Diagnóstico previo con o sin tratamiento	+1
A	EDAD • ≥ 75 años	+2
D	DIABETES MELLITUS • Diagnóstico previo con o sin tratamiento	+1
S	FENÓMENOS TROMBOEMBOLICOS • ACV • AIT • Otros fenómenos tromboembolicos	+2
V	ENFERMEDAD VASCULAR • Infarto de miocardio previo • Enfermedad arterial periférica • Placas aórticas evidenciadas en pruebas de imagen	+1
A	EDAD ≥ 65 años • 65 a 74 años	+1
Sc	Categoría de SEXO Mujer (femenino)*	+1

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardíaca.

*El sexo femenino, no debe considerarse tanto un factor de riesgo, sino más bien un factor favorecedor.

- CHA₂DS₂-VASC: 0 = No se recomienda anticoagulación
- CHA₂DS₂-VASC: 1 = Se debe de considerar anticoagulación
- CHA₂DS₂-VASC: 2 = Se recomienda anticoagulación

BIBLIOGRAFÍA

- Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración de la European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).