

CLASIFICACIÓN MODIFICADA CHILD-PUGH

J.T. Camino A.

Parámetros y puntos asignados

Parámetros	1	2	3
Ascitis	• Ausente	• Leve	• Moderada
Bilirrubina (mg/dL)	• ≤ 2	• 2 - 3	• 3
Albúmina (g/dL)	• $> 3,5$	• 2,8 - 3,5	• $< 2,8$
Tiempo de protrombina Segundos sobre el control INR	• 1 - 3 • $< 1,8$	• 4 - 6 • 1,8 - 2,3	• > 6 • $> 2,3$
Encefalopatía	• No	• Grado 1 - 2	• Grado 3 - 4

La clasificación de Child-Pugh modificada para determinar la severidad de enfermedad hepática se realiza según: grado de ascitis, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina y albúmina, el tiempo de protrombina y el grado de encefalopatía.

Grado	Puntos	Sobrevida al año (%)	Sobrevida a los 2 años (%)
A. Enfermedad bien controlada	• 5 - 6	• 100	• 85
B. Compromiso funcional significativo	• 7 - 9	• 80	• 60
C. Enfermedad descompensada	• 10 - 15	• 45	• 35

La puntuación total de 5-6 se considera grado A (enfermedad bien compensada), puntuación total 7 - 9 grado B (compromiso funcional significativo), puntuación total 10 - 15 grado C (enfermedad descompensada).

Creado en el año 1964 por Child y Turcotte con la finalidad de estratificar el riesgo quirúrgico en pacientes con descompensación portal, posteriormente modificada por Pugh en el año 1972 cambiando el parámetro de nutricional por el tiempo de protrombina. Es de fácil uso y ampliamente utilizada para clasificar el grado de disfunción hepática en hepatopatías.

BIBLIOGRAFÍA

<https://meiga.info/escalas/child-pugh.pdf>