

ESCALA DE ICTUS DEL NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIS STROKE SCALE) NIHSS

1a. Nivel de conciencia	• 0 • 1 • 3 • 4	• Alerta • Somnolencia: reacciona con una estimulación mínima • Obnubilado-Estuporoso: precisa estimulación repetida para reaccionar • Coma
1b. Preguntas verbales	• 0 • 1 • 2	• Ambas preguntas correctas • Una respuesta correcta (también si disartria severa o barrera lingüística) • Ninguna respuesta correcta (afásico o estuporoso)
1c. Órdenes motoras	• 0 • 1 • 2	• Ambos movimientos correctos • Un movimiento correcto • Ambos movimientos incorrectos
2. Movimiento ocular Movimientos horizontales: voluntarios o reflejos oculocefálicos	• 0 • 1 • 2	• Normal • Parálisis parcial (también si paresia de un oculomotor: III, IV, VI) • Desviación forzada o parálisis total de la mirada que no vence con maniobras oculocefálicas
3. Campo visual	• 0 • 1 • 2 • 3	• Normal • Hemianopsia parcial (cuadrantanopsia o extinción visual) • Hemianopsia completa homónima • Hemianopsia bilateral (incluye ceguera de cualquier causa)
4. Parálisis facial	• 0 • 1 • 2 • 3	• Normal • Paresia leve (borramiento surco nasogeniano, asimetría al sonreír) • Parálisis parcial: parálisis casi total de la parte inferior de la cara • Parálisis completa (superior e inferior) en un lado o ambos
5. Motor brazos 5a: derecho, 5b: izquierdo Extensión del brazo (45º en decúbito, 90º en sedestación) 9: no computa	• 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 9	• Normal. Mantiene la posición 10 segundos • Claudica en menos de 10 segundos sin llegar a caer del todo • Cae del todo. Se observa cierto esfuerzo contra gravedad • Hay movimiento pero no vence la gravedad • Parálisis completa. No hay movimiento • Extremidad amputada o inmovilizada

6. Motor piernas 6a: derecho, 6b: izquierdo En posición supina, pierna elevada 30º 9: no computa	• 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 9	• Normal. Mantiene la posición 5 segundos • Claudica en menos de 5 segundos sin llegar a caer del todo • Caer del todo. Se observa cierto esfuerzo contra gravedad • Hay movimiento pero no vence la gravedad • Parálisis completa. No hay movimiento • Extremidad amputada o inmovilizada
7. Ataxia miembros Dedo nariz y talón rodilla 9: no computa	• 0 • 1 • 2 • 9	• No hay ataxia. Normal, plejía de la extremidad o afasia comprensión • Ataxia de una extremidad • Ataxia de dos extremidades • Amputación de la extremidad o inmovilización
8. Sensibilidad	• 0 • 1 • 2	• Normal • Leve o moderada hipoestesia • Pérdida total de sensibilidad (déficit bilateral o coma)
9. Lenguaje Coma: 3 Si intubado o anartria: explorar escritura	• 0 • 1 • 2 • 3	• normal • Afasia leve o moderada: dificultades en el habla y/o comprensión, pero se identifica lo que quiere decir • Afasia severa: comunicación mínima (Afasia de Broca, de Wernicke, transcortical...) • Afasia global, mutismo (o coma): no hay posibilidad de hablar no de comprender
10. Disartria 9: no computa	• 0 • 1 • 2 • 3	• Articulación normal • Disartria leve-moderada: se le puede entender • Disartria severa: ininteligible o anartria (también si no responde y en coma) • Intubado
11. Extinción y negligencia	• 0 • 1 • 2	• Normal • Inatención/extinción en una modalidad sensorial • Hemi-extinción severa o negligencia frente a más de un estímulos (también asomatognosia)

Puntuación total

Brott T et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke 1989;220:864-870