

ESCALA DE FINE (PSI). EVALÚA LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.

J.T. Camino Acha.

• Edad • Varones • Mujeres • Asilo/residencia	• Años • Años-10 • +10
• Comorbilidades • Neoplasia • Hepatopatía • Insuficiencia cardíaca congestiva • Accidente cerebrovascular • Nefropatía	• +30 • +20 • +10 • +10 • +10
• Signos clínicos • Alteración del estado mental • Frecuencia respiratoria >30 rpm • Temperatura < 35°C o > 40°C • PAS sistólica < 90 mmHg • Pulso > 125 lpm	• +10 • +20 • +20 • +15 • +10
• Alteraciones laboratorio • BUM > 30 mg/dl. • Na < 130 nmol/dl. • Glucosa > 250 mg/dl • Hematocrito < 30%	• +20 • +20 • +10 • +10
• Alteraciones radiológicas • Derrame pleural	• +10
• Oxigenación • pH arterial < 7,35 • PaO2 <60 mmHg	• +30 • +30

La escala de Fine, identifica 5 clases de riesgo: la clase I, II y III se considera de bajo riesgo pudiendo ser tratados de forma ambulatoria o en áreas de corta estancia. Clase IV y V se considera de alto riesgo y deben de hospitalizarse.

Estrato de riesgo	Puntuación	Mortalidad
• I • II • III • IV • V	• < 50 puntos • 51 - 70 • 71 - 90 • 91 - 130 • > 130	• 0,1 • 0,6 • 2,8 • 8,2 • 29,2

BIBLIOGRAFÍA

- https://www.iqb.es/criterios/neumonia_adquirida01.htm

