

FÓRMULA DE PARKLAND

J.T. Camino Acha.

La fórmula de Parkland se utiliza para calcular la cantidad de líquidos que se necesita reponer en 24h en un paciente que sufre quemaduras graves.

Del total de líquido a reponer el 50% en las primeras 8 horas y el 50% en 16 horas siguientes. Es la fórmula más utilizada y debe de usarse de forma orientativa y basarse en parámetros fisiológicos como la producción de orina, tensión arterial y pulso.

Formula de Parkland: $(4 \text{ ml} \times \text{kg de peso} \times \% \text{ SCQ}) + \text{necesidades basales}$.

8 primeras horas: 50% del volumen total a reponer

16 horas siguientes: 50% del volumen total a reponer

SCQ: superficie corporal quemado

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/multimedia/clinical-calculator/reanimaci%C3%B3n-con-l%C3%ADquidos-de-las-lesiones-de-quemadura-adultos-estimaciones-de-cristaloides-seg%C3%BAn-f%C3%B3rmula-de-parkland>
- Burns. 2016 Aug;42(5):953-1021. doi: 10.1016/j.burns.2016.05.013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27542292/>