

**ESCALA HAS-BLED***J.T. Camino Acha.*Escala HAS-BLED para calcular el riesgo hemorrágico del paciente con fibrilación auricular.

|                      | Característica clínica                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puntuación                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>H</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>HTA</b> (PAS &gt; 160 mmHg)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>     |
| <b>A</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Función renal o hepática alterada</b> (Creatinina &gt; 2 mg/dl, diálisis o trasplante renal, cifras de bilirrubina &gt; 2 veces el límite de la normalidad o enzimas hepáticas: AST; ALT &gt; 3 veces el límite superior de la normalidad)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 o 2</li> </ul> |
| <b>S</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ictus (Stroke)</b>: antecedente de ictus previo</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>     |
| <b>B</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hemorragia (Bleeding)</b>: antecedente de sangrado previo</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>     |
| <b>L</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>INR lábil</b> (&lt; 60% TTR): solo aplicable a tratamiento con antagonistas de vit K</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>     |
| <b>E</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Edad</b> &gt; 65 años</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>     |
| <b>D</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fármacos (Drugs) o Alcohol</b> en exceso: incluye los fármacos que puedan interferir con la warfarina/acenocumarol en el riesgo de sangrado, como antiinflamatorios no esteroideos, antiplaquetarios, corticoides, ISRS, etc.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 o 2</li> </ul> |
| <b>Clasificación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bajo</b> riesgo: 0-1</li> <li><b>Moderado</b> riesgo: 2</li> <li><b>Alto</b> riesgo: ≥ 3</li> </ul>                                                                                                                                                   | Puntuación máxima 9                                     |

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato transaminasa; HTA: hipertensión arterial; INR: cociente internacional normalizado; ISRS: inhibidores de la recaptación de serotonina; PAS: presión arterial sistólica; TTR: tiempo en rango terapéutico; Vit K: vitamina K.

La escala HAS-BLED presenta mayor poder predictivo de hemorragia intracraneal en comparación con otros esquemas de riesgo hemorrágico. Esta validado para predecir riesgo de sangrado con anticoagulantes directos, también para predecir el riesgo hemorrágico durante la terapia puente a intervencionismo coronario percutáneo en pacientes con y sin fibrilación auricular.

**BIBLIOGRAFÍA**

- Pérez-Copetea. J, Esteve-Pastora. M. A, Roldánb. V, Mariano Valdésa. M, Marín. F. Revista española de cardiología Supl. 2016;16(A):25-32. Fibrilación auricular. Escalas de evaluación del riesgo tromboembólico y hemorrágico en la fibrilación auricular. <https://www.revespcardiol.org/es-escalas-evaluacion-del-riesgo-tromboembolico-articulo-S1131358716300115#:~:text=El%20acr%C3%B3nimo%20HAS%20DBLED%20representa,2%20veces%20el%20I%C3%ADmite%20de>
- <https://www.revespcardiol.org/es-pdf-S1131358716300115>