

ÍNDICE DE KATZ

Julio T. Camino A.

INTRODUCCIÓN

• 1 Baño	• Independiente. Se baña enteramente solo o bien requiere ayuda únicamente en alguna zona concreta (por ejemplo espalda). • Dependiente. Necesita ayuda para lavarse en más de una zona del cuerpo o bien para entrar o salir de la bañera o ducha
• 2 Vestido	• Independiente. Coge la ropa y se la pone él solo, puede abrocharse (se excluye atarse los zapatos o ponerse las medias). • Dependiente. No se viste por sí mismo, o permanece parcialmente vestido.
• 3 Uso del WC	• Independiente. Va al WC solo, se arregla la ropa, se limpia él solo. • Dependiente. Precisa ayuda para ir al WC y/o para limpiarse.
• 4 Movilidad	• Independiente. Se levanta y se acuesta de la cama él solo, se levanta y se sienta de una silla él solo, se desplaza solo. • Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y/o acostarse, de la cama y/o de la silla. Necesita ayuda para desplazarse o no se desplaza.
• 5 Continencia	• Independiente. Control completo de la micción y defecación. • Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o defecación.
• 6 Alimentación	• Independiente. Come solo, lleva alimento solo desde el plato a la boca (se excluye cortar los alimentos) • Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come solo o requiere alimentación enteral.

- A: Independiente para todas las funciones.
- B: Independiente para todas menos una cualquiera.
- C: Independiente para todas menos baño y otra cualquiera.
- D: Independiente para todas menos baño, vestido y otra cualquiera.
- E: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC y otra cualquiera.
- F: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC, movilidad y otra cualquiera.
- G: Dependiente en todas las funciones.

El índice de Katz, es un instrumento que ayuda a valorar el grado de independencia o dependencia de un paciente en relación a las actividades básicas de la vida diaria, esta escala se puede aplicar directamente al paciente o familiares, consta de 6 apartados o ítems (baño, vestido, uso del WC, movilidad, continencia y alimentación), cada uno de ellos evalúa la independencia o dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria mediante una escala alfabética jerarquizada que consta desde la A, B, C, D, E, F y G. Es la escala más adecuada para la valoración funcional del anciano, es parecida al índice

de Barthel.

BIBLIOGRAFÍA

- Katz S., Ford AB, Moskowitz RW et al.: Studies of illness in the age: The index of ADL, a standarized measure of biological and psychosocial function. JAMA 1963; 185: 914-919