

## CHAPITRE 3

## ARITHMÉTIQUE

Certaines solutions sont données sans justification, la lectrice studieuse est donc encouragée à chercher ces justifications manquantes. Par ailleurs, certaines solutions sont potentiellement non-optimales.

**Exercice 3.1**

1. Le nombre recherché est 1622.
2. La précédente date contenant 8 chiffres différents est le 25 06 1987.

**Exercice 3.2**

1.  $100001 = 101 \times 990 + 11$ .
2.  $656665 = 11 \times 59696 + 9$ .
3.  $66227 = 13 \times 5094 + 5$ .

**Exercice 3.3**

- Le reste de 12079233 dans la division par 75968 est 321.  
Le reste de 12079233 dans la division par 159 est 3.

**Exercice 3.4**

On sait que

$$S_n = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2}$$

Lorsque  $n$  est pair,

$$S_n = n \times \frac{n}{2} + \frac{n}{2}$$

donc le reste de la division euclidienne de  $S_n$  par  $n$  est  $\frac{n}{2}$ .

Lorsque  $n$  est impair,

$$S_n = n \frac{n+1}{2}$$

donc le reste de la division euclidienne de  $S_n$  par  $n$  est nul.

**Exercice 3.5**

1.
  - Si  $n$  est pair, alors  $2 \mid n$ , donc  $2 \mid n(n+1)$ .
  - Si  $n$  est impair, alors  $2 \mid n+1$ , donc  $2 \mid n(n+1)$ .
2.
  - Si  $n \equiv 0 \pmod{3}$ , alors  $3 \mid n$ , donc  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ .
  - Si  $n \equiv 1 \pmod{3}$ , alors  $3 \mid n+2$ , donc  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ .
  - Si  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , alors  $3 \mid n+1$ , donc  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ .
3.
  - Si  $n \equiv 0 \pmod{4}$ , alors  $4 \mid n$  et  $2 \mid n+2$ , donc  $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ .
  - Si  $n \equiv 1 \pmod{4}$ , alors  $4 \mid n+3$  et  $2 \mid n+1$ , donc  $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ .
  - Si  $n \equiv 2 \pmod{4}$ , alors  $4 \mid n+2$  et  $2 \mid n$ , donc  $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ .
  - Si  $n \equiv 3 \pmod{4}$ , alors  $4 \mid n+1$  et  $2 \mid n+3$ , donc  $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ .

**Exercice 3.6**

1. Montrons, par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ , la propriété  $\mathcal{P}(n) = \ll 4^{4n+2} - 3^{n+3} \equiv 0 \pmod{11} \gg$ .

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ , on a

$$4^2 - 3^3 = -11 \equiv 0 \pmod{11}$$

La propriété  $\mathcal{P}$  est donc initialisée.

**Hérédité :** Supposons la propriété  $\mathcal{P}(n)$  vraie pour un entier naturel  $n$ . Alors

$$4^{4n+2} - 3^{n+3} \equiv 0 \pmod{11}$$

On a alors

$$4^{4(n+1)+2} - 3^{(n+1)+3} = 4^4 \times 4^{4n+2} - 3 \times 3^{n+3}$$

Or  $4^4 \equiv 3 \pmod{11}$ , car  $256 = 11 \times 23 + 3$ , donc

$$4^{4(n+1)+2} - 3^{(n+1)+3} \equiv 3(4^{4n+2} - 3^{n+3}) \pmod{11}$$

Par hypothèse de récurrence,

$$4^{4(n+1)+2} - 3^{(n+1)+3} \equiv 3 \times 0 \equiv 0 \pmod{11}$$

Ainsi, la propriété  $\mathcal{P}$  est héréditaire.

**Conclusion :** La propriété  $\mathcal{P}$  est initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel  $n$ .

2. Montrons, par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ , la propriété  $\mathcal{P}(n) = \ll 3 \times 5^{2n+1} + 2^{3n+1} \equiv 0 \pmod{17} \gg$ .

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ , on a

$$3 \times 5 + 2 = 17 \equiv 0 \pmod{17}$$

La propriété  $\mathcal{P}$  est donc initialisée.

**Hérédité :** Supposons la propriété  $\mathcal{P}(n)$  vraie pour un entier naturel  $n$ . Alors

$$3 \times 5^{2n+1} + 2^{3n+1} \equiv 0 \pmod{17}$$

On a alors

$$3 \times 5^{2(n+1)+1} + 2^{3(n+1)+1} = 3 \times 5^2 \times 5^{2n+1} + 2^3 \times 2^{3n+1}$$

Or  $5^2 \equiv 8 \pmod{17}$ , donc

$$3 \times 5^2 \times 5^{2n+1} + 2^3 \times 2^{3n+1} \equiv 8(3 \times 5^{2n+1} + 2^{3n+1}) \pmod{17}$$

Par hypothèse de récurrence,

$$3 \times 5^{2(n+1)+1} + 2^{3(n+1)+1} \equiv 8 \times 0 \equiv 0 \pmod{17}$$

Ainsi, la propriété  $\mathcal{P}$  est héréditaire.

**Conclusion :** La propriété  $\mathcal{P}$  est initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel  $n$ .

**Exercice 3.7**

Montrons, par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ , la propriété  $\mathcal{P}(n) = \ll 40^n n! \mid (5n)! \gg$ .

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ , on a

$$\begin{aligned} 40^0 0! &= 1 \\ (5 \times 0)! &= 1 \end{aligned}$$

Donc  $40^0 0! \mid (5 \times 0)!$ .

**Hérédité :** Supposons la propriété  $\mathcal{P}(n)$  vraie pour *un* entier naturel  $n$ . Alors

$$40^n n! \mid (5n)!$$

On a alors

$$40^{n+1} (n+1)! = 40 \times (40^n n!) \times (n+1)$$

Et

$$(5(n+1))! = (5n)! \times (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)(5n+5)$$

Par hypothèse de récurrence, il suffit de montrer que  $40(n+1) \mid (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)(5n+5)$ .

- Par 3.5.3,  $8 \mid (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)$ . Donc

$$8 \mid (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)(5n+5)$$

- De plus,  $5n+5 = 5(n+1)$ , donc

$$5 \mid (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)(5n+5)$$

et

$$(n+1) \mid (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)(5n+5)$$

Ainsi,

$$40(n+1) = 8 \times 5 \times (n+1) \mid (5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)(5n+5)$$

Enfin,

$$40^{n+1} (n+1)! \mid (5(n+1))!$$

Donc la propriété  $\mathcal{P}$  est héréditaire.

**Conclusion :** La propriété  $\mathcal{P}$  est initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel  $n$ .

**Exercice 3.8**

1. On a, pour tout entier
- $n$
- ,

$$2n - 3 = 2 \times (n - 2) + 1$$

On cherche donc  $n$  tel que  $n - 2 \mid 1$ , comme 1 n'a pour diviseurs que  $\pm 1$ , on a

$$n - 2 = -1 \iff n = 1$$

$$n - 2 = 1 \iff n = 3$$

2. On a, pour tout entier
- $n$
- ,

$$3n - 7 = 3 \times (n - 4) + 5$$

On cherche donc  $n$  tel que  $n - 4 \mid 5$ , comme 5 n'a pour diviseurs que  $\pm 1$  et  $\pm 5$ , on a

$$n - 4 = -5 \iff n = -1$$

$$n - 4 = -1 \iff n = 3$$

$$n - 4 = 1 \iff n = 5$$

$$n - 4 = 5 \iff n = 9$$

**Exercice 3.9**

1. On a

$$x^2 - y^2 = 1 \iff (x + y)(x - y) = 1$$

Donc  $x + y = x - y = \pm 1$ . Ainsi, la solution (dans  $\mathbb{N}$ ) est  $(1, 0)$ .

2. On a

$$xy = x + y \iff (1 - x)(1 - y) = 1$$

Donc  $1 - x = 1 - y = \pm 1$ . Ainsi, les solutions sont  $(0, 0)$  et  $(2, 2)$ .

3. On a

$$xy = 2x + 2y \iff (2 - x)(2 - y) = 4$$

Donc  $2 - x \in \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$ , donc  $x \in \{-2, 0, 1, 3, 4, 6\}$ . Les solutions sont donc  $(0, 0)$ ,  $(3, 6)$ ,  $(4, 4)$  et  $(6, 3)$ .

4. On a

$$2xy = x + y \iff (1 - 2x)(1 - 2y) = 1$$

Donc  $1 - 2x = 1 - 2y = \pm 1$ . Ainsi les solutions sont  $(0, 0)$  et  $(1, 1)$ .

**Exercice 3.10**

- 1.

$n \pmod{4}$	0	1	2	3
$2^n \pmod{5}$	2	4	8	1

- 2.

$n \pmod{6}$	0	1	2	3	4	5
$3^n \pmod{7}$	3	2	6	4	5	1

3. Comme
- $38 \equiv 3 \pmod{7}$
- ,
- $38^n \equiv 3^n \pmod{7}$
- , ainsi

$n \pmod{6}$	0	1	2	3	4	5
$38^n \pmod{7}$	3	2	6	4	5	1

**Exercice 3.11**

1. On conjecture, en faisant le calcul pour de petites valeurs de  $n$ , que  $4^n + 2^n + 1$  est divisible par 7 si et seulement si  $n$  n'est pas un multiple de 3. Montrons cette conjecture :

- Si  $n \equiv 0 \pmod{3}$ , alors  $4^n \equiv 1 \pmod{7}$  et  $2^n \equiv 1 \pmod{7}$ . Donc

$$4^n + 2^n + 1 \equiv 3 \pmod{7}$$

Donc  $4^n + 2^n + 1$  n'est pas divisible par 7.

- Si  $n \equiv 1 \pmod{3}$ , alors  $4^n \equiv 4 \pmod{7}$  et  $2^n \equiv 2 \pmod{7}$ . Donc

$$4^n + 2^n + 1 \equiv 7 \equiv 0 \pmod{7}$$

Donc  $4^n + 2^n + 1$  est divisible par 7.

- Si  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , alors  $4^n \equiv 2 \pmod{7}$  et  $2^n \equiv 4 \pmod{7}$ , donc

$$4^n + 2^n + 1 \equiv 7 \equiv 0 \pmod{7}$$

Donc  $4^n + 2^n + 1$  est divisible par 7.

2. On conjecture que  $9^n + 3^n + 1$  est divisible par 13 si et seulement si  $n$  n'est pas un multiple de 3.

- Si  $n \equiv 0 \pmod{3}$ , alors  $9^n \equiv 1 \pmod{13}$  et  $3^n \equiv 1 \pmod{13}$ . Donc

$$9^n + 3^n + 1 \equiv 3 \pmod{13}$$

Donc  $9^n + 3^n + 1$  n'est pas divisible par 13.

- Si  $n \equiv 1 \pmod{3}$ , alors  $9^n \equiv 9 \pmod{13}$  et  $3^n \equiv 3 \pmod{13}$ . Donc

$$9^n + 3^n + 1 \equiv 13 \equiv 0 \pmod{13}$$

Donc  $9^n + 3^n + 1$  est divisible par 13.

- Si  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , alors  $9^n \equiv 3 \pmod{13}$  et  $3^n \equiv 9 \pmod{13}$ . Donc

$$9^n + 3^n + 1 \equiv 13 \equiv 0 \pmod{13}$$

Donc  $9^n + 3^n + 1$  est divisible par 13.

3. On conjecture que  $25^n + 5^n + 1$  est divisible par 31 si et seulement si  $n$  n'est pas un multiple de 3.

- Si  $n \equiv 0 \pmod{3}$ , alors  $25^n \equiv 25 \pmod{31}$  et  $5^n \equiv 5 \pmod{31}$ . Donc

$$25^n + 5^n + 1 \equiv 3 \pmod{31}$$

Donc  $25^n + 5^n + 1$  n'est pas divisible par 31.

- Si  $n \equiv 1 \pmod{3}$ , alors  $25^n \equiv 25 \pmod{31}$  et  $5^n \equiv 5 \pmod{31}$ . Donc

$$25^n + 5^n + 1 \equiv 31 \equiv 0 \pmod{31}$$

Donc  $25^n + 5^n + 1$  est divisible par 31.

- Si  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , alors  $25^n \equiv 5 \pmod{31}$  et  $5^n \equiv 25 \pmod{31}$ . Donc

$$25^n + 5^n + 1 \equiv 31 \equiv 0 \pmod{31}$$

Donc  $25^n + 5^n + 1$  est divisible par 31.

**Exercice 3.12**

- Si  $n$  est pair, alors  $7^n \equiv 1 \pmod{8}$ , donc  $7^n + 1 \equiv 2 \pmod{8}$ .
- Si  $n$  est impair, alors  $7^n \equiv 7 \pmod{8}$ , donc  $7^n + 1 \equiv 0 \pmod{8}$ .

**Exercice 3.13**

Soit  $n$  un entier relatif. On a

$$(n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3 = n^3 - 3n^2 + 3n - 1 + n^3 + n^3 + 3n^2 + 3n + 1 = 3n^3 + 6n = 3n(n^2 + 2)$$

Ainsi il suffit de montrer que, pour tout entier relatif  $n$ ,  $n(n^2 + 2)$  est divisible par 3. On fait une disjonction de cas :

- Si  $n \equiv 0 \pmod{3}$ , alors  $n^2 + 2 \equiv 2 \pmod{3}$  et  $n(n^2 + 2) \equiv 0 \pmod{3}$ .
- Si  $n \equiv 1 \pmod{3}$ , alors  $n^2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$  et  $n(n^2 + 2) \equiv 0 \pmod{3}$ .
- Si  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , alors  $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$  donc  $n^2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$  et  $n(n^2 + 2) \equiv 0 \pmod{3}$ .

Dans les trois cas,  $n(n^2 + 2)$  est divisible par 3, ce qui conclut.

**Exercice 3.14**

Soit  $n \geq 2$ . Soient  $a$  et  $b$  deux entiers relatifs tels que  $a \equiv b \pmod{n}$ . Alors il existe  $p, q, r$  des entiers relatifs tels que

$$a = pn + r$$

$$b = qn + r$$

Donc, par la formule du binôme

$$a^n = (pn + r)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k n^k r^{n-k} = n^2 \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} p^k n^{k-2} r^{n-k} + n \times pnr^{n-1} + r^n \equiv r^n \pmod{n^2}$$

$$b^n = (qn + r)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} q^k n^k r^{n-k} = n^2 \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} q^k n^{k-2} r^{n-k} + n \times qnr^{n-1} + r^n \equiv r^n \pmod{n^2}$$

Ainsi,

$$a^n \equiv b^n \pmod{n^2}$$

**Exercice 3.15**

1. On a  $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$  et  $5^2 \equiv -1 \pmod{13}$ , donc

$$3^{126} + 5^{126} \equiv 1^{42} + (-1)^6 3 \equiv 0 \pmod{13}$$

Ainsi,  $3^{126} + 5^{126}$  est divisible par 13.

2. Montrons, par récurrence, que pour tout entier naturel  $n$ ,  $3^{2n+1} + 2^{4n+2}$  est divisible par 7.

**Initialisation :**  $n = 0$ , on a

$$3^{2 \times 0 + 1} + 2^{4 \times 0 + 2} = 7$$

La propriété est donc initialisée.

**Hérédité :** Supposons, pour **un** entier naturel  $n$ , que  $3^{2n+1} + 2^{4n+2}$  est divisible par 7. Alors

$$3^{2n+1} + 2^{4n+2} \equiv 0 \pmod{7}$$

On a

$$3^{2(n+1)+1} + 2^{4(n+1)+2} = 3^2 \times 3^{2n+1} + 2^4 \times 2^{4n+2}$$

Comme  $3^2 \equiv 2^4 \equiv 2 \pmod{7}$ ,

$$3^{2(n+1)+1} + 2^{4(n+1)+2} \equiv 2 \times (3^{2n+1} + 2^{4n+2}) \equiv 0 \pmod{7}$$

Donc  $3^{2(n+1)+1} + 2^{4(n+1)+2}$  est divisible par 7, la propriété est héréditaire.

**Conclusion :** La propriété est initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel  $n$ .

**Exercice 3.16**

1. On sait que  $247 \equiv 2 \pmod{7}$ . Donc

$$247^{349} \equiv 2^{349} \pmod{7}$$

Par un raisonnement similaire à l'exercice 3.10, on obtient

$n \pmod{3}$	0	1	2
$2^n \pmod{7}$	1	2	4

Ainsi, comme  $349 \equiv 1 \pmod{3}$ ,

$$247^{349} \equiv 2^{349} \equiv 2 \pmod{7}$$

2. Par la même méthode, on obtient

$$1357^{2013} \equiv 2 \pmod{5}$$

**Exercice 3.17**

1. **Initialisation** :  $n = 1$ . On a

$$6^1 = 6 \equiv 6 \pmod{10}$$

Donc la propriété est initialisée.

**Hérédité** : Supposons que, pour **un** entier naturel non-nul  $n$ ,  $6^n \equiv 6 \pmod{10}$ . Alors

$$6^{n+1} = 6 \times 6^n \equiv 6 \times 6 \equiv 36 \equiv 6 \pmod{10}$$

La propriété est donc héréditaire.

**Conclusion** : la propriété est initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel  $n$ .

2. Comme  $123456 \equiv 6 \pmod{10}$ ,

$$123456^{789} \equiv 6 \pmod{10}$$

3. On a

$$56 \equiv 56 \pmod{100}$$

$$56^2 = 3136 \equiv 36 \pmod{100}$$

$$56^3 = 56 \times 56^2 \equiv 16 \pmod{100}$$

$$56^4 = 56^2 \times 56^2 \equiv 96 \pmod{100}$$

$$56^5 = 56^3 \times 56^2 \equiv 56 \pmod{100}$$

$$56^6 = (56^2)^3 \equiv 36^3 \equiv 56 \pmod{100}$$

4. On remarque que  $789 \equiv 3 \pmod{6}$ , donc

$$\begin{aligned} 123456^{789} &= (123456^6)^{131} \times 123456^3 \\ &\equiv 56^{131} \times 56^3 \\ &\equiv 56^{134} \\ &\equiv 56^2 \times 56^2 \\ &\equiv 56^{24} \\ &\equiv 56^4 \\ &\equiv 96 \pmod{100} \end{aligned}$$

le chiffre des dizaines de  $123456^{789}$  est donc 9.

**Exercice 3.18**

1. On calcule

$$49^2 = (50 - 1)^2 = 50^2 - 2 \times 50 + 1^2 = 2401 \equiv 401 \pmod{1000}$$

$$401^5 = (400 + 1)^5 = 400^5 + 5 \times 400^4 + 10 \times 400^3 + 10 \times 400^2 + 5 \times 400^1 + 1 \equiv 1 \pmod{1000}$$

2. On a

$$7^{20} = 49^{10} \equiv 401^5 \equiv 1 \pmod{1000}$$

et

$$7^{1001} = 7 \times 7^{1000} = 7 \times (7^{20})^{50} \equiv 7 \times 1^{50} \equiv 7 \pmod{1000}$$

**Exercice 3.19**

1. La décomposition de 8190 en produit de facteurs premiers est

$$8190 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$$

Comme 2, 7 et 13 divisent 231868,

$$8190 \wedge 231868 = 2 \times 7 \times 13 = 182$$

2. Comme 17 est premier et ne divise pas 23145, ces nombres sont premiers entre eux.

3. La décomposition de 678 en produit de facteurs premiers est

$$678 = 2 \times 3 \times 113$$

Comme ni 2 ni 113 ne divisent 12345,

$$678 \wedge 12345 = 3$$

4. Comme  $2^{445} + 7$  est divisible par 3 mais pas par 5,

$$15 \wedge 2^{445} + 7 = 3$$

**Exercice 3.20**

1.

$$-3 \times 23 + 2 \times 35 = 1$$

2.

$$-12 \times 27 + 13 \times 25 = 1$$

**Exercice 3.21**1. On a  $2873 = 13^2 \times 17$  et  $1001 = 7 \times 11 \times 13$ , donc

$$1001 \wedge 2873 = 13$$

De plus,

$$23 \times 2873 - 66 \times 1001 = 13$$

2. Comme 13 ne divise pas 15, l'équation  $2873u + 1001v = 15$  n'a pas de solution entière.**Exercice 3.22**1. Soit  $a = 2k$  un nombre pair, alors  $a^2 = 4k^2$  est un multiple de 4.2. Soit  $a = 2k + 1$  un nombre impair, alors  $a^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1 \equiv 1 \pmod{8}$ .3. (a) On a  $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 3 \pmod{8}$ , donc  $a^2 + b^2 + c^2 \not\equiv 0 \pmod{4}$ , donc  $a^2 + b^2 + c^2$  n'est pas un carré.

(b) On a

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac \equiv 1 \pmod{4}$$

Donc  $2(ab + bc + ac) \equiv -2 \pmod{4}$  donc  $ab + bc + ac \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$ , donc ce n'est pas un carré.



**Exercice 3.23**

- Il suffit de montrer que, quelque soit  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $2 \mid n(n+1)(n+2)$  et  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ .
  - Si  $n$  est pair, alors  $2 \mid n(n+1)(n+2)$ , sinon, alors  $n+1$  est pair.
  - Si  $n \equiv 0 \pmod{3}$ , alors  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ .  
Si  $n \equiv 1 \pmod{3}$ , alors  $n+2$  est divisible par 3.  
Si  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , alors  $n+1$  est divisible par 3.
- Il suffit de montrer que, quelque soit  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$  et  $3 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ .
  - Par la première question, on sait que  $3 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ .
  - Si  $n \equiv 0 \pmod{4}$ , alors  $2 \mid n+2$  et  $4 \mid n$ , donc  $8 \mid n(n+2)$ .  
Si  $n \equiv 1 \pmod{4}$ , alors  $2 \mid n+1$  et  $4 \mid n+3$ , donc  $8 \mid (n+1)(n+3)$ .  
Si  $n \equiv 2 \pmod{4}$ , alors  $2 \mid n$  et  $4 \mid n+2$ , donc  $8 \mid n(n+2)$ .  
Si  $n \equiv 3 \pmod{4}$ , alors  $2 \mid n+3$  et  $4 \mid n+1$ , donc  $8 \mid (n+1)(n+3)$ .

**Exercice 3.24**

- Si  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, alors il existe des entiers  $u$  et  $v$  tels que

$$au + bv = 1$$

Donc

$$a(u - v) + (a + b)v = au - av + av + bv = au + bv = 1$$

Ainsi,  $a$  et  $a + b$  sont premiers entre eux.

- Comme  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, ils ne partagent pas de facteur premier. De même,  $a$  et  $c$  ne partagent pas de facteur premier. Or les facteurs premiers de  $bc$  sont les facteurs premiers de  $b$  ou de  $c$ . Ainsi  $a$  et  $bc$  ne peuvent partager de facteur premier, ils sont premiers entre eux.
- Les facteurs premiers de  $a^k$  sont les facteurs premiers de  $a$ , de même avec  $b^l$  et  $b$ . Comme  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, ils ne partagent pas de facteur premier. Donc  $a^k$  et  $b^l$  ne peuvent partager de facteur premier, ils sont premiers entre eux.

**Exercice 3.25**

Supposons qu'il existe un tel tableau de 5 lignes et 6 colonnes. Notons  $S$  la somme (constante) des colonnes. Alors la somme de tout le tableau vaut  $6S$ . Or cette dernière somme est

$$\sum_{k=1}^{30} k = \frac{30 \times 31}{2} = 465$$

Ainsi,

$$6S = 465$$

donc 465 est divisible par 6. C'est absurde, donc un tel tableau n'existe pas.

Avec 6 lignes et 5 colonnes en revanche, un tel tableau existe.

1	2	3	4	5
30	29	28	27	26
6	7	8	9	10
25	24	23	22	21
11	12	13	14	15
20	19	18	17	16
= 93	= 93	= 93	= 93	= 93

**Exercice 3.26**

1. On remarque que

$$3 \times (8n + 7) - 4 \times (6n + 5) = 24n + 21 - 24n - 20 = 1$$

Par l'identité de Bézout,  $6n + 5$  et  $8n + 7$  sont donc premiers entre eux, quelque soit  $n$ .

2. On remarque que

$$(2n + 3) \times (2n + 3) - 4 \times (n^2 + 3n + 2) = 4n^2 + 12n + 9 - (4n^2 + 12n + 8) = 1$$

Par l'identité de Bézout,  $n^2 + 3n + 2$  et  $2n + 3$  sont premiers entre eux, quelque soit  $n$ .

3. Soit  $p$  un nombre premier divisant à la fois  $5^{n+1} + 6^{n+1}$  et  $5^n + 6^n$ . Alors

- D'une part,

$$p \mid (5^{n+1} + 6^{n+1}) - 5(5^n + 6^n) = 6^n$$

Donc  $p = 2$  ou  $p = 3$ .

- D'autre part,

$$p \mid 6(5^n + 6^n) - (5^{n+1} + 6^{n+1}) = 5^n$$

Donc  $p = 5$ .

On a atteint une contradiction, un tel nombre premier  $p$  n'existe donc pas, donc  $5^{n+1} + 6^{n+1}$  et  $5^n + 6^n$  sont premiers entre eux, quelque soit  $n$ .

**Exercice 3.27**

1. Les solutions sont de la forme  $a = 11n$  et  $b = -6n$ , avec  $n$  un entier relatif.
2. On remarque que  $6 \times 2 + 11 \times (-1) = 1$ . Grâce à la première question, on en déduit que les solutions sont de la forme  $a = 11n + 2$  et  $b = 6n - 1$ , avec  $n$  un entier relatif.
3. Comme  $6 \wedge 12 = 6$ , et comme 6 ne divise pas, l'équation  $6a + 12b = 5$  n'a pas de solution dans  $\mathbb{Z}$ .

**Exercice 3.28**

On écrit

$$a = 2^{a_2} \times 3^{a_3} \times 5^{a_5}$$

$$b = 2^{b_2} \times 3^{b_3} \times 5^{b_5}$$

Comme  $18 = 2 \times 3^2$  et  $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ , on obtient

$$\begin{cases} \min(a_2, b_2) = 1 & , & \max(a_2, b_2) = 3 \\ \max(a_3, b_3) = 2 & , & \max(a_3, b_3) = 2 \\ \max(a_5, b_5) = 0 & , & \max(a_5, b_5) = 1 \end{cases}$$

On distingue alors 4 cas (car  $a_3 = b_3 = 2$ ) :

- $a_2 = 1, b_2 = 3, a_5 = 0, b_5 = 1$ . Alors  $a = 18$  et  $b = 360$
- $a_2 = 3, b_2 = 1, a_5 = 0, b_5 = 1$ . Alors  $a = 72$  et  $b = 90$
- $a_2 = 1, b_2 = 3, a_5 = 1, b_5 = 0$ . Alors  $a = 90$  et  $b = 72$
- $a_2 = 3, b_2 = 1, a_5 = 1, b_5 = 0$ . Alors  $a = 360$  et  $b = 18$

**Exercice 3.29**

1.  $51 = 3 \times 17$ ,  $72 = 2^3 \times 3^2$  et  $216 = 2^3 \times 3^3$ .
2. On en déduit que  $51 \wedge 216 = 3$ .
3.  $72 = 8 \times 9$  et  $216 = 8 \times 27$ .
4. Comme  $a \wedge b \mid a \vee b$  et  $a \wedge b \mid a + b$ ,  $a \wedge b$  divise  $(a + b) \wedge (a \vee b)$ .
5. On déduit de la question précédente que  $a \wedge b$  vaut 1 ou 3. On distingue les cas :
  - Si  $a \wedge b = 1$ , alors  $ab = 216$ , donc  $a$  et  $b$  sont les solutions de  $x^2 - 51x + 216$ . On calcule alors

$$\Delta = 51^2 - 4 \times 216 = 1737$$

Puisque 1737 n'est pas un carré, ce cas ne donne aucune solution.

- Si  $a \wedge b = 3$ , alors  $ab = 648$ , donc  $a$  et  $b$  sont les solutions de  $x^2 - 51x + 648$ . On calcule alors

$$\Delta = 51^2 - 4 \times 648 = 9$$

Les solutions sont donc  $a = \frac{51-3}{2} = 24$  et  $b = \frac{51+3}{2} = 27$  (ou inversement).

**Exercice 3.30**

1. Supposons que  $\frac{\ln(a)}{\ln(b)} = \frac{m}{n}$  avec  $m \wedge n = 1$ . Alors

$$n \ln(a) = m \ln(b)$$

donc  $a^n = b^m$ . Ainsi, pour  $p$  un nombre premier,  $nv_p(a) = mv_p(b)$ . Comme  $n \wedge m = 1$ ,  $n \mid v_p(b)$ , donc il existe  $c$  tel que  $b = c^n$ . Similairement, il existe  $c'$  tel que  $a = c'^m$ . Ainsi  $(c'^m)^n = (c^n)^m$  donc  $c = c'$ , donc  $c \mid a \wedge b$ , donc  $a$  et  $b$  ne sont pas premiers entre eux.

2. Si  $ab$  et  $a + b$  sont entiers, alors

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

est entier, donc  $a - b$  est entier (corollaire de l'exercice 3.24.3), donc  $2a = (a + b) + (a - b)$  est entier. De même,

$$2a^2 = (a + b)^2 + (a + b)(a - b) - 2ab$$

est entier, donc  $2(a^2 - a)$  est entier. On pose alors  $a = \frac{p}{q}$  avec  $p \wedge q = 1$ . Alors

$$2(a^2 - a) = 2a(a - 1) = \frac{2p(p - q)}{q^2}$$

Comme on suppose que  $2a(a - 1)$  est entier, on obtient les cas suivants :

- Soit  $q^2 = 1$ , alors  $q = \pm 1$  et  $a$  est entier, on a fini.
- Soit  $q^2 \mid 2p(p - q)$ , donc  $q \mid 2p(p - q)$  donc
  - Soit  $q \mid 2$ , alors  $q = 1$  et on a fini, ou  $q = 2$ , et alors

$$2a(a - 1) = \frac{2p(p - 2)}{4}$$

donc  $2 \mid p(p - 2)$  donc  $2 \mid p$  donc  $p \wedge q \neq 1$ , c'est absurde donc  $q \neq 2$ .

- Soit  $q \mid p(p - q)$  donc  $q \mid p$  donc  $p \wedge q = q$ , donc  $q = 1$  et on a fini.

**Exercice 3.31**

- 111 est divisible par 3.
- 1111 est divisible par 11.
- 11111 est divisible par 41.
- 111111 est divisible par 3.

**Exercice 3.32**

$$46848 = 2^8 \times 3 \times 61$$

$$2379 = 3 \times 13 \times 61$$

$$1001 = 7 \times 11 \times 13$$

$$2873 = 13^2 \times 17$$

**Exercice 3.33**

Pour  $k$  entier entre 2 et  $n$ ,  $n! + k$  est divisible par  $k$ .

**Exercice 3.34**

Les facteurs premiers de 210 sont 2, 3, 5 et 7. Si un entier  $n$  entre 10 et 120 est premier avec 210, alors il n'est divisible par aucun de ces facteurs premiers. Par la méthode du crible, on en déduit que  $n$  est premier.

**Exercice 3.35**

1. On écrit  $a = 2^{a_2}3^{a_3} \dots$  et  $b = 2^{b_2}3^{b_3} \dots$ .

Soit  $p$  un nombre premier divisant à la fois  $a + b$  et  $ab$ , alors

$$a_p + b_p \geq 1$$

donc  $p \mid a$  ou  $p \mid b$ .

- Si  $p \mid a$ , alors  $p \mid a + b - a = b$ .
- Si  $p \mid b$ , alors  $p \mid a + b - b = a$ .

Donc  $p \mid a$  et  $p \mid b$ .

2. Si  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, alors ils ne partagent pas de facteur premier, donc  $a + b$  et  $ab$  ne peuvent pas en partager non plus (par la première question), donc sont également premiers entre eux.

**Exercice 3.36**

1. Soit  $q$  impair (alors  $(-1)^q = -1$ ), on a

$$\begin{aligned} (x+1) \sum_{k=0}^{q-1} (-1)^k x^k &= \sum_{k=0}^{q-1} (-1)^k x^{k+1} + \sum_{k=0}^{q-1} (-1)^k x^k \\ &= - \sum_{k=0}^q (-1)^k x^k + 1 + \sum_{k=0}^{q-1} (-1)^k x^k \\ &= x^q + 1 \end{aligned}$$

2. On raisonne par contraposée. Supposons que  $m$  ai un facteur premier  $p$  différent de 2. Alors  $m = pm'$  et  $p$  est impair, donc

$$2^m + 1 = (2^{m'})^p + 1 = (2^{m'} + 1) \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k (2^{m'})^k$$

Donc  $2^m + 1$  est divisible par  $2^{m'} + 1$ , donc n'est pas premier.

3. On calcule  $65536 = 120 \times 641 + 154$ . On calcule également

$$2^{32} + 1 = (2^{16})^2 + 1 \equiv 154^2 + 1$$

Or  $154^2 = 23716 = 641 \times 36 + 640$  donc

$$2^{32} + 1 \equiv 0 \pmod{641}$$

Donc  $2^{32} + 1$  n'est pas premier.

**Exercice 3.37**

1. Commençons par montrer que  $a$  doit valoir 2. On remarque que

$$a^n - 1 = (a - 1) \sum_{k=0}^{n-1} a^k$$

Ainsi, si  $a \neq 2$ , alors  $a - 1 \mid a^n - 1$ , donc  $a^n - 1$  n'est pas premier.

Montrons maintenant que  $n$  doit être premier :

- Si  $n = 1$ , alors  $2^1 - 1 = 1$  et 1 n'est pas premier.
- Si  $n = kl$  est composé, alors

$$2^n - 1 = (2^k)^l - 1 = (2^k - 1) \sum_{n=0}^{l-1} 2^{kn}$$

Comme  $k \geq 1$ ,  $2^k - 1 \mid 2^n - 1$ , donc  $2^n - 1$  n'est pas premier.

2. On sait que  $2^5 = 32 \equiv 9 \pmod{23}$  et  $2^6 = 64 \equiv 18 \pmod{23}$ . Donc

$$2^{11} - 1 \equiv 18 \times 9 - 1 \equiv 163 \equiv 0 \pmod{23}$$

**Exercice 3.38**

1. Supposons que, pour tout nombre premier  $p$ ,  $n \mid v_p(a)$ , alors il existe  $k_p$  tel que  $v_p(a) = nk_p$ , on pose alors

$$b = \prod_p p^{k_p}$$

pour obtenir  $a = b^n$ .

Supposons réciproquement que  $a = b^n$ . Alors pour  $p$  un nombre premier,

$$v_p(a) = nv_p(b)$$

donc  $n \mid v_p(a)$ , pour tout nombre premier  $p$ .

2. Par la question précédente, si  $a = b^2 = c^3$ , alors, pour tout nombre premier  $p$ ,

$$2 \mid v_p(a) \text{ et } 3 \mid v_p(a)$$

donc

$$6 \mid v_p(a)$$

donc  $a$  est une puissance sixième.

3. Comme  $ab$  est un carré, pour  $p$  un nombre premier,  $2 \mid v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ . Comme  $a$  et  $b$  sont premier entre eux, on a

$$v_p(a) = 0 \quad \text{ou} \quad v_p(b) = 0$$

donc  $2 \mid v_p(a)$  ou  $2 \mid v_p(b)$ . Ceci valant pour tout nombre premier  $p$ , on obtient bien que  $a$  et  $b$  sont des carrés.

**Exercice 3.39**

1. Supposons, par l'absurde, qu'il existe  $n = p_1 \cdots p_k \equiv 3 \pmod{4}$  tel que  $p_i \not\equiv 3 \pmod{4}$ , alors  $p_i \equiv 1 \pmod{4}$ . Ainsi

$$n \equiv p_1 \cdots p_k \equiv 1 \pmod{4}$$

d'où l'absurdité.

2. On a  $4p_1 \cdots p_n \equiv 0 \pmod{4}$  donc  $4p_1 \cdots p_n - 1 \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$ .

3. Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini  $n$  de nombres premiers de la forme  $4k - 1$ , que l'on note  $p_1, \dots, p_n$ . Alors

$$N = 4p_1 \cdots p_n - 1 \equiv 3 \pmod{4}$$

donc (par la première question)  $N$  admet un facteur premier de la forme  $4k - 1$ . De plus, un tel facteur premier ne peut pas être l'un des  $p_n$ , car sinon il diviserait 1. On a donc atteint une contradiction, il doit ainsi y avoir une infinité de nombres premiers de la forme  $4k - 1$ .