


tiene debajo están ocupadas (o ya ha llegado al suelo), se detiene ahí. Todo esto ocurre dentro del mismo segundo: en los dibujos solo mostramos la posición final tras cada caída.

Con $L = 5$, los ocho primeros granos se asientan así. Las letras **a**, **b**, **c**, etcétera, marcan el orden en que caen; en el dibujo de verdad todas serían *****:




Fíjate en el grano **d**: cae cuando **a**, **b** y **c** ya ocupan las tres celdas de debajo de la columna central, así que se queda un nivel más arriba. Y **e** tampoco encuentra sitio en el centro, de modo que rueda hacia la izquierda y baja dos diagonales hasta el suelo, mientras que **g** rueda hacia la derecha.

Cómo se vacía la arena arriba

A medida que los granos se marchan, la cámara de arriba se va vaciando. El grano que está en el cuello sale hacia abajo y la arena de encima se reacomoda para rellenar el sitio. Dicho de otro modo: cada segundo aparece un *hueco* en el cuello y asciende. Sube a la celda que tiene justo encima mientras allí haya arena; si la celda de encima ya es un hueco, se desplaza a la diagonal superior derecha (y, si tampoco puede, a la superior izquierda), y se detiene cuando ya no puede subir más.


Con $L = 5$, los ocho primeros huecos se forman así. Ahora las mayúsculas **A**, **B**, **C**, etcétera, marcan el orden en que se vacía cada celda; recuerda que un hueco es en realidad un espacio:



Como la ampollita se inclina hacia la izquierda, el montículo de abajo se carga hacia ese lado; el hueco de arriba, en cambio, se desvía hacia la derecha.

El reloj completo

Juntando las dos cámaras, en cada instante t (con $0 \leq t \leq N$) hay exactamente t granos caídos: t huecos arriba y t granos apilados abajo. Para $L = 5$:



Dados L y T , queremos dibujar la ampollita tal y como se ve justo después de T segundos.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero C ($0 \leq C \leq 2000$), el número de casos de prueba. Cada una de las C líneas siguientes contiene dos enteros L y T separados por un espacio: L es el número de niveles de cada cámara y T el número de segundos transcurridos desde que se dio la vuelta a la ampollita, con $1 \leq L \leq 20$ y $0 \leq T \leq L^2$. La suma de los valores L^2 de todos los casos de prueba no supera $2 \cdot 10^5$.

SALIDA

Para cada caso de prueba se dibujará su ampollita tras T segundos, que ocupará exactamente $2L$ líneas, y a continuación una línea en blanco (también después del último dibujo). Cada celda con arena se representa con un asterisco * y cada celda vacía con un espacio en blanco; las paredes son los caracteres / y \. Ninguna línea del dibujo termina en espacios: todas acaban en una pared (/ o \). Sí hay, en cambio, espacios a la izquierda: la primera y la última línea (las más anchas) empiezan en la primera columna, y las demás van precedidas de los espacios justos para alinear las paredes y formar la silueta de la ampollita.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 4 0 4 6 3 9	<pre> *****/ *****/ *** / * / / \ / \ / \ / \ ** */ ** */ *** / * / / \ / \ / \ / \ / \ \ / \ / \ / \/ /*\ /***\ /*****\ </pre>