

Domena i svojstva realnih funkcija realne varijable

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 1

Damir Horvat

FOI, Varaždin

Sadržaj

prvi zadatak

drugi zadatak

treći zadatak

četvrti zadatak

peti zadatak

prvi zadatak

Zadatak 1

Odredite domene i nultočke sljedećih funkcija:

$$\text{a) } f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$\text{b) } g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\text{c) } h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$\text{d) } k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

Rješenje

a) domena

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$x+2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{\quad}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x = -7$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x = -7$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-x-7$		

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-x-7$	
$x+2$	

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-x-7$		
$x+2$		
$\frac{-x-7}{x+2}$		

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-\infty$		
$-x-7$		
$x+2$		
$\frac{-x-7}{x+2}$		

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-\infty$		$+\infty$
$-x-7$		
$x+2$		
$\frac{-x-7}{x+2}$		

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	$+\infty$
$-x-7$			
$x+2$			
$\frac{-x-7}{x+2}$			

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$				
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+		
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-		
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$				

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-		

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	+	

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	+	-

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	+	-

RJEŠENJE:

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	⊕	-

RJEŠENJE:

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	⊕	-

$$\text{RJEŠENJE: } x \in [-7, -2)$$

Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x=-7$$

$$x+2=0$$

$$x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	-7	-2	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	\oplus	-

RJEŠENJE: $x \in [-7, -2)$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 =$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 =$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočke

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / \quad ^4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

jest nultočka
jer pripada domeni

b) domena

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

b) domena

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

b) domena

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$


$$D_g = \mathbb{R}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

b) domena

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0$$

b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 \quad / \quad ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 \quad / \quad ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$  neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

c) domena

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

c) domena

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

c) domena

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$\log = \log_{10}$

$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$

c) domena

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$\log = \log_{10}$

$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} >$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 =$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 =$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

$$x = 1 + \log 6$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

$$x = 1 + \log 6$$

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

nultočke

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

$$x = 1 + \log 6$$

jest nultočka
jer pripada
domeni

Ako je $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena


$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$


$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$



$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$ \leftarrow zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$ \leftarrow zbog $\sqrt{}$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$



d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena



- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$\boxed{x > -2}$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$ \leftarrow zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$ \leftarrow zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$ \leftarrow zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$ \leftarrow zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$ \leftarrow zbog $\log_{\frac{1}{2}}$

- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$ \leftarrow zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$



$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$


Ako je $a > 1$


$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

• $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$

• $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 > 0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x > -2$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

presjek rješenja

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$


Ako je $a > 1$


$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

• $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$

• $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 > 0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x > -2$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

presjek rješenja

$$x \in (-2, -1]$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$


Ako je $a > 1$


$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

• $x + 2 > 0$  zbog $\log_{\frac{1}{2}}$

• $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$  zbog $\sqrt{}$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 > 0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x > -2$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

presjek rješenja

$$x \in \langle -2, -1 \rangle$$

$$D_k = \langle -2, -1 \rangle$$

Ako je $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1]]$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1]]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0$$

nultočky

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$D_k = \langle -2, -1]$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 =$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1]]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1]]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1]]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$x = -1$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1 \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$x = -1$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočke

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$x = -1$$

$$D_k = \langle -2, -1] \quad \nearrow$$

jest nultočka
jer pripada domeni

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

drugi zadatak

Zadatak 2

Zadane su funkcije $f(x) = \ln(x - 3)$ i $g(x) = x^2 + x + 1$.

- a) *Odredite pravila pridruživanja funkcija $f \circ g$ i $g \circ f$.*
- b) *Na kojim su domenama od funkcija f i g kompozicije $f \circ g$ i $g \circ f$ dobro definirane?*

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

Rješenje

a)

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$(f \circ g)(x) =$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$(f \circ g)(x) = f(\quad)$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\quad)$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + x + 1)$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln(\quad)\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln(x^2 + x + 1)\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3)\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x) =$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x) = g(\quad)$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\quad)$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\ln(x - 3))$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\quad)^2\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 +\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 + \ln(x - 3)\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$\ln = \log_e$$

Rješenje

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 + \ln(x - 3) + 1\end{aligned}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

Rješenje

$$\ln = \log_e$$

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 + \ln(x - 3) + 1 = \\ &= \ln^2(x - 3)\end{aligned}$$

$$\log_a^k x = (\log_a x)^k$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

Rješenje

$$\ln = \log_e$$

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 + \ln(x - 3) + 1 = \\ &= \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3)\end{aligned}$$

$$\log_a^k x = (\log_a x)^k$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

Rješenje

$$\ln = \log_e$$

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 + \ln(x - 3) + 1 = \\ &= \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1\end{aligned}$$

$$\log_a^k x = (\log_a x)^k$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

Rješenje

$$\ln = \log_e$$

a)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 + x + 1) = \\ &= \ln((x^2 + x + 1) - 3) = \ln(x^2 + x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(\ln(x - 3)) = \\ &= (\ln(x - 3))^2 + \ln(x - 3) + 1 = \\ &= \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1\end{aligned}$$

Budite jako oprezni

$$(\log_a x)^k \neq \log_a x^k$$

$$\log_a^k x = (\log_a x)^k$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b)

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2}$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) **domena funkcije $g \circ f$**

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) **domena funkcije $g \circ f$**

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) **domena funkcije $g \circ f$**

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$D_{f \circ g} = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$D_{f \circ g} = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$$

Funkcije f i g moramo gledati na sljedeći način:

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

$$\text{Im } f \subseteq D_g$$

b) **domena funkcije $g \circ f$**

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$D_{f \circ g} = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$$

Funkcije f i g moramo gledati na sljedeći način:

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

$$\text{Im } f \subseteq D_g$$

b) **domena funkcije $g \circ f$**

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$


domena funkcije $f \circ g$

$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$



$$D_{f \circ g} = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$$

Funkcije f i g moramo gledati na sljedeći način:

$$f : \langle 3, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

$$\text{Im } f \subseteq D_g$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$


$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$

$$\text{Im } g \subseteq D_f$$



$$D_{f \circ g} = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$$

Funkcije f i g moramo gledati na sljedeći način:

$$f : \langle 3, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \ln(x - 3)$$

$$(g \circ f)(x) = \ln^2(x - 3) + \ln(x - 3) + 1$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = \ln(x^2 + x - 2)$$

$$\text{Im } f \subseteq D_g$$

b) domena funkcije $g \circ f$

$$x - 3 > 0 \rightsquigarrow x > 3$$

$$D_{g \circ f} = \langle 3, +\infty \rangle$$

domena funkcije $f \circ g$


$$x^2 + x - 2 > 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$

$$\text{Im } g \subseteq D_f$$



$$D_{f \circ g} = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$$

Funkcije f i g moramo gledati na sljedeći način:


$$f : \langle 3, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g : \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$$

treći zadatak

Zadatak 3


Zadana je funkcija h svojim grafom na donjoj slici.



Ispitajte monotonost, omeđenost i parnost funkcije h na temelju njezinog grafa.

Rješenje


monotonost



Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.




Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost




Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$




Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je



Rješenje


monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$



Rješenje

monotonost


Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je omeđena odozdo jer je



Rješenje

monotonost


Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je omeđena odozdo jer je $h(x) \geq 100$,



Rješenje

monotonost


Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je omeđena odozdo jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .



Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.


omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je omeđena odozdo jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .

Funkcija h nije omeđena jer nije omeđena odozgo.



Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$


Funkcija h nije omeđena odozgo jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je omeđena odozdo jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .

Funkcija h nije omeđena jer nije omeđena odozgo.

parnost/neparnost



Rješenje

monotonost

Funkcija h je monotona funkcija
jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h nije omeđena odozgo jer je


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je omeđena odozdo jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .

Funkcija h nije omeđena jer nije omeđena odozgo.

parnost/neparnost

Funkcija h nije parna jer



Rješenje

monotonost

Funkcija h je **monotona funkcija** jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h **nije omeđena odozgo** jer je


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$

Funkcija h je **omeđena odozdo** jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .

Funkcija h **nije omeđena** jer nije omeđena odozgo.

parnost/neparnost

Funkcija h **nije parna** jer njezin graf nije simetričan s obzirom na os y .



Rješenje

monotonost

Funkcija h je **monotona funkcija** jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h **nije omeđena odozgo** jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$


Funkcija h je **omeđena odozdo** jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .

Funkcija h **nije omeđena** jer nije omeđena odozgo.

parnost/neparnost

Funkcija h **nije parna** jer njezin graf nije simetričan s obzirom na os y .

Funkcija h **nije neparna** jer



Rješenje

monotonost

Funkcija h je **monotona funkcija** jer strogo pada.

omeđenost $m \leq h(x) \leq M$

Funkcija h **nije omeđena odozgo** jer je

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty.$$


Funkcija h je **omeđena odozdo** jer je $h(x) \geq 100$, tj. $m = 100$ je jedna donja međa funkcije h .

Funkcija h **nije omeđena** jer nije omeđena odozgo.

parnost/neparnost

Funkcija h **nije parna** jer njezin graf nije simetričan s obzirom na os y .


Funkcija h **nije neparna** jer njezin graf nije simetričan s obzirom na ishodište koordinatnog sustava.



čtvrti zadatak

Zadatak 4


Zadana je funkcija f svojim grafom na donjoj slici.



Ispitajte monotonost, omeđenost i parnost funkcije f na temelju njezinog grafa.

Rješenje


monotonost



Rješenje

monotonost

Funkcija f raste na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.




Rješenje

monotonost

Funkcija f **raste** na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.

Funkcija f **pada** na intervalima $\langle -\infty, -3 \rangle$ i $\langle -3, 0 \rangle$.




Rješenje

monotonost

Funkcija f **raste** na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.

Funkcija f **pada** na intervalima $\langle -\infty, -3 \rangle$ i $\langle -3, 0 \rangle$.

Funkcija f **nije monotona** funkcija na svojoj domeni.




Rješenje

monotonost

Funkcija f **raste** na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.

Funkcija f **pada** na intervalima $\langle -\infty, -3 \rangle$ i $\langle -3, 0 \rangle$.

Funkcija f **nije monotona** funkcija na svojoj domeni.



Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne raste na skupu $\langle 0, 3 \rangle \cup \langle 3, +\infty \rangle$.


Rješenje

monotonost

Funkcija f **raste** na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.

Funkcija f **pada** na intervalima $\langle -\infty, -3 \rangle$ i $\langle -3, 0 \rangle$.

Funkcija f **nije monotona** funkcija na svojoj domeni.



Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne raste na skupu $\langle 0, 3 \rangle \cup \langle 3, +\infty \rangle$.

Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne pada na skupu $\langle -\infty, -3 \rangle \cup \langle -3, 0 \rangle$.

Rješenje

monotonost

Funkcija f **raste** na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.

Funkcija f **pada** na intervalima $\langle -\infty, -3 \rangle$ i $\langle -3, 0 \rangle$.

Funkcija f **nije monotona** funkcija na svojoj domeni.


parnost/neparnost

Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne raste na skupu $\langle 0, 3 \rangle \cup \langle 3, +\infty \rangle$.

Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne pada na skupu $\langle -\infty, -3 \rangle \cup \langle -3, 0 \rangle$.




Rješenje

monotonost

Funkcija f **raste** na intervalima $\langle 0, 3 \rangle$ i $\langle 3, +\infty \rangle$.

Funkcija f **pada** na intervalima $\langle -\infty, -3 \rangle$ i $\langle -3, 0 \rangle$.

Funkcija f **nije monotona** funkcija na svojoj domeni.



parnost/neparnost

Funkcija f **je parna** jer je njezin graf simetričan s obzirom na os y .


Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne raste na skupu $\langle 0, 3 \rangle \cup \langle 3, +\infty \rangle$.


Budite iznimno oprezni

Funkcija f ne pada na skupu $\langle -\infty, -3 \rangle \cup \langle -3, 0 \rangle$.

omeđenost




omeđenost $m \leq f(x) \leq M$



omeđenost $m \leq f(x) \leq M$


Funkcija f nije omeđena odozgo jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike pozitivne vrijednosti,



omeđenost $m \leq f(x) \leq M$

Funkcija f nije omeđena odozgo jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike pozitivne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = +\infty.$$




omeđenost $m \leq f(x) \leq M$

Funkcija f nije omeđena odozgo jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike pozitivne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = +\infty.$$

Funkcija f nije omeđena odozdo jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike negativne vrijednosti,




omeđenost $m \leq f(x) \leq M$

Funkcija f nije omeđena odozgo jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike pozitivne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = +\infty.$$

Funkcija f nije omeđena odozdo jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike negativne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = -\infty.$$



omeđenost $m \leq f(x) \leq M$


Funkcija f **nije omeđena odozgo** jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike pozitivne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = +\infty.$$

Funkcija f **nije omeđena odozdo** jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike negativne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = -\infty.$$

Funkcija f **nije omeđena** jer nije omeđena niti odozgo niti odozdo.



omeđenost $m \leq f(x) \leq M$


Funkcija f **nije omeđena odozgo** jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike pozitivne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = +\infty.$$

Funkcija f **nije omeđena odozdo** jer u okolini broja 3 poprima beskonačno velike negativne vrijednosti, tj.

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = -\infty.$$

Funkcija f **nije omeđena** jer nije omeđena niti odozgo niti odozdo.



Slično je u okolini broja -3

$$\lim_{x \rightarrow -3-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3+} f(x) = +\infty$$

peti zadatak

Zadatak 5

Ispitajte parnost sljedećih funkcija:

a) $f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$

b) $h(x) = 2^{5-x} + 50$

c) $g(x) = \log_4 \frac{3 + 2x}{3 - 2x}$

Zadatak 5

Ispitajte parnost sljedećih funkcija:

a) $f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$

b) $h(x) = 2^{5-x} + 50$

c) $g(x) = \log_4 \frac{3 + 2x}{3 - 2x}$

Parna funkcija

- $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$
- $f(-x) = f(x), \forall x \in D_f$

Zadatak 5

Ispitajte parnost sljedećih funkcija:

a) $f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$

b) $h(x) = 2^{5-x} + 50$

c) $g(x) = \log_4 \frac{3 + 2x}{3 - 2x}$

Parna funkcija

- $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$
- $f(-x) = f(x), \forall x \in D_f$

Neparna funkcija

- $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$
- $f(-x) = -f(x), \forall x \in D_f$

Rješenje

a) domena

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena

$$3 - x^2 \neq 0$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) =$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \text{—————}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - x^2}$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2}$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \text{_____}$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

a) domena $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena**

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) =$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)}$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

$$h(1) =$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

$$h(1) = 2^4 + 50$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

$$h(1) = 2^4 + 50 = 66$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

$$h(1) = 2^4 + 50 = 66, \quad h(-1) =$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

$$h(1) = 2^4 + 50 = 66, \quad h(-1) = 2^6 + 50$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer

$$h(1) = 2^4 + 50 = 66, \quad h(-1) = 2^6 + 50 = 114$$

Rješenje

$$f(x) = \frac{2x^2}{3 - x^2}$$

a) **domena** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

$$3 - x^2 \neq 0 \rightsquigarrow x^2 \neq 3 \rightsquigarrow x \neq \pm\sqrt{3}$$

$$f(-x) = \frac{2 \cdot (-x)^2}{3 - (-x)^2} = \frac{2x^2}{3 - x^2} = f(x)$$

Funkcija f je parna funkcija.

$$h(x) = 2^{5-x} + 50$$

b) **domena** $D_h = \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2^{5-(-x)} + 50 = 2^{5+x} + 50 \neq \pm h(x)$$

Funkcija h nije niti parna niti neparna.

Protuprimjer $h(-1) \neq \pm h(1)$

$$h(1) = 2^4 + 50 = 66, \quad h(-1) = 2^6 + 50 = 114$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3 + 2x}{3 - 2x}$$

c) domena

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) domena

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) domena

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x = 0$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) domena

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$


c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$



$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$3+2x$	

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$3+2x$		
$3-2x$		

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$3+2x$		
$3-2x$		
$\frac{3+2x}{3-2x}$		

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$-\infty$		
$3+2x$		
$3-2x$		
$\frac{3+2x}{3-2x}$		

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$-\infty$	$+\infty$
$3+2x$	
$3-2x$	
$\frac{3+2x}{3-2x}$	

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$			
$3-2x$			
$\frac{3+2x}{3-2x}$			

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$				
$3-2x$				
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-		
$3-2x$				
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	
$3-2x$				
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$				
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+		
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$				

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-		

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	\oplus	-

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	\oplus	-

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	\oplus	-

$$g(-x) =$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \text{_____}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2(-x)}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \text{ ————— }$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	\oplus	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4 \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{-1}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0$$

$$3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4 \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{-1} =$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	\oplus	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4 \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{-1} =$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$\begin{aligned}
 g(-x) &= \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4 \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{-1} = \\
 &= -\log_4 \frac{3+2x}{3-2x}
 \end{aligned}$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4 \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{-1} =$$

$$= -\log_4 \frac{3+2x}{3-2x} = -g(x)$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

c) **domena**

$$\frac{3+2x}{3-2x} > 0$$

$$3+2x=0 \quad 3-2x=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$


	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$3+2x$		-	+	+
$3-2x$		+	+	-
$\frac{3+2x}{3-2x}$		-	+	-

$$g(-x) = \log_4 \frac{3+2 \cdot (-x)}{3-2 \cdot (-x)} = \log_4 \frac{3-2x}{3+2x} = \log_4 \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{-1} =$$

$$= -\log_4 \frac{3+2x}{3-2x} = -g(x)$$

g je neparna funkcija


Graf funkcije g



$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

Graf funkcije g




$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}-} g(x) = +\infty$$

Graf funkcije g



$$g(x) = \log_4 \frac{3+2x}{3-2x}$$

$$D_g = \left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} g(x) = -\infty$$