

# Realne funkcije realne varijable – 1. dio

MATEMATIKA 2

---

Damir Horvat

FOI, Varaždin

# Sadržaj

prvi zadatak

drugi zadatak

Trigonometrijske i ciklometrijske funkcije

treći zadatak

**prvi zadatak**

---

## Zadatak 1

*Odredite domene i nultočke sljedećih funkcija:*

a)  $f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$

b)  $g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$

c)  $h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$

d)  $k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$

## Rješenje

a) domena

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

---

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$



## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

---

$$x+2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

---

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{\quad}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) domena

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$



$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x = -7$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x = -7$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$


## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-x-7$	

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-x-7$	
$x+2$	

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-x-7$		
$x+2$		
$\frac{-x-7}{x+2}$		



## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-\infty$		
$-x-7$		
$x+2$		
$\frac{-x-7}{x+2}$		

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$-\infty$		$+\infty$
$-x-7$		
$x+2$		
$\frac{-x-7}{x+2}$		

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$+\infty$
$-x-7$			
$x+2$			
$\frac{-x-7}{x+2}$			

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$				
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+		
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$				
$\frac{-x-7}{x+2}$				

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-		
$\frac{-x-7}{x+2}$				



$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$x + 2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	
$\frac{-x-7}{x+2}$				

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$				

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-		

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	+	

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	+	-

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	+	-

RJEŠENJE:

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0 \quad x+2=0$$

$$x=-7 \quad x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	⊕	-

RJEŠENJE:

## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x=-7$$

$$x+2=0$$

$$x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	⊕	-

RJEŠENJE:  $x \in [-7, -2)$



## Rješenje

a) **domena**

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

$$-x-7=0$$

$$x=-7$$

$$x+2=0$$

$$x=-2$$

$$x+2 \neq 0$$

uključeno u  
ovom uvjetu

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

	$-\infty$	$-7$	$-2$	$+\infty$
$-x-7$		+	-	-
$x+2$		-	-	+
$\frac{-x-7}{x+2}$		-	⊕	-

RJEŠENJE:  $x \in [-7, -2)$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 =$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$



nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 =$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / + 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / \quad ^4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2)$$

nultočky

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / +4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$



nultočke

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1 = 0$$

$$\sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 = 1 \quad / \quad ^4$$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 = 1$$

$$\frac{x-3}{x+2} = 3 \quad / \cdot (x+2)$$

$$x - 3 = 3x + 6$$

$$-2x = 9$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{x-3}{x+2}} - 2 - 1$$

$$D_f = [-7, -2]$$

jest nultočka  
jer pripada domeni

b) domena

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

b) domena

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

b) domena

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$$D_g = \mathbb{R}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

b) domena

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

b) domena

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

nultočke

b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0$$

b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$



b) **domena**

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 \quad / \quad ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

b) **domena**

$$g(x) = \sqrt[5]{2 + x - x^2}$$

$D_g = \mathbb{R}$   neparni korijen je definiran za sve realne brojeve

**nultočke**

$$\sqrt[5]{2 + x - x^2} = 0 / ^5$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

$$g(x) = (2 + x - x^2)^{\frac{1}{5}}$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

c) domena

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

c) domena

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

c) domena

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$\log = \log_{10}$

$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$



c) domena

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$\log = \log_{10}$

$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} >$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$



c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) domena

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 =$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$



c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 =$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

$$x = 1 + \log 6$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

$$x = 1 + \log 6$$

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

c) **domena**

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log = \log_{10}$$

$$h(x) = \log(10^{x-1} - 5)$$

$$10^{x-1} - 5 > 0$$

$$10^{x-1} > 5$$

$$10^{x-1} > 10^{\log 5}$$

$$x - 1 > \log 5$$

$$x > 1 + \log 5$$

**nultočke**

$$D_h = \langle 1 + \log 5, +\infty \rangle$$

$$\log(10^{x-1} - 5) = 0$$

$$10^{x-1} - 5 = 10^0$$

$$10^{x-1} = 6$$

$$x - 1 = \log 6$$

$$x = 1 + \log 6$$

jest nultočka  
jer pripada  
domeni

Ako je  $a > 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$



$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena


$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$


$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$



$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   $\leftarrow$  zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   $\leftarrow$  zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$



d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   $\leftarrow$  zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   $\leftarrow$  zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$\boxed{x > -2}$$



$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$   $\leftarrow$  zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   $\leftarrow$  zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$



$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$   $\leftarrow$  zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$

- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   $\leftarrow$  zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$



$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$





Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$



Ako je  $a > 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) domena

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$
- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$


Ako je  $a > 1$


$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

- $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$

- $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$x + 2 > 0$$

$$x > -2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

*presjek rješenja*

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$


Ako je  $a > 1$


$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

•  $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$

•  $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 > 0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x > -2$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

presjek rješenja

$$x \in (-2, -1]$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$


Ako je  $a > 1$


$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$$

$$\log_a a^x = x$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

d) **domena**

•  $x + 2 > 0$   zbog  $\log_{\frac{1}{2}}$

•  $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$   zbog  $\sqrt{\phantom{x}}$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x + 2 > 0$$

$$x + 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x > -2$$

$$x + 2 \leq 1$$

$$x \leq -1$$

presjek rješenja

$$x \in \langle -2, -1 \rangle$$

$$D_k = \langle -2, -1 \rangle$$

Ako je  $0 < a < 1$

$$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] ]$$



$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0$$

nultočky

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$D_k = \langle -2, -1]$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 =$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] ]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1] ]$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$x = -1$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$



$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočky

$$D_k = \langle -2, -1 \rangle$$

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$x = -1$$

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

$$k(x) = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)}$$

nultočke

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+2)} = 0 \quad / ^2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 0$$

$$x+2 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$x+2 = 1$$

$$x = -1$$

$$D_k = \langle -2, -1] \quad \nearrow$$

jest nultočka  
jer pripada domeni

$$\log_a x = b \rightsquigarrow x = a^b$$

## **drugi zadatak**

---

## Zadatak 2

*Odredite nultočke funkcija*

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$



## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x =$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$



## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x =$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x =$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 / \cdot (-1)$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \text{ } / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$



## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

egzaktna  
vrijednost  
nultočke

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

egzaktna  
vrijednost  
nultočke

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## Zadatak 2

Odredite nultočke funkcija

$$f(x) = 2^{5-x} + 50 \text{ i } g(x) = 2^{5-x} - 50.$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

## Rješenje

nultočke od  $f$

$$2^{5-x} + 50 = 0$$

$$2^{5-x} = -50$$

$$5 - x = \log_2(-50)$$



funkcija  $f$  nema nultočki

egzaktna  
vrijednost  
nultočke

nultočke od  $g$

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

aproksimacija  
nultočke na  
5 decimala

$$x \approx -0.64386$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$



# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x}$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} =$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 =$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$



# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$5 - x =$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$5 - x = \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$5 - x = \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$-x =$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$5 - x = \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$-x = -5 + \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$5 - x = \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$-x = -5 + \frac{\log 50}{\log 2} \quad / \cdot (-1)$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 \quad / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 \quad / : \log 2$$

$$5 - x = \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$-x = -5 + \frac{\log 50}{\log 2} \quad / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$



# Nultočke funkcije $g$

## 1. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 / \log_2$$

$$5 - x = \log_2 50$$

$$-x = -5 + \log_2 50 / \cdot (-1)$$

$$x = 5 - \log_2 50$$

$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$x \approx -0.64386$$

$$a^x = b \rightsquigarrow x = \log_a b$$

## 2. način

$$2^{5-x} - 50 = 0$$

$$2^{5-x} = 50 / \log$$

$$\log 2^{5-x} = \log 50$$

$$(5 - x) \log 2 = \log 50 / : \log 2$$

$$5 - x = \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$-x = -5 + \frac{\log 50}{\log 2} / \cdot (-1)$$


$$x = 5 - \frac{\log 50}{\log 2}$$

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$


# Trigonometrijske i ciklometrijske funkcije

---

$$f(x) = \sin x$$




$$f^{-1}(x) = \arcsin x$$



$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$


$$\arcsin x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f(x) = \sin x$$




Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$


$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0 = \arcsin a$$

$$f(x) = \sin x$$




Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0 = \arcsin a$$

$$x_{2k} = x_0 + 2k\pi$$

$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$


$$x_0 = \arcsin a$$

$$x_1 = \pi - \arcsin a$$

$$x_{2k} = x_0 + 2k\pi$$



$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$


$$x_0 = \arcsin a$$

$$x_1 = \pi - \arcsin a$$

$$x_{2k} = x_0 + 2k\pi$$

$$x_{2k+1} = x_1 + 2k\pi$$

$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$

- $x_k^{(1)} = \arcsin a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$


$$x_0 = \arcsin a$$

$$x_1 = \pi - \arcsin a$$

$$x_k^{(1)} = x_{2k} = x_0 + 2k\pi$$

$$x_{2k+1} = x_1 + 2k\pi$$

$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$

- $x_k^{(1)} = \arcsin a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- $x_k^{(2)} = \pi - \arcsin a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$


$$x_0 = \arcsin a$$

$$x_1 = \pi - \arcsin a$$

$$x_k^{(1)} = x_{2k} = x_0 + 2k\pi$$

$$x_k^{(2)} = x_{2k+1} = x_1 + 2k\pi$$

$$f(x) = \sin x$$



Rješenja jednačbe  $\sin x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0 = \arcsin a$$

$$x_1 = \pi - \arcsin a$$

$$\bullet x_k^{(1)} = \arcsin a + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$x_k^{(1)} = x_{2k} = x_0 + 2k\pi$$

$$\bullet x_k^{(2)} = \pi - \arcsin a + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x_k^{(2)} = x_{2k+1} = x_1 + 2k\pi$$


Možemo sva rješenja zapisati pomoću jedne formule

$$x_k = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$




$$f(x) = \cos x$$

$$f^{-1}(x) = \arccos x$$




$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}$$


$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$



Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$




Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$



Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$






Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$

$$x_k^{(1)} = x_0^{(1)} + 2k\pi$$




Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$

$$x_0^{(2)} = -\arccos a$$

$$x_k^{(1)} = x_0^{(1)} + 2k\pi$$




Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$

$$x_0^{(2)} = -\arccos a$$

$$x_k^{(1)} = x_0^{(1)} + 2k\pi$$

$$x_k^{(2)} = x_0^{(2)} + 2k\pi$$



Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$


- $x_k^{(1)} = \arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$

$$x_0^{(2)} = -\arccos a$$

$$x_k^{(1)} = x_0^{(1)} + 2k\pi$$

$$x_k^{(2)} = x_0^{(2)} + 2k\pi$$



Rješenja jednačbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$


- $x_k^{(1)} = \arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- $x_k^{(2)} = -\arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$

$$x_0^{(2)} = -\arccos a$$

$$x_k^{(1)} = x_0^{(1)} + 2k\pi$$

$$x_k^{(2)} = x_0^{(2)} + 2k\pi$$



Rješenja jednadžbe  $\cos x = a$  za  $|a| \leq 1$

- $x_k^{(1)} = \arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- $x_k^{(2)} = -\arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$x_0^{(1)} = \arccos a$$


$$x_0^{(2)} = -\arccos a$$

$$x_k^{(1)} = x_0^{(1)} + 2k\pi$$

$$x_k^{(2)} = x_0^{(2)} + 2k\pi$$


Bez indeksiranja možemo sva rješenja kratko zapisati

$$x = \pm \arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$




$$\operatorname{tg} x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{arctg} x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$




$$f(x) = \operatorname{tg} x$$



Rješenja jednađbe  $\operatorname{tg} x = a$




$$f(x) = \operatorname{tg} x$$



Rješenja jednađbe  $\operatorname{tg} x = a$


$$f(x) = \operatorname{tg} x$$



Rješenja jednačbe  $\operatorname{tg} x = a$

- $x_0 = \operatorname{arctg} a$


$$f(x) = \operatorname{tg} x$$



Rješenja jednadžbe  $\operatorname{tg} x = a$

- $x_0 = \operatorname{arctg} a$
- $x_k = x_0 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$


$$f(x) = \operatorname{tg} x$$



Rješenja jednačbe  $\operatorname{tg} x = a$


- $x_0 = \operatorname{arctg} a$
- $x_k = x_0 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$


$$x_k = \operatorname{arctg} a + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



$$\operatorname{ctg} x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}$$


$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\operatorname{arccctg} x \neq 0)$$






$$f(x) = \text{ctg } x$$

Rješenja jednadžbe  $\text{ctg } x = a$




Rješenja jednačbe  $\text{ctg } x = a$



Rješenja jednadžbe  $\text{ctg } x = a$


- $x_0 = \text{arcctg } a$





Rješenja jednadžbe  $\text{ctg } x = a$

- $x_0 = \text{arcctg } a$
- $x_k = x_0 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$



Rješenja jednačbe  $\text{ctg } x = a$

- $x_0 = \text{arcctg } a$
- $x_k = x_0 + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

$$x_k = \text{arcctg } a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

## treći zadatak

---

### Zadatak 3

*Odredite domenu i nultočke sljedećih funkcija:*

a)  $h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$

b)  $f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$

c)  $g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$

## Rješenje


a) domena

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) domena




## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) domena

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$




## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2$$






## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$



## Rješenje


$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$


a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$


a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$



a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) domena

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

a) domena

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

**nultočke**

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$



## Rješenje

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$


$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$


$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 =$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$


$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$D_h$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x =$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x = \frac{2k+1}{2}\pi - 2$$



## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x = \frac{2k+1}{2}\pi - 2 : \pi$$





## Rješenje

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x = \frac{2k+1}{2}\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x = \frac{2k+1}{2} - \frac{2}{\pi}$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x = \frac{2k+1}{2}\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x = \frac{2k+1}{2} - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

## Rješenje

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x = \frac{2k+1}{2}\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x = \frac{2k+1}{2} - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

## Rješenje

$$h(x) = \operatorname{ctg}(\pi x + 2)$$

a) **domena**

$$\pi x + 2 \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x \neq k\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x \neq \frac{k\pi - 2}{\pi}$$

$$x \neq k - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \left\{ k - \frac{2}{\pi} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

ekvivalentni zapis

$$D_h = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle k - \frac{2}{\pi}, k + 1 - \frac{2}{\pi} \right\rangle$$

**nultočke**

$$\operatorname{ctg}(\pi x + 2) = 0$$

$$\pi x + 2 = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\pi x = \frac{2k+1}{2}\pi - 2 \quad / : \pi$$

$$x = \frac{2k+1}{2} - \frac{2}{\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

b)

Domena

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

b)

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

b)

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$


b)

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$






b)  $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$






$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$




$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$


$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{7}{6}\pi\right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$


$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \left[-\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi\right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$


$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \left[-\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi\right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$


$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$


$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \Big/ : 3$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$


Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \bigg/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \right]$$





$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$


Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \bigg/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \right.$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$


Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \Big/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena


$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \bigg/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena


$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \bigg/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18}, \frac{7}{18}\pi \right] + 2k\pi$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena


$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \bigg/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \right.$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena


$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \Big/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena


$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \bigg/ : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$


$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \quad / : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$





$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Domena

$$\sin 3x + \frac{1}{2} \geq 0$$


$$\sin 3x \geq -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18} \pi, \frac{12k+7}{18} \pi \right]$$

$$3x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi \right] \quad / : 3$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi \right]$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18} \pi, \frac{12k+7}{18} \pi \right]$$



$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$
$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \qquad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x =$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x =$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{\quad}{18}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x =$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{\quad}{18} \pi$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x =$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{\quad}{18} \pi$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k}{18} \pi$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) } \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \quad \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočky

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad / : 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad /: 3$$

$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18}\pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{\quad}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s + (-1)^{2s+1}}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒ k paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s + (-1)^{2s+1}}{18} \pi$$

$$x = \frac{\quad}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s + (-1)^{2s+1}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke


$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

  $k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s + (-1)^{2s+1}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + (-1)^{\text{neparan}}}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

$\Rightarrow k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s + (-1)^{2s+1}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + (-1)^{\text{neparan}}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s - 1}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

$\Rightarrow k$  paran:  $k = 2s$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot 2s + (-1)^{2s+1}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + (-1)^{\text{neparan}}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s - 1}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18}\pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18}\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{\quad}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1)}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1) + (-1)^{2s+2}}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1) + (-1)^{2s+2}}{18} \pi$$

$$x = \frac{\quad}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1) + (-1)^{2s+2}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + 6}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1) + (-1)^{2s+2}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + 6 + (-1)^{\text{paran}}}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad / \quad ^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1) + (-1)^{2s+2}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + 6 + (-1)^{\text{paran}}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + 7}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

⇒  $k$  neparan:  $k = 2s + 1$  za neki  $s \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{6 \cdot (2s + 1) + (-1)^{2s+2}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + 6 + (-1)^{\text{paran}}}{18} \pi$$

$$x = \frac{12s + 7}{18} \pi$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$b) \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{6}\pi$$

$$f(x) = \sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}}$$

Nultočke

$$\sqrt{\sin 3x + \frac{1}{2}} = 0 \quad /^2$$

$$\sin 3x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\sin 3x = -\frac{1}{2}$$

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{12k-1}{18}\pi, \frac{12k+7}{18}\pi \right]$$

jesu nultočke  
jer pripadaju domeni

$$3x = (-1)^k \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad /: 3$$



$$x = \frac{(-1)^k}{3} \cdot \frac{-\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot \pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{(-1)^{k+1}}{18} \pi + \frac{k\pi}{3}$$

$$x = \frac{6k + (-1)^{k+1}}{18} \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



c) Domena

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

c) Domena

$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

c) Domena


$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$


$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$


  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$


zbog  
nazivnika



c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$


zbog  
nazivnika

$x \neq 2$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$


domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$


zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$


domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$


$$x^2 - 3 \geq -1$$


zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$


zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x \neq 2$$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$


$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x \neq 2$$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$


$$x^2 - 2 = 0$$

$$x \neq 2$$

c) Domena

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$

$$x \neq 2$$

c) **Domena**

$x^2 - 3 \geq -1$

$x^2 - 3 \leq 1$

$x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$


$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$


$$x \neq 2$$






c) **Domena**

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$

$$x \neq 2$$



c) **Domena**

$x^2 - 3 \geq -1$

$x^2 - 3 \leq 1$

$x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



c) **Domena**

$x^2 - 3 \geq -1$

$x^2 - 3 \leq 1$

$x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$


$$x^2 - 2 \geq 0$$


$$x^2 - 2 = 0$$


$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



c) **Domena**

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$

  $x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \neq 2$$

$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$$

c) **Domena**

$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$

$\Rightarrow x - 2 \neq 0$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \neq 2$$

$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$

c) **Domena**

$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$

$$\Rightarrow x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$

$$x \neq 2$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$

c) **Domena**

$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$

$$\Rightarrow x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$

$$x \neq 2$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$

c) **Domena**

$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$

$$\Rightarrow x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$

$$x \neq 2$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$



c) **Domena**

$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$

$$\Rightarrow x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 - 3 \geq -1$$


$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$

$$x \neq 2$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$

c) **Domena**

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \geq -1$$

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \leq 1$$

$$\textcircled{p} x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$

$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, x_2 = 2$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$

c) **Domena**

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \geq -1$$

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \leq 1$$

$$\textcircled{p} x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, x_2 = 2$$



c) **Domena**

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \geq -1$$

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \leq 1$$

$$\textcircled{p} x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, x_2 = 2$$



c) **Domena**

$$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1$$

$$\Rightarrow x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} ] \cup [ \sqrt{2}, +\infty \rangle$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, x_2 = 2$$



c) **Domena**

$$\textcircled{p} \quad x^2 - 3 \geq -1$$

$$\textcircled{p} \quad x^2 - 3 \leq 1$$

$$\textcircled{p} \quad x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, \quad x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 2$$



$$x \in [-2, 2]$$

c) **Domena**

$$\textcircled{p} \quad x^2 - 3 \geq -1$$

$$\textcircled{p} \quad x^2 - 3 \leq 1$$

$$\textcircled{p} \quad x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika

$$x \neq 2$$


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, \quad x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 2$$



$$x \in [-2, 2]$$

c) Domena

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \geq -1$$

$$\textcircled{p} x^2 - 3 \leq 1$$

$$\textcircled{p} x - 2 \neq 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

domena funkcije arccos  
je segment  $[-1, 1]$

zbog  
nazivnika


$$x^2 - 3 \geq -1$$

$$x^2 - 3 + 1 \geq 0$$

$$x^2 - 2 \geq 0$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$$



$$x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$$


$$x^2 - 3 \leq 1$$

$$x^2 - 3 - 1 \leq 0$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = -2, x_2 = 2$$




$$x \in [-2, 2]$$


presjek  
rješenja




c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$

  $x^2 - 3 \leq 1$



  $x - 2 \neq 0$


presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$    $x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

  $x^2 - 3 \leq 1$



  $x - 2 \neq 0$


presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$    $x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

  $x^2 - 3 \leq 1$



  $x - 2 \neq 0$


presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$    $x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty \rangle$

  $x^2 - 3 \leq 1$



  $x - 2 \neq 0$

presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$    $x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

  $x^2 - 3 \leq 1$    $x \in [-2, 2]$



  $x - 2 \neq 0$

presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$    $x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

  $x^2 - 3 \leq 1$    $x \in [-2, 2]$

  $x - 2 \neq 0$

presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1 \rightsquigarrow x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1 \rightsquigarrow x \in [-2, 2]$

$\Rightarrow x - 2 \neq 0$

presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1 \rightsquigarrow x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1 \rightsquigarrow x \in [-2, 2]$

$\Rightarrow x - 2 \neq 0$

presjek rješenja





c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1 \rightsquigarrow x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1 \rightsquigarrow x \in [-2, 2]$



$\Rightarrow x - 2 \neq 0$

presjek rješenja



c) Domena


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

  $x^2 - 3 \geq -1$    $x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

  $x^2 - 3 \leq 1$    $x \in [-2, 2]$

  $x - 2 \neq 0$    $x \neq 2$

presjek rješenja



c) Domena

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$


$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1 \rightsquigarrow x \in \langle -\infty, -\sqrt{2} \rangle \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1 \rightsquigarrow x \in [-2, 2]$

$\Rightarrow x - 2 \neq 0 \rightsquigarrow x \neq 2$

presjek rješenja

] zamjena  $\rightsquigarrow$



c) Domena

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2)$$


$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1 \rightsquigarrow x \in \langle -\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty \rangle$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1 \rightsquigarrow x \in [-2, 2]$

$\Rightarrow x - 2 \neq 0 \rightsquigarrow x \neq 2$

presjek rješenja

] zamjena  $\rightsquigarrow$



c) Domena

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2)$$


$\Rightarrow x^2 - 3 \geq -1 \rightsquigarrow x \in \langle -\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty \rangle$

$\Rightarrow x^2 - 3 \leq 1 \rightsquigarrow x \in [-2, 2]$

$\Rightarrow x - 2 \neq 0 \rightsquigarrow x \neq 2$

presjek rješenja

] zamjena  $\rightsquigarrow$



c) Nultočky

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

c) **Nultočky**

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

c) **Nultočky**

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$




c) **Nultočky**

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$




c) Nultočky

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$



c) Nultočky


$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$



c) Nultočky

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$


$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$



c) Nultočky

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$


$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2$$



c) Nultočky

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$


$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = 2$$



c) Nultočky

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$


$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = 2$$



$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$$

c) Nultočky

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$


$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 2$$



$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$$



c) Nultočke

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$


$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 2$$



*jest nultočka jer  
pripada domeni*

$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$$

c) Nultočke

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$

$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$


$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2$$

$$\cancel{x_2 = 2}$$

*jest nultočka jer  
pripada domeni*

$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2)$$



c) Nultočke

$$\arccos x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g(x) = \frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2}$$

$$\frac{\arccos(x^2 - 3)}{x - 2} = 0$$


$$\arccos(x^2 - 3) = 0$$

$$x^2 - 3 = 1$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 2$$



*jest nultočka jer  
pripada domeni*

*nije nultočka jer  
ne pripada domeni*

$$D_g = x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$$