

Funciones Recursivas

Pablo Verdes. LCC.

9 de Abril de 2019.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.
 - Funciones parciales y totales.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.
 - Funciones parciales y totales.
 - Relacion entre FRP y funciones totales.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.
 - Funciones parciales y totales.
 - Relacion entre FRP y funciones totales.
 - La funcion de Ackermann.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.
 - Funciones parciales y totales.
 - Relacion entre FRP y funciones totales.
 - La funcion de Ackermann.
- *Nuevo operador:* Minimizador.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.
 - Funciones parciales y totales.
 - Relacion entre FRP y funciones totales.
 - La funcion de Ackermann.
- *Nuevo operador:* Minimizador.
- *Funciones recursivas:* Definicion.

- *Motivacion:* Las FRP no alcanzan.
 - Funciones parciales y totales.
 - Relacion entre FRP y funciones totales.
 - La funcion de Ackermann.
- *Nuevo operador:* Minimizador.
- *Funciones recursivas:* Definicion.
- *Tesis de Church.*

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *parcial* si no esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k . Ejemplos:

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *parcial* si no esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k . Ejemplos:
 - La funcion:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto f(n) = n/3$$

solo esta definida en $n = 0, 3, 6, 9, 12, 15, \dots$

Las FRP no alcanzan

- *Definición:* Una función numérica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *parcial* si no está definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k . Ejemplos:

- La función:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto f(n) = n/3$$

solo está definida en $n = 0, 3, 6, 9, 12, 15, \dots$

- La función:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto f(n) = \sqrt{n}$$

solo está definida en $n = 0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots$

Las FRP no alcanzan

- *Definición:* Una función numérica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *parcial* si no está definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k . Ejemplos:

- La función:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto f(n) = n/3$$

solo está definida en $n = 0, 3, 6, 9, 12, 15, \dots$

- La función:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto f(n) = \sqrt{n}$$

solo está definida en $n = 0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots$

- La función definida como: $f(0) = 0, f(n+2) = f(n) + 3$

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *total* si esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k .

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *total* si esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k .
- *Teorema:* Si $f \in FRP$ entonces f es una funcion total.

Demostracion: Por induccion sobre el conjunto FRP.

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *total* si esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k .
- *Teorema:* Si $f \in FRP$ entonces f es una funcion total.

Demostracion: Por induccion sobre el conjunto FRP.

- *Caso base:* Trivial. Las funciones base $c^{(k)}$, $p_i^{(k)}$ y $s^{(1)}$ son totales.

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *total* si esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k .
- *Teorema:* Si $f \in FRP$ entonces f es una funcion total.

Demostracion: Por induccion sobre el conjunto FRP.

- *Caso base:* Trivial. Las funciones base $c^{(k)}$, $p_i^{(k)}$ y $s^{(1)}$ son totales.
- *Composicion:* Supongamos que $f^{(n)}$, $g_1^{(k)}$, \dots , $g_n^{(k)}$ son totales y veamos que

$$h = \phi(f, g_1, g_2, \dots, g_n)$$

tambien es total. Dado $X \in \mathbb{N}^k$, podemos calcular

$$Y = (g_1(X), g_2(X), \dots, g_n(X))$$

pues cada g_i es total (H.I.). Como f es total en \mathbb{N} , podemos tambien calcular $f(Y)$. Por lo tanto, $\exists z \in \mathbb{N}$ tal que $z = F(Y) = h(X)$. Dado que $\forall X \in \mathbb{N}^k \exists h(X)$, concluimos que h es una funcion total.

Las FRP no alcanzan

- *Definicion:* Una funcion numerica $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se dice *total* si esta definida sobre todos los elementos de \mathbb{N}^k .
- *Teorema:* Si $f \in FRP$ entonces f es una funcion total.

Demostracion: Por induccion sobre el conjunto FRP.

- *Caso base:* Trivial. Las funciones base $c^{(k)}$, $p_i^{(k)}$ y $s^{(1)}$ son totales.
- *Composicion:* Supongamos que $f^{(n)}$, $g_1^{(k)}$, \dots , $g_n^{(k)}$ son totales y veamos que

$$h = \phi(f, g_1, g_2, \dots, g_n)$$

tambien es total. Dado $X \in \mathbb{N}^k$, podemos calcular

$$Y = (g_1(X), g_2(X), \dots, g_n(X))$$

pues cada g_i es total (H.I.). Como f es total en \mathbb{N} , podemos tambien calcular $f(Y)$. Por lo tanto, $\exists z \in \mathbb{N}$ tal que $z = F(Y) = h(X)$. Dado que $\forall X \in \mathbb{N}^k \exists h(X)$, concluimos que h es una funcion total.

- *Recursion:* Ejercicio 1, Practica 4.

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.
- Consideremos la pregunta inversa: ¿Sera que todas las funciones totales son FRP?
Es decir, ¿sera cierto que $f \text{ total} \Rightarrow f \in FRP$?

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.
- Consideremos la pregunta inversa: ¿Sera que todas las funciones totales son FRP?
Es decir, ¿sera cierto que $f \text{ total} \Rightarrow f \in FRP$?
- La respuesta es no: veremos a continuacion la funcion de Ackermann, que es total pero no recursiva primitiva.

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.
- Consideremos la pregunta inversa: ¿Sera que todas las funciones totales son FRP? Es decir, ¿sera cierto que $f \text{ total} \Rightarrow f \in FRP$?
- La respuesta es no: veremos a continuacion la funcion de Ackermann, que es total pero no recursiva primitiva.
- Para demostrar que dicha funcion no es FRP, la estrategia sera demostrar que todas las FRP cumplen cierta propiedad, mientras que la funcion de Ackermann no la cumple.

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.
- Consideremos la pregunta inversa: ¿Sera que todas las funciones totales son FRP? Es decir, ¿sera cierto que $f \text{ total} \Rightarrow f \in FRP$?
- La respuesta es no: veremos a continuacion la funcion de Ackermann, que es total pero no recursiva primitiva.
- Para demostrar que dicha funcion no es FRP, la estrategia sera demostrar que todas las FRP cumplen cierta propiedad, mientras que la funcion de Ackermann no la cumple.
- Resumiendo, las FRP no pueden representar a:

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.
- Consideremos la pregunta inversa: ¿Sera que todas las funciones totales son FRP? Es decir, ¿sera cierto que $f \text{ total} \Rightarrow f \in FRP$?
- La respuesta es no: veremos a continuacion la funcion de Ackermann, que es total pero no recursiva primitiva.
- Para demostrar que dicha funcion no es FRP, la estrategia sera demostrar que todas las FRP cumplen cierta propiedad, mientras que la funcion de Ackermann no la cumple.
- Resumiendo, las FRP no pueden representar a:
 - Ninguna funcion parcial.

Las FRP no alcanzan

- En otras palabras, acabamos de probar que

$$FRP \subseteq \{f/f \text{ es funcion total}\}$$

- Es decir, las FRP no pueden representar funciones parciales.
- Consideremos la pregunta inversa: ¿Sera que todas las funciones totales son FRP? Es decir, ¿sera cierto que $f \text{ total} \Rightarrow f \in FRP$?
- La respuesta es no: veremos a continuacion la funcion de Ackermann, que es total pero no recursiva primitiva.
- Para demostrar que dicha funcion no es FRP, la estrategia sera demostrar que todas las FRP cumplen cierta propiedad, mientras que la funcion de Ackermann no la cumple.
- Resumiendo, las FRP no pueden representar a:
 - Ninguna funcion parcial.
 - Todas las funciones totales.

Las FRP no alcanzan

- Decíamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:

Las FRP no alcanzan

- Decíamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.

Las FRP no alcanzan

- Decíamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta funcion (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La funcion de Ackermann no la satisface.
- En terminos coloquiales, dicha propiedad sera la siguiente:
Ser mayorado por algun elemento de la sucesion de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuacion definimos:

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:
Ser mayorado por algún elemento de la sucesión de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuación definimos:
 - La sucesión (o serie) de Ackermann, $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:
Ser mayorado por algún elemento de la sucesión de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuación definimos:
 - La sucesión (o serie) de Ackermann, $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$.
 - La función de Ackermann, $ACK(x)$.

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:
Ser mayorado por algún elemento de la sucesión de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuación definimos:
 - La sucesión (o serie) de Ackermann, $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$.
 - La función de Ackermann, $ACK(x)$.
 - El concepto “ f mayor a g ”, que indicaremos $f \uparrow g$.

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta funcion (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La funcion de Ackermann no la satisface.
- En terminos coloquiales, dicha propiedad sera la siguiente:
Ser mayorado por algun elemento de la sucesion de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuacion definimos:
 - La sucesion (o serie) de Ackermann, $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$.
 - La funcion de Ackermann, $ACK(x)$.
 - El concepto “ f mayor a g ”, que indicaremos $f \uparrow g$.
- Luego demostraremos:

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:
Ser mayorado por algún elemento de la sucesión de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuación definimos:
 - La sucesión (o serie) de Ackermann, $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$.
 - La función de Ackermann, $ACK(x)$.
 - El concepto “ f mayor a g ”, que indicaremos $f \uparrow g$.
- Luego demostraremos:
 - 1 $g \in FRP \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / f_k \uparrow g$.

Las FRP no alcanzan

- Deciamos que vamos a demostrar que cierta función (la llamada de Ackermann) no es FRP mostrando que:
 - Todos los elementos del conjunto FRP satisfacen cierta propiedad.
 - La función de Ackermann no la satisface.
- En términos coloquiales, dicha propiedad será la siguiente:
Ser mayorado por algún elemento de la sucesión de Ackermann
- Para formalizar este argumento, a continuación definimos:
 - La sucesión (o serie) de Ackermann, $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$.
 - La función de Ackermann, $ACK(x)$.
 - El concepto “ f mayor a g ”, que indicaremos $f \uparrow g$.
- Luego demostraremos:
 - 1 $g \in FRP \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / f_k \uparrow g$.
 - 2 $\nexists k \in \mathbb{N} / f_k \uparrow ACK$.

Sucesion (o serie) de Ackermann

- Consideremos la siguiente sucesion de funciones, que llamaremos *sucesion (o serie de Ackermann)*:

$$f_0(x) = s(x) = x + 1$$

$$f_1(x) = f_0^{x+2}(x) = s^{x+2}(x) = x + (x + 2) = 2x + 2$$

$$f_2(x) = f_1^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

$$f_k(x) = f_{k-1}^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

Sucesion (o serie) de Ackermann

- Consideremos la siguiente sucesion de funciones, que llamaremos *sucesion (o serie de Ackermann)*:

$$f_0(x) = s(x) = x + 1$$

$$f_1(x) = f_0^{x+2}(x) = s^{x+2}(x) = x + (x + 2) = 2x + 2$$

$$f_2(x) = f_1^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

$$f_k(x) = f_{k-1}^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

- Para ver mejor como funciona, calculemos algunos valores de $f_2(x)$:

Sucesion (o serie) de Ackermann

- Consideremos la siguiente sucesion de funciones, que llamaremos *sucesion (o serie de Ackermann)*:

$$f_0(x) = s(x) = x + 1$$

$$f_1(x) = f_0^{x+2}(x) = s^{x+2}(x) = x + (x + 2) = 2x + 2$$

$$f_2(x) = f_1^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

$$f_k(x) = f_{k-1}^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

- Para ver mejor como funciona, calculemos algunos valores de $f_2(x)$:
 - $f_2(0) = f_1^2(0) = (2(2x + 2) + 2)|_{x=0} = 6.$

Sucesion (o serie) de Ackermann

- Consideremos la siguiente sucesion de funciones, que llamaremos *sucesion (o serie de Ackermann)*:

$$f_0(x) = s(x) = x + 1$$

$$f_1(x) = f_0^{x+2}(x) = s^{x+2}(x) = x + (x + 2) = 2x + 2$$

$$f_2(x) = f_1^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

$$f_k(x) = f_{k-1}^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

- Para ver mejor como funciona, calculemos algunos valores de $f_2(x)$:
 - $f_2(0) = f_1^2(0) = (2(2x + 2) + 2)|_{x=0} = 6.$
 - $f_2(1) = f_1^3(1) = (2(2(2x + 2) + 2) + 2)|_{x=1} = 6.$

Sucesion (o serie) de Ackermann

- Consideremos la siguiente sucesion de funciones, que llamaremos *sucesion (o serie de Ackermann)*:

$$f_0(x) = s(x) = x + 1$$

$$f_1(x) = f_0^{x+2}(x) = s^{x+2}(x) = x + (x + 2) = 2x + 2$$

$$f_2(x) = f_1^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

$$f_k(x) = f_{k-1}^{x+2}(x)$$

$$\vdots$$

- Para ver mejor como funciona, calculemos algunos valores de $f_2(x)$:
 - $f_2(0) = f_1^2(0) = (2(2x + 2) + 2)|_{x=0} = 6.$
 - $f_2(1) = f_1^3(1) = (2(2(2x + 2) + 2) + 2)|_{x=1} = 6.$
 - $f_2(2) = f_1^4(2) = (2(2(2(2x + 2) + 2) + 2) + 2)|_{x=2} = 6.$

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*
 - $\forall k \in \mathbb{N} : f_k(x) \in FRP$

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*
 - $\forall k \in \mathbb{N} : f_k(x) \in FRP$
 - $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) > x$

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*

- $\forall k \in \mathbb{N} : f_k(x) \in FRP$
- $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) > x$
- $\forall x_1, x_2, k \in \mathbb{N} : x_1 < x_2 \Rightarrow f_k(x_1) < f_k(x_2)$

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*

- $\forall k \in \mathbb{N} : f_k(x) \in FRP$
- $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) > x$
- $\forall x_1, x_2, k \in \mathbb{N} : x_1 < x_2 \Rightarrow f_k(x_1) < f_k(x_2)$
- $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) < f_{k+1}(x)$

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*
 - $\forall k \in \mathbb{N} : f_k(x) \in FRP$
 - $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) > x$
 - $\forall x_1, x_2, k \in \mathbb{N} : x_1 < x_2 \Rightarrow f_k(x_1) < f_k(x_2)$
 - $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) < f_{k+1}(x)$
- *Demostracion:* Ejercicio 2, Practica 4.

Funcion de Ackermann

- *Propiedades:*
 - $\forall k \in \mathbb{N} : f_k(x) \in FRP$
 - $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) > x$
 - $\forall x_1, x_2, k \in \mathbb{N} : x_1 < x_2 \Rightarrow f_k(x_1) < f_k(x_2)$
 - $\forall x, k \in \mathbb{N} : f_k(x) < f_{k+1}(x)$
- *Demostracion:* Ejercicio 2, Practica 4.
- *Definicion:* Funcion de Ackermann

$$ACK(x) = f_x(x)$$

Calculemos algunos valores en el pizarron.

- *Definicion:* Decimos que una funcion $f^{(1)}$ *mayora* a otra funcion $g^{(n)}$ si $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{N}$ se verifica que:

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\})$$

Notacion: $f^{(1)} \uparrow g^{(n)}$.

- *Definicion:* Decimos que una funcion $f^{(1)}$ *mayora* a otra funcion $g^{(n)}$ si $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{N}$ se verifica que:

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\})$$

Notacion: $f^{(1)} \uparrow g^{(n)}$.

- ① *Teorema:* Sea $g^{(n)} \in FRP$, entonces existe f_k de la sucesion de Ackermann tal que $f_k \uparrow g$. *Demostracion:* Por induccion en g . No la hacemos en clase (ver el libro *Temas de Teoria de la Computacion, Proyecto LATIn, pag. 56*).

- *Definicion:* Decimos que una funcion $f^{(1)}$ *mayora* a otra funcion $g^{(n)}$ si $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{N}$ se verifica que:

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\})$$

Notacion: $f^{(1)} \uparrow g^{(n)}$.

- 1 *Teorema:* Sea $g^{(n)} \in FRP$, entonces existe f_k de la sucesion de Ackermann tal que $f_k \uparrow g$. *Demostracion:* Por induccion en g . No la hacemos en clase (ver el libro *Temas de Teoria de la Computacion, Proyecto LATIn, pag. 56*).
- 2 *Teorema:* $ACK(x) \notin FRP$. *Demostracion:* Por el absurdo, supongamos que $ACK(x) \in FRP$. Luego $ACK(x) + 1 \in FRP$. Por el teorema anterior, existe f_M en la sucesion de Ackermann que la mayor:

$$\forall x \in \mathbb{N} : ACK(x) + 1 \leq f_M(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{N} : f_x(x) + 1 \leq f_M(x)$$

$$x = M \Rightarrow f_M(M) + 1 \leq f_M(M) \text{ Absurdo!}$$

Operador Minimizador M

- Con la intencion de completar nuestro modelo de calculo, agregamos un nuevo operador.

Operador Minimizador M

- Con la intencion de completar nuestro modelo de calculo, agregamos un nuevo operador.
- *Definicion:* Operador Minimizador M. Dada $h^{(n+1)}$, decimos que $g^{(n)}$ se construye por minimizacion de h (y lo notaremos $g = M[h]$) cuando g se define del modo siguiente:

$$g(X) = M[h](X) = \mu_t(h(t, X) = 0)$$

donde $\mu_t(h(t, X) = 0)$ es, si existe, el minimo valor de t tal que $h(t, X) = 0$.

Operador Minimizador M

- Con la intencion de completar nuestro modelo de calculo, agregamos un nuevo operador.
- *Definicion:* Operador Minimizador M. Dada $h^{(n+1)}$, decimos que $g^{(n)}$ se construye por minimizacion de h (y lo notaremos $g = M[h]$) cuando g se define del modo siguiente:

$$g(X) = M[h](X) = \mu_t(h(t, X) = 0)$$

donde $\mu_t(h(t, X) = 0)$ es, si existe, el minimo valor de t tal que $h(t, X) = 0$.

- *Observacion:* Nada garantiza que tal valor de t exista. Por lo tanto, las funciones construidas con el operador M pueden ser parciales.

Ejemplos

- La función *cociente* $C(x, y) = x/y$, que solo está definida si existe t tal que $ty = x$: $C(x, y) = \mu_t(h(t, x, y) = 0)$ donde

$$h(t, x, y) = (ty \dot{-} x) + (x \dot{-} ty)$$

Ejemplos

- La función *cociente* $C(x, y) = x/y$, que solo está definida si existe t tal que $ty = x$: $C(x, y) = \mu_t(h(t, x, y) = 0)$ donde

$$h(t, x, y) = (ty \dot{-} x) + (x \dot{-} ty)$$

- La función *logaritmo* $\log(x, y) = \log_x(y)$, que solo está definida si existe t tal que $x^t = y$: $\log(x, y) = \mu_t(h(t, x, y) = 0)$ donde

$$h(t, x, y) = (x^t \dot{-} y) + (y \dot{-} x^t)$$

Ejemplos

- La funcion *cociente* $C(x, y) = x/y$, que solo esta definida si existe t tal que $ty = x$: $C(x, y) = \mu_t(h(t, x, y) = 0)$ donde

$$h(t, x, y) = (ty \dot{-} x) + (x \dot{-} ty)$$

- La funcion *logaritmo* $\log(x, y) = \log_x(y)$, que solo esta definida si existe t tal que $x^t = y$: $\log(x, y) = \mu_t(h(t, x, y) = 0)$ donde

$$h(t, x, y) = (x^t \dot{-} y) + (y \dot{-} x^t)$$

- La funcion *raiz enesima* $Rad(x, n) = \sqrt[n]{x}$, que solo esta definida si existe t tal que $t^n = x$: $Rad(x, n) = \mu_t(h(t, x, y) = 0)$ donde

$$h(t, x, y) = (t^n \dot{-} x) + (x \dot{-} t^n)$$

Pseudocodigo

Pseudocódigo

La siguiente analogía muestra como dada $h^{(n+1)}$, podemos pensar a $g = M[h]$ como un programa:

Pseudocodigo

La siguiente analogia muestra como dada $h^{(n+1)}$, podemos pensar a $g = M[h]$ como un programa:

```
def g(X):  
    t = 0  
    while (h(t,X) != 0):  
        t += 1  
    return t
```

Funciones Recursivas

- *Definicion:* Definimos inductivamente el conjunto de *Funciones Recursivas (FR)* como el menor conjunto tal que:

Funciones Recursivas

- *Definicion:* Definimos inductivamente el conjunto de *Funciones Recursivas (FR)* como el menor conjunto tal que:
 - Las funciones base pertenecen a FR.

Funciones Recursivas

- *Definicion:* Definimos inductivamente el conjunto de *Funciones Recursivas (FR)* como el menor conjunto tal que:
 - Las funciones base pertenecen a FR.
 - Las funciones obtenidas aplicando un numero finito de operaciones de composicion (ϕ), recursion (R) y minimizacion (M) sobre elementos de FR tambien pertenecen a FR.

Funciones Recursivas

- *Definicion:* Definimos inductivamente el conjunto de *Funciones Recursivas (FR)* como el menor conjunto tal que:
 - Las funciones base pertenecen a FR.
 - Las funciones obtenidas aplicando un numero finito de operaciones de composicion (ϕ), recursion (R) y minimizacion (M) sobre elementos de FR tambien pertenecen a FR.
- Observemos que $FRP \subset FR$.

Funciones Recursivas

- *Definicion:* Definimos inductivamente el conjunto de *Funciones Recursivas (FR)* como el menor conjunto tal que:
 - Las funciones base pertenecen a FR.
 - Las funciones obtenidas aplicando un numero finito de operaciones de composicion (ϕ), recursion (R) y minimizacion (M) sobre elementos de FR tambien pertenecen a FR.
- Observemos que $FRP \subset FR$.
- Se extiende la propiedad de ser *revursivos* a conjuntos y relaciones de manera analoga a como se hizo para la recursion primitiva.

Funciones Recursivas

- *Definicion:* Definimos inductivamente el conjunto de *Funciones Recursivas (FR)* como el menor conjunto tal que:
 - Las funciones base pertenecen a FR.
 - Las funciones obtenidas aplicando un numero finito de operaciones de composicion (ϕ), recursion (R) y minimizacion (M) sobre elementos de FR tambien pertenecen a FR.
- Observemos que $FRP \subset FR$.
- Se extiende la propiedad de ser *revursivos* a conjuntos y relaciones de manera analoga a como se hizo para la recursion primitiva.
- Todos los mecanismos que permiten construir elementos nuevos de FRP, CRP y RRP a partir de otros elementos pueden ser extendidos al caso de FR, CR y RR.

Tesis de Church

- ¿Hara falta introducir algun operador mas?

Tesis de Church

- ¿Hara falta introducir algun operador mas?
- La *Tesis de Church* afirma que el conjunto de las FR coincide con el de las funciones “calculables”.

Tesis de Church

- ¿Hara falta introducir algun operador mas?
- La *Tesis de Church* afirma que el conjunto de las FR coincide con el de las funciones “calculables”.
- Por funcion “calculable” entendemos una funcion para la cual podemos, en principio, obtener el valor de la imagen de cualquier elemento de su dominio mediante un algoritmo. (Esto no significa que efectivamente podamos realizar el calculo pues podria haber limitaciones de tiempo y espacio).

Tesis de Church

- ¿Hara falta introducir algun operador mas?
- La *Tesis de Church* afirma que el conjunto de las FR coincide con el de las funciones “calculables”.
- Por funcion “calculable” entendemos una funcion para la cual podemos, en principio, obtener el valor de la imagen de cualquier elemento de su dominio mediante un algoritmo. (Esto no significa que efectivamente podamos realizar el calculo pues podria haber limitaciones de tiempo y espacio).
- Observemos que no es posible demostrar la Tesis de Church, pues la definicion de funcion “calculable” es intuitiva pero no rigurosa.

Tesis de Church

- ¿Hara falta introducir algun operador mas?
- La *Tesis de Church* afirma que el conjunto de las FR coincide con el de las funciones “calculables”.
- Por funcion “calculable” entendemos una funcion para la cual podemos, en principio, obtener el valor de la imagen de cualquier elemento de su dominio mediante un algoritmo. (Esto no significa que efectivamente podamos realizar el calculo pues podria haber limitaciones de tiempo y espacio).
- Observemos que no es posible demostrar la Tesis de Church, pues la definicion de funcion “calculable” es intuitiva pero no rigurosa.
- Sin embargo, en la busqueda de otros posibles modelos para el calculo (que estudiaremos en la materia) no se ha encontrado ningun algoritmo que no pueda ser representado como una FR.