# Catálogo farmacéutico integral

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Losartán | Losartán | 50, 100 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial; nefropatía diabética en pacientes seleccionados. |
| Amlodipino | Amlodipino | 5, 10 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial y angina de pecho. |
| Enalapril | Enalapril | 5, 10, 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca. |
| Lisinopril | Lisinopril | 10, 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca; determinados pacientes tras infarto. |
| Valsartán | Valsartán | 80, 160 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y pacientes seleccionados tras infarto. |
| Hidroclorotiazida | Hidroclorotiazida | 25 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial y edema. |

Categoría terapéutica: Cardiovascular e hipertensión. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Cardiovascular e hipertensión (continuación)

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Clortalidona | Clortalidona | 12.5, 25 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial; edema en casos seleccionados. |
| Furosemida | Furosemida | 40 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Retención de líquidos por insuficiencia cardiaca, enfermedad renal o hepática. |
| Espironolactona | Espironolactona | 25, 100 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Insuficiencia cardiaca, hiperaldosteronismo, edema e hipertensión seleccionada. |
| Bisoprolol | Bisoprolol | 2.5, 5 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipertensión arterial; insuficiencia cardiaca según indicación local. |
| Carvedilol | Carvedilol | 6.25, 12.5, 25 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Insuficiencia cardiaca, hipertensión y disfunción ventricular tras infarto. |
| Metoprolol (succinato) | Metoprolol succinato, liberación prolongada | 25, 50, 100 mg | Liberación prolongada; forma por confirmar | Hipertensión arterial, angina e insuficiencia cardiaca. |

Categoría terapéutica: Cardiovascular e hipertensión (continuación). Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Diabetes y metabolismo

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Metformina | Metformina, liberación inmediata | 500, 850, 1000 mg | Liberación inmediata; forma por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2. |
| Metformina | Metformina, liberación prolongada | 500, 1000 mg | Liberación prolongada; forma por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2. |
| Gliclazida | Gliclazida, liberación modificada | 30, 60 mg | Liberación modificada; forma por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2. |
| Glimepirida | Glimepirida | 1, 2, 4 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2. |
| Sitagliptina | Sitagliptina | 50, 100 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2. |
| Linagliptina | Linagliptina | 5 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2. |
| Dapagliflozina | Dapagliflozina | 10 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Diabetes tipo 2; insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica en pacientes elegibles. |
| Empagliflozina | Empagliflozina | 10, 25 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Diabetes tipo 2; insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica en pacientes elegibles. |
| Dapagliflozina + metformina | Dapagliflozina + metformina LP | 10/1000 mg | Combinación de liberación prolongada | Diabetes mellitus tipo 2 cuando se requiere tratamiento combinado. |
| Sitagliptina + metformina | Sitagliptina + metformina | 50/500, 50/1000 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Diabetes mellitus tipo 2 cuando se requiere tratamiento combinado. |

Categoría terapéutica: Diabetes y metabolismo. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Lípidos y antitrombóticos

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Atorvastatina | Atorvastatina | 10, 20, 40 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Colesterol elevado; reducción del riesgo cardiovascular según perfil clínico. |
| Rosuvastatina | Rosuvastatina | 5, 10, 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Colesterol elevado; reducción del riesgo cardiovascular según perfil clínico. |
| Simvastatina | Simvastatina | 20, 40 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Colesterol elevado y prevención cardiovascular en pacientes elegibles. |
| Ezetimiba | Ezetimiba | 10 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Colesterol elevado, sola o combinada con una estatina. |
| Clopidogrel | Clopidogrel | 75 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención de eventos aterotrombóticos tras infarto, ictus o en enfermedad arterial periférica; síndrome coronario agudo. |
| Ácido acetilsalicílico | Ácido acetilsalicílico, dosis baja | 81 o 100 mg según mercado | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes seleccionados, principalmente prevención secundaria. |
| Warfarina | Warfarina | 1, 2.5, 5 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención y tratamiento de trombosis y embolias; fibrilación auricular y determinadas prótesis valvulares. |
| Apixabán | Apixabán | 2.5, 5 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención de ictus en fibrilación auricular no valvular; trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. |
| Rivaroxabán | Rivaroxabán | 10, 15, 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y prevención de ictus en fibrilación auricular no valvular. |

Categoría terapéutica: Lípidos y antitrombóticos. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Dolor, inflamación y gota

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Paracetamol | Paracetamol (acetaminofén) | 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Dolor leve a moderado y fiebre. |
| Ibuprofeno | Ibuprofeno | 200, 400 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Dolor, fiebre e inflamación; artritis. |
| Naproxeno | Naproxeno | 250, 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Dolor e inflamación musculoesquelética; artritis. |
| Diclofenaco | Diclofenaco, recubrimiento entérico | 50 mg | Recubrimiento entérico | Dolor e inflamación; osteoartritis y artritis reumatoide. |
| Meloxicam | Meloxicam | 7.5, 15 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Dolor e inflamación por osteoartritis y artritis reumatoide. |
| Alopurinol | Alopurinol | 100, 300 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Control de hiperuricemia crónica y prevención de gota; no alivia de inmediato una crisis. |
| Colchicina | Colchicina | 0.5 o 0.6 mg según mercado | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Tratamiento y prevención de crisis de gota; fiebre mediterránea familiar según registro local. |

Categoría terapéutica: Dolor, inflamación y gota. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Gastroenterología

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Pantoprazol | Pantoprazol, liberación retardada | 20, 40 mg | Liberación retardada | Reflujo gastroesofágico y esofagitis; estados de hipersecreción ácida. |
| Omeprazol | Omeprazol, liberación retardada | 20 mg | Tabletas de liberación retardada; confirmar | Reflujo, úlceras y esofagitis; esquemas combinados contra H. pylori. |
| Famotidina | Famotidina | 20, 40 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Reflujo gastroesofágico y úlceras gástricas o duodenales. |
| Ondansetrón | Ondansetrón | 4, 8 mg | Forma convencional o dispersable | Prevención de náuseas y vómitos por quimioterapia, radioterapia o cirugía según presentación. |
| Metoclopramida | Metoclopramida | 10 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Gastroparesia diabética y ciertos casos de reflujo; uso limitado por riesgo de movimientos involuntarios. |
| Bisacodilo | Bisacodilo, recubrimiento entérico | 5 mg | Recubrimiento entérico | Estreñimiento ocasional; preparación intestinal según protocolo. |
| Senósidos (senna) | Senósidos estandarizados | 7.5 o 8.6 mg según mercado | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Estreñimiento ocasional. |

Categoría terapéutica: Gastroenterología. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Antimicrobianos y antiparasitarios

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina | Amoxicilina dispersable | 250, 500 mg | Dispersable | Infecciones bacterianas susceptibles respiratorias, de oído y otras; según diagnóstico. |
| Amoxicilina + clavulanato | Amoxicilina + clavulanato | 500/125, 875/125 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Infecciones bacterianas susceptibles respiratorias, de piel y otras. |
| Azitromicina | Azitromicina | 250, 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Infecciones bacterianas susceptibles respiratorias y determinadas infecciones de transmisión sexual. |
| Doxiciclina | Doxiciclina, tabletas | 100 mg | Tabletas | Infecciones bacterianas susceptibles; acné y determinadas infecciones transmitidas por vectores. |
| Ciprofloxacino | Ciprofloxacino | 250, 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Infecciones bacterianas susceptibles urinarias y otras; selección según cultivo y riesgo. |
| Trimetoprima + sulfametoxazol | Trimetoprima + sulfametoxazol | 80/400, 160/800 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Infecciones urinarias susceptibles; tratamiento o prevención de neumonía por Pneumocystis jirovecii. |
| Metronidazol | Metronidazol | 250, 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Infecciones por bacterias anaerobias; tricomoniasis y amebiasis. |
| Fluconazol | Fluconazol, tabletas | 50, 150, 200 mg | Tabletas | Candidiasis y determinadas infecciones por hongos; criptococosis en esquemas específicos. |
| Albendazol | Albendazol masticable | 400 mg | Masticable | Parasitosis intestinales; neurocisticercosis e hidatidosis con esquemas especializados. |
| Mebendazol | Mebendazol masticable | 100, 500 mg | Masticable | Parasitosis intestinales por helmintos, como oxiuros y áscaris. |
| Ivermectina | Ivermectina | 3, 6 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Estrongiloidiasis y oncocercosis; otras parasitosis según indicación local. |

Categoría terapéutica: Antimicrobianos y antiparasitarios. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Alergia y apoyo respiratorio

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Cetirizina | Cetirizina | 10 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Rinitis alérgica y urticaria. |
| Loratadina | Loratadina | 10 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Rinitis alérgica y urticaria. |
| Fexofenadina | Fexofenadina | 120, 180 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Rinitis alérgica y urticaria. |
| Montelukast | Montelukast | 4, 5, 10 mg | Masticable: 4 y 5 mg; 10 mg: forma por confirmar | Control del asma y prevención del broncoespasmo por ejercicio; rinitis alérgica cuando otras opciones no son adecuadas. No sirve como rescate. |

Categoría terapéutica: Alergia y apoyo respiratorio. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Neurología y salud mental

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Sertralina | Sertralina | 50, 100 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Depresión, trastorno obsesivo compulsivo, pánico y otros trastornos de ansiedad según registro. |
| Fluoxetina | Fluoxetina, tabletas | 20 mg | Tabletas | Depresión, trastorno obsesivo compulsivo, bulimia y pánico según registro. |
| Escitalopram | Escitalopram | 10, 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Depresión y trastorno de ansiedad generalizada. |
| Amitriptilina | Amitriptilina | 10, 25 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Depresión; otros usos requieren valoración clínica y confirmación de indicación local. |
| Risperidona | Risperidona | 1, 2 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Esquizofrenia y episodios maníacos del trastorno bipolar; otras indicaciones según registro. |
| Quetiapina | Quetiapina | 25, 100, 200 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Esquizofrenia y trastorno bipolar; algunas formulaciones se usan como complemento en depresión. |
| Levetiracetam | Levetiracetam | 500, 1000 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Epilepsia: determinados tipos de crisis convulsivas. |
| Carbamazepina | Carbamazepina | 200 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Epilepsia y neuralgia del trigémino. |
| Valproato de sodio | Valproato de sodio | 200, 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Epilepsia; otras indicaciones dependen de la formulación y del registro local. |

Categoría terapéutica: Neurología y salud mental. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Endocrinología, hueso y nutrición

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Levotiroxina | Levotiroxina | 25, 50, 100 microgramos | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Hipotiroidismo; supresión de TSH en casos seleccionados de cáncer tiroideo. |
| Prednisona | Prednisona | 5, 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Enfermedades inflamatorias, alérgicas y autoinmunes que requieren corticosteroides. |
| Dexametasona | Dexametasona | 0.5, 4 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Enfermedades inflamatorias, alérgicas y autoinmunes; usos oncológicos de soporte según protocolo. |
| Alendronato | Alendronato | 70 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Osteoporosis y reducción del riesgo de fracturas. |
| Sulfato ferroso | Sulfato ferroso | equivalente a 60–65 mg hierro elemental | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención y tratamiento de deficiencia de hierro y anemia ferropénica. |
| Ácido fólico | Ácido fólico | 1, 5 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Deficiencia de folato y anemia megaloblástica; prevención de defectos del tubo neural según pauta. |
| Calcio + colecalciferol (vitamina D3) | Calcio + vitamina D3 | 500 mg calcio elemental/400 UI | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Aporte de calcio y vitamina D; apoyo en prevención o tratamiento de deficiencias y osteoporosis. |
| Colecalciferol (vitamina D3) | Vitamina D3 | 1000, 2000 UI | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina D. |

Categoría terapéutica: Endocrinología, hueso y nutrición. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Oncología oral y trasplantes

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Capecitabina | Capecitabina | 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Determinados casos de cáncer colorrectal y cáncer de mama, sola o en combinación. |
| Imatinib | Imatinib | 100, 400 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Leucemia mieloide crónica y tumores del estroma gastrointestinal con biomarcadores específicos. |
| Letrozol | Letrozol | 2.5 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Cáncer de mama con receptores hormonales positivos, principalmente en posmenopausia. |
| Anastrozol | Anastrozol | 1 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Cáncer de mama con receptores hormonales positivos en posmenopausia. |
| Tamoxifeno | Tamoxifeno | 20 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Cáncer de mama con receptores hormonales positivos; reducción de riesgo en pacientes seleccionadas. |
| Micofenolato mofetilo | Micofenolato mofetilo | 500 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención del rechazo en trasplantes de órganos, en combinación con otros inmunosupresores. |
| Micofenolato de sodio | Micofenolato de sodio, liberación retardada | 180, 360 mg | Liberación retardada | Prevención del rechazo de trasplante renal, en combinación con otros inmunosupresores. |
| Azatioprina | Azatioprina | 50 mg | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención del rechazo de trasplante renal y artritis reumatoide según indicación local. |
| Everolimus | Everolimus | 0.25, 0.5, 0.75 mg para trasplante | Producto oral; forma y empaque por confirmar | Prevención del rechazo en determinados trasplantes renales o hepáticos. Estas concentraciones corresponden a trasplante. |

Categoría terapéutica: Oncología oral y trasplantes. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Otros medicamentos y productos básicos

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Tacrolimus | Tacrolimus | 0.5, 1, 5 mg | Cápsulas | Prevención del rechazo en trasplantes de órganos; cápsulas orales. |
| Tamsulosina | Tamsulosina | 0.4 mg | Cápsulas de liberación modificada | Síntomas urinarios por hiperplasia prostática benigna. |
| Pregabalina | Pregabalina | 75, 150 mg | Cápsulas | Dolor neuropático y tratamiento complementario de ciertas crisis epilépticas; otras indicaciones según registro. |
| Sales de rehidratación oral; composición por confirmar | Sales de rehidratación oral | Composición según mercado | Sobres; composición según mercado | Prevención y tratamiento de deshidratación por diarrea mediante reposición de agua y electrolitos. |

Categoría terapéutica: Otros medicamentos y productos básicos. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Quimioterapia inyectable

Plazo declarado: 4 a 6 meses, sujeto a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Carboplatino | Carboplatino 150 mg | 150 mg | Vial; volumen por confirmar | Cáncer de ovario; otros tumores según protocolo oncológico y registro local. |
| Carboplatino | Carboplatino 450 mg | 450 mg | Vial; volumen por confirmar | Cáncer de ovario; otros tumores según protocolo oncológico y registro local. |
| Paclitaxel | Paclitaxel 300 mg | 300 mg | Vial; volumen por confirmar | Determinados casos de cáncer de mama, ovario y pulmón; sarcoma de Kaposi asociado a sida. |
| Docetaxel | Docetaxel 80 mg | 80 mg | Envase comercial por confirmar | Determinados casos de cáncer de mama, pulmón, próstata, estómago y cabeza y cuello. |
| Gemcitabina | Gemcitabina 1 g | 1 g | Vial; volumen por confirmar | Determinados casos de cáncer de páncreas, pulmón, mama y ovario. |
| Oxaliplatino | Oxaliplatino 100 mg | 100 mg | Vial; volumen por confirmar | Cáncer de colon y recto, en combinación con otros antineoplásicos. |
| Oxaliplatino | Oxaliplatino 50 mg | 50 mg | Vial; volumen por confirmar | Cáncer de colon y recto, en combinación con otros antineoplásicos. |
| Cisplatino | Cisplatino 50 mg | 50 mg | Vial; volumen por confirmar | Determinados casos de cáncer de testículo, ovario y vejiga; otros tumores según protocolo. |

Categoría terapéutica: Quimioterapia inyectable. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

# Soporte oncológico y medicamentos biológicos

Plazo declarado: 4 a 6 meses, sujeto a confirmación.

| INGREDIENTE ACTIVO / API | MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN | FORMA / ENVASE | TRATAMIENTO O ENFERMEDAD |
|---|---|---|---|---|
| Ondansetrón | Ondansetrón inyectable | No especificada | Inyectable; concentración y envase por confirmar | Prevención de náuseas y vómitos por quimioterapia y cirugía según registro. |
| Filgrastim | Filgrastim 300 microgramos | 300 microgramos | Paquete de 5 envases; volumen por confirmar | Neutropenia asociada a quimioterapia; otras neutropenias y movilización de células progenitoras en pacientes elegibles. |
| Pegfilgrastim | Pegfilgrastim 6 mg | 6 mg | Jeringa; volumen por confirmar | Reducción de infecciones asociadas a neutropenia febril en pacientes con ciertos cánceres que reciben quimioterapia. |
| Trastuzumab | Trastuzumab 440 mg | 440 mg | Vial; volumen por confirmar | Cáncer de mama HER2 positivo y determinados cánceres gástricos o de unión gastroesofágica HER2 positivos. |
| Bevacizumab | Bevacizumab 400 mg | 400 mg | Vial; volumen por confirmar | Determinados cánceres colorrectales, pulmonares, renales, cervicales y ováricos; glioblastoma, según esquema y registro. |
| Bevacizumab | Bevacizumab 100 mg | 100 mg | Vial; volumen por confirmar | Determinados cánceres colorrectales, pulmonares, renales, cervicales y ováricos; glioblastoma, según esquema y registro. |
| Rituximab | Rituximab 500 mg | 500 mg | Paquete de 2 viales; volumen por confirmar | Linfomas no Hodgkin de células B CD20 positivas y leucemia linfocítica crónica; determinadas enfermedades autoinmunes según registro. |
| Rituximab | Rituximab 100 mg | 100 mg | Paquete de 2 viales; volumen por confirmar | Linfomas no Hodgkin de células B CD20 positivas y leucemia linfocítica crónica; determinadas enfermedades autoinmunes según registro. |

Categoría terapéutica: Soporte oncológico y medicamentos biológicos. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.