

ANNE KARNINDA BEBEK NE HİSSEDER?







Ultrasonografi ve diğ er inceleme y ntemleri geliřmeden  nceki d nmelerde dođmadan  nce bebeklerin duygularının hiř geliřmemiř olduđu ve verdikleri hiřkırık, tekme atma gibi tepkilerin tamamen rastlantısal refleks hareketlerden ibaret olduđu d ř n l rd .



Günümüzdeyse, bebeğin beş
duyusunun gebeliğin en erken
aşamalarında gelişmeye
başladığını, verdikleri tepkilerin
aslında oldukça anlamlı yanıtlar
olduğunu biliyoruz.



TAT ALMA DUYUSUNUN GELİŞİMİ




Anne karnındaki bebekler de ilk olarak gelişen duyu, tat alma duyusudur. Gebeliğin 12. haftasında gelişmeye başlayan tat alıcı hücreler 28. haftada gelişmelerini büyük ölçüde tamamlamış olurlar. Amnios sıvısının tadı anne adaylarının aldığı gıdaya göre değişiklik gösterebilir.



Yenidoğan bir bebeğin koku hafızası o kadar gelişmiştir ki, annesine ait kokuları binlercesi arasından tanıyabilir. Yapılan bir çalışmada suni meme ucuna bebeğin kendi amnios sıvısından bir miktar sürdüğünde bebeğin bu memeyi daha güçlü emdiği gözlenmiş, bu da bebeğin henüz doğmadan bir koku ve tat hafızası geliştirdiğini göstermektedir.



HAREKET SİSTEMİNİN GELİŞİMİ



Fetus gebeliğin başlangıcından yaklaşık yedi hafta sonra hareket etmeye başlasa da, anneler yaklaşık 16- 21. haftaya kadar, bebeklerinin hareketini genelde hissetmezler. Fetusun yaptığı hareketler, yavaş kıvranma hareketleri, sert tekmeler ve küçük ritmik tekmeler şeklinde olur.

Ritmik tekmeler beşinci aydan dokuzuncu aya kadar sabit bir sıklıkla devam ederken, kıvranma hareketleri gebelik ilerledikçe artma eğimli gösterir.



Sert tekmeler yedinci aya kadar artar, sonra yavaş yavaş azalır. Bu tekmelerin bazıları, fetusun uyku düzeniyle ilişkili olabilen döngüsel bir düzen gösterirler. Hamileliğin geç dönemlerinde çoğunlukla, fetusun aktivite düzeni de artar.



Stres uzarsa, fetus hareketleri buna paralel olarak normal düzeyin 10 katına kadar artar. Ayrıca, anne yorgun olduđu zaman da fetusun aktiviteleri artabilir.



Gebeliğin başlangıcından 11 hafta sonra fetus, çevresindeki amniotik sıvıyı yutmaya ve bunu idrarla dışarı çıkarmaya başlar. Aynı zamanda kompleks ifadeleri geliştirir ve hatta gülümseyebilir.





Gebeliğin sonuna doğru, sanki nefes alıyormuş gibi fetusun göğüs duvarı genişler ve kasılır. Yaklaşık %70 oranında meydana gelen bu hareketler, iç çekmeler ve hıçkırıklarla sık sık kesilir.



RAB 4-8P/Obstetric

9022-04-02-17-6

3.4/ 9.2cm / 2Hz

17.02.2004

16:40:54



DOKUNMA VE AĞRI DUYUSUNUN GELİŞİMİ





Dokunma algılayıcıları, fetus henüz 7 haftalıkken ilk olarak ağız çevresinde ortaya çıkar. Buradan tüm yüze, kollara, bacaklara ve nihayet vücuda yayılarak 20. haftanın sonuna doğru son şeklini alır.



Döllenmeden dokuz hafta sonra bebek, avucundaki nesneyi parmaklarını bükerek saklayacak düzeye gelmiş olur. Ayak tabanına dokunmaya yanıt olarak, bebek ayak tabanını kıvrıracak nesneden uzaklaşmak için kalça ve dizlerini büker.



Bebek 12. haftada baş parmaklarını ve diğer parmaklarını kapatabilir ve baş parmağın tabanına uygulanan basınca yanıt olarak ağzını açar.



Önceleri fetus, elleri ağzına değdiğinde başını ters yöne çevirir. Daha sonra başını ellerine doğru çevirebilir ve hatta bir parmağını ağzına sokup onu emebilir. Bu arama refleksi doğumdan sonra da devam eder.



Anne elini karnının üzerine koyduğunda yada babası ona oyun yaptığında (örneğin annenin karnına parmağıyla bastırdığında) bebek onu hissedebilir. Bazı bebekler bu hareketlere içeride elinin hissettiği yere koyarak cevap verir.

İŞİTME DUYUSUNUN GELİŞİMİ






Ondokuzuncu yüzyılın sonuna kadar bebeklerin hem dilsiz hem sağır oldukları düşünülüyordu. Gerekçeyse fetusta iç kulak, gebelik ortalarına doğru tamamen gelişmiş olur ve çok çeşitli seslere yanıt verir.



Fetus, çevresindeki sesler, ışık ve dokunma ile rahatsız edilir ve dışarıdan gelen bu uyarılara hareket ederek yanıt verir. Doğmamış bebekte 10. haftada dış kulak ve kulak zarı gelişir, 18. haftada gelişmeye başlayan orta kulak kemikleri bu gelişmelerini yaklaşık olarak 32. haftada tamamlarlar.




Fetus, uterus içinde sürekli olarak uterus kan akımının ritmik sesi, annenin bağırsaklarından geçen havanın gürültüsü gibi seslerle çevrilidir. Kapının hızla çarpılması ya da yüksek sesle müzik gibi uterusun dışından gelen yüksek sesler fetusa ulaşır, o da bunlara tepki verir.



Fetusun hareketleri düşük sesli frekanslarla azalma ve yüksek frekanslarla artma eğilimi gösterir. Kalın sesler uterusu daha kolay geçer ancak içeride dağılırlar. İnce seslerse daha zor geçmelerine karşın fetus tarafından daha net algılanır. Fetüsler gibi yenidoğan bebeklerde ince seslere daha olumlu yanıtlar verirler.



Belki de bu yüzden anne ve babalar bebekleriyle konuşurken bilinç altı bir mekanizmayla seslerini incelterek konuşurlar. Bebeklerinin yüksek sesli müziğe ve gürültüye tepki gösterdiklerini anneler anlayabilir. Bununla birlikte yüksek ses ve gürültü bebeğinizi rahatsız etmez. Çünkü onun kulakları anne karnında oldukça iyi bir şekilde korunmaktadır.



Doğumdan sonra anneler, bebeklerini sol göğüsleri üzerinde tutmayı tercih ederler. Bu şekilde tutulan bebek, uterusda dinlediği ritme benzeyen, sakinleştirici bir etkisi olduğu sanılan, annesinin kalp atışlarını işitebilir. Erişkin kalp atışları ya da uterus içindeki gürültü kaydedilerek bebeklere dinletildiğinde, bebekler üzerinde sakinleştirici etki yaptığı görülmüş bulunuyor.

GÖRME DUYUSUNUN GELİŞİMİ





Doğmamış bebekte gelişimini en son tamamlayan duyu görme duyusudur. Fetus 25. haftadan önce uyaranlara duyarlı olmadığı son haftadan itibaren ise giderek artan ışık gibi uyaranlara güçlü yanıtlar verdiği gözlemlendi. Göz kapakları hareketleri de yine bu dönemde başlamakta.

A close-up photograph of a newborn baby inside a uterus. The baby is curled up, with its head turned towards the left. The surrounding tissue is a deep red color, and the umbilical cord is visible, looping around the baby's body. The lighting is soft, highlighting the baby's features.

Sesten farklı olarak uterus (rahim) ışığı geçirme konusunda güçlü bir engel görevi görür ve bu şekilde bebeğin ışıktan etkilenmesi engellenir. Anne karnındaki bebeklerde tıpkı bizler gibi suyun içinde gözlerini uzun süre açık tutup kapatabilirler.



Fetuse dışarıdaki ışığın sadece yüzde biri ulaşır. Ancak bu miktar bile fetusun renkleri algılaması ve belleğine kaydetmesi için yeterlidir. Özellikle kırmızı tonlar daha iyi algılanır. Bebeklerin kırmızı renge karşı olan zaafı bu şekilde açıklanabilir.



TEŞEKKÜRLER.....