



GEBELİKTE BESLENME

Prof. Dr. Nursan ÇINAR


Hayatımızın her döneminde önemli olan beslenme, gebelikte de çok önemlidir.



Beslenme şekli



MERAK KONUSU?



Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarından en çok etkilenen toplum grubu;

Beş yaş altı
çocuklar



Gebeler



Emzikli kadınlar



- Annenin saęlıęı ve beslenme durumu sadece annenin deęil doęuracaęı bebeęinde saęlıęı, byme ve geliřmesi ynnden nem tařıtmaktadır.
- Anne ve ocuk ikilisini birbirinden ayrı dřnmek mmkn deęildir.

- *Gebelik*, kadın için doğal fizyolojik bir olaydır.






- **Gebe kadının beslenmesinde amaç, annenin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin öğeleri yedeğini dengede tutmak, fetüsün normal büyümesini ve salgılanan sütün gerektirdiği enerji ve besin öğelerini tam olarak karşılamaktır.**

- Kimi zaman gebe kadınlara diyet programları verilmekte ve belli beslenme kurallarına zorlanmaktadırlar.
- Bazı gebeliğin **özel durumları haricinde** bu tür yaklaşımların hiç biri kabul edilebilir değildir.



- Gebe kadınları korkutarak sevmedikleri ve ya tolere edemedikleri gıda maddelerini tüketmeye zorlamak yersizdir.
- Bu tür diyetler ancak konunun uzmanı tarafından gebenin durumu göz önüne alınarak, doktorun önerileri doğrultusunda ve kişiye özel hazırlanmalıdır.



- Beslenmenin gebeliğin seyrinde ve sonucunda çok büyük etkileri vardır.



- Gelişmekte olan bebeğin gereksinimlerini karşılamak ve onun yaşama yeterli olarak hazırlanmasını sağlamanın dışında **rahat** ve **sorunsuz bir hamilelik** ve **lohusalık dönemi** geçirmek için de doğru beslenmek gerekir.



- Son yıllarda yapılan çalışmalarda gebelik öncesinde, gebelikte ve laktasyon sürecindeki beslenme durumunun hem annenin hem de bebeğin sağlığını önemli derecede etkilediği vurgulanmaktadır.



ANNENİN YETERLİ VE DENGELİ BESLENMESİYLE MÜMKÜN OLACAKTIR

Hamilelik süreci temel besin kaynakları olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gereksinimlerinin arttığı bir dönemdir.



Buna bağlı olarak KALORİ miktarında da bir artış söz konusudur

- Gebe olanla olmayan kadınlar **arasındaki kalori gereksinimi farkı sadece 300 kaloridir** ve her öğünde 1-2 kaşık fazla yenilerek karşılanabilecek bir farktır.





Önemli olan fazla miktarda yemek ve kilo almak değil gerekli olan maddeleri dengeli ve yeterli miktarda almaktır.

- Gebeliğin erken dönemlerinde **bulantı** ve **kusma sorunu** (hiperemesis gravidorum) yaşayan ve bu nedenle kilo kaybeden anne adaylarına sık rastlayabiliriz.



- Daha önceden ciddi bir beslenme bozukluğu ve gebeliğin erken dönemlerinde **kilo kaybı yoksa**, bu durum gelişmekte olan bebek tarafından kolaylıkla **tolere edilebilir**.



Ancak bulantı ve kusmalara bağı cıddı beslenme bozukluğu yaşıyan ve neredeyse hiç bir şey yiyip içmeyen anne adaylarının hastaneye yatırılarak damar yoluyla beslenmesi gerekli olabilir.



ÖĞÜN SAYISI

- Hamilelerde beslenme söz konusu olduğunda ilk planda önerilen günlük öğün sayısında değişikliğe gidilmesidir.
- Hamile olmayan kişilerde önerilen günlük 3 öğünün bu dönemde 5'e çıkarılması yararlıdır.

- Bu hem erken dönemdeki bulantı ve kusmalarla baş etmeye yardımcı olur hem de son dönemlerde yaşanan **yanma** ve **şişkinliği** azaltır.



ENERJİ ve KILO ARTIŞI

- Gebelikte kalori 3 nedenden dolayı gereklidir:

1

- Gebeliğe bağlı yeni dokuların yapımı

2


- Bu dokuların idame ettirilmesi

3

- Gebe vücudun hareketi için gerekli olan enerjinin sağlanması

Beden Kitle İndeksi (BKİ)

- Beslenme durumunu değerlendirmede ağırlığın boya oranı, sadece kilonun bilinmesinden daha değerlidir.
- Ağırlığın boyun metre karesinin oranı beden kitle indeksini verir.



- BKİ= kilo (kg)
boyun karesi (m²)

- **Örn:** Kadının ağırlığı 57kg,
boyu 163 cm ise

$$\text{BKİ} = 57 / (1.63)^2 = 21.4 \text{ 'dür.}$$




Gebelik Öncesi Gebelikte Önerilen Total Ağırlık Artışının Sınırları (BKİ'ne göre)

Kilonun boya oranı artışı(kg)	Önerilen ağırlık
Düşük (BKİ<19.8)	12.5 - 18
Normal (BKİ 19.8 - 26.0)	11.5 - 16
Yüksek (BKİ>26.0 - 29.0)	7.0 - 11.5
Şişman (BKİ>29.0)	≤7


- Gebe bir kadının gebe olmayan bir kadına göre günde yaklaşık fazladan 300 kaloriye ihtiyaç duyar.
- Bu da yaklaşık %15'lik bir artış yani 2300 kalori/gün'dür.

- Günlük kalori gereksinimindeki artış **sadece %15** iken bazı maddelerin gereksinimlerindeki artış iki katına çıkabilir.
- Bu durum fazla beslenmenin değil dengeli beslenmenin önemi açıkça ortaya koymaktadır.

- Gebelikteki kalori tüketimi ilk üç ayda en az düzeydeyken bu dönemden sonra hızlı bir artış gösterir.



- 2. üç ayda bu kaloriler başlıca plasenta ve embriyo gelişimini karşılarken son üç ayda ise temel olarak bebeğin büyümesine harcanır.



- Normal sağlıklı bir kadında tüm gebelik boyunca önerilen **kilo artışı 11-13 kg'dır.**
- Bu kilonun 6 kilosu anneye 5 kilosu ise bebeğe ve ona ait oluşumlara (plasenta, amnion sıvısı) aittir.

KARBONHİDRATLAR

- Vücudun kalori gereksinimi üç temel enerji kaynağı olan **proteinler**, **yağlar** ve **karbonhidratlardan** sağlanır.
- Eğer karbonhidratlar yetersiz alınırsa vücut enerji sağlamak için proteinleri ve yağları yakmaya başlar.

Böyle bir durumda iki sonuç ortaya çıkabilir:

1. Bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini sağlayacak yeterli protein olmaz

2. Ketonlar ortaya çıkar. Ketonlar yağ metabolizmasının ürünü olan asitlerdir ve bebeğin asit baz dengesini bazen de beyin gelişimini **olumsuz yönde** etkileyebilirler. Bu nedenle gebelikte karbonhidrattan **fakir diyet önerilmez**

- Pirinç, un, bulgur gibi kompleks karbonhidrat kaynakları anne için enerji kaynağı olmasının yanı sıra B grup vitaminleri ve çinko, selenyum, krom, magnezyum gibi elementleri bol miktarda ihtiva eder.



PROTEİNLER

- Proteinler hücrelerin temel yapı taşlarıdır ve amino asit denen yapılardan oluşmuşlardır.
- Amino asitlerin bir kısmı vücutta diğer maddelerden üretilebilirken **esansiyel amino asit** adı verilen 8 tanesi vücutta üretilemez ve mutlaka besinler yoluyla dışarıdan alınmaları gerekir.

- Hayvansal proteinler 6-8 amino asittin türünü de içerdiğinden komplet proteinler olarak adlandırılırlar ve beslenmede son derece önemlidirler.
- Proteinler saç telinden tırnağa kadar vücutta bulunan tüm hücrelerin yapı taşı oldukları gibi beyin ve sinir sisteminin gelişimi için de **yaşamsal öneme** sahiptirler.

- Bu nedenle hamile kadınların günde 60-80 gr protein almaları önemlidir.

- Protein ana kaynağı hayvansal gıdalardır.
- Et, kümes hayvanları ve balık komplet proteinler içerirler.
- Bunun yanı sıra süt ve süt ürünleri de hayvansal protein gereksiniminin karşılanması açısından yeterli olabilir.



SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ

- Gebe bir kadın güçlü kemikler ve dişler için bebeğe gerekli olan kalsiyum ve diğer elementleri sağlamak amacıyla günde en az **1-2 bardak süt içmelidir.**
- D vitamini takviyeli sütler varsa bu çok daha iyi olur.



- Gaz ve hazımsızlık nedeniyle s t i ilemeyen durumlarda bunun yerine **peynir** ya da **yo urt** yenilebilir.
- Kalsiyum alımının yetersiz olması durumunda dı arıdan verilecek **ila lar** ile destek sa lanabilir.



- **Kemik ve diř gelişiminin ayrıca kas dokularının kasılma fonksiyonlarının sağlanmasında ve pıhtılaşma mekanizmasında **kalsiyum** minerali önemli rol oynamaktadır.**



- Bebeğin iskelet sistemi ve gelişimi için yeterli miktarda kalsiyum alınması gerekmektedir.
- En fazla kalsiyum içeren besinler; süt, peynir, yoğurt, kuru incir, kuru fasulye, karnı bahar, lahana, ıspanak, yumurta

- Et, balık, kümes hayvanları, yumurta, kuru baklagiller bu gıdalar vitamin ve mineralin yanında protein de sağlarlar. Gebe kadında ve bebeğinde doku gelişimi ve yeni doku oluşumu için protein şarttır.
- Bu tür gıdalardan günde üç öğün alınmalıdır.
- Baklagiller öğünün protein değerini arttırmak için peynir, süt ya da etle birlikte alınabilirler.

VİTAMİNLER

- Hamile kadında pek çok vitamin ve minerali içeren ilaçları vermek rutin ancak gerekliliği hala tartışılan bir uygulamadır.
- Dengeli ve doğru beslenen hamile bir kadında dışarıdan vitamin desteği şart değildir.

- En iyisi vitamin ve mineralleri doğal gıdalarla almaktır.
- Ancak demir ve folik asit bu durumun istisnasıdır.



Folik Asit

- Folik asit bebeğin beyin ve sinir gelişimi için kilit öneme sahip olduğundan **gebelikten önce** alınmaya başlanması gerekir.




vno0115 www.fotosearch.com

- Embriyo gebeliğin 2 ve 12. haftaları arasında yeterli folik asit almazsa özellikle **beyin** ve **omurilik** ile ilgili anormallikler olmak üzere, doğumsal gelişim bozuklukları görülme riski artabiliyor.



- Folik asit, hücre bölünmesinde ve hücrenin genetik yapısının oluşmasında önemlidir.



Folik asit yeterli alınmadığında, kan yapıcı organların etkilenmesine bağlı olan annede kansızlık gibi belirtiler olabilir.

Folik asit gebelik öncesi 400 mcg alınması gerekirken, gebelik süresince 600 mcg alınması gerekmektedir.



Folik asitlerin doğal olarak bulunduğu kaynaklar;

- Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar, kuru baklagiller, karaciğer, yerfıstığı, fındık, karnabahar, kepekli ekmekte mevcuttur.



A Vitamini


- Anne bebeğin tüm vücut dokularının, hücrelerin sağlığına ve büyümesine katkıda bulunmaktadır.



B Vitaminleri

- Günlük fazladan 300 kalori tüketimi ile pek çok B vitaminin fazladan gereken miktarı alınmış olur.
- Gebelikte B12 vitamini olan gereksinim artmaktadır. B12 vitamini folik asitin aktive edilmesinde de rol oynar.

- Süt, yumurta, peynir, et gibi hayvansal kaynaklı gıdaların tüketilmesine özen gösterilerek bu vitaminin yeterli alımı sağlanabilir.



C Vitamini

- Yaklaşık 1 kupa taze sıkılmış portakal suyu günlük gereksinimi yeterli düzeyde karşılamaktadır.
- Yeterli alınan C vitamini gebelik süresince gereksinimin yaklaşık iki katına çıkan demirin emilimine yardımcı olduğu için önemlidir.



D Vitamini

- Yeterli düzeyde D vitamini alımına gebelik süresince ihtiyaç vardır.
- Gebelikte çok önemli olan **kalsiyum mineralinin emilimine** de yardımcı olduğu için önemlidir.
- **Deri güneş ışığı ile temas ettiğinde vücut yeterince D vitamini sentezler.**


GEBELİK ve MİNERALLER

DEMİR

- Gebelik boyunca demir alınımı takip edilmesi gereken **önemli** bir unsurdur.
- Gebelikteki artmış demir gereksinimi doğal yollardan karşılanamaz.
- Bu nedenle özellikle **gebeliğin ikinci yarısından** sonra dışarıdan verilen demir ilaçları ile destek yapılır.

Türk toplumunda demir eksikliği anemisi çok sık görüldüğünden, gebeliğin en başından itibaren demir desteğine başlanabilir.

- Gebelikte demir kullanımının bir başka önemi de kansızlık olmasa dahil hem anne adayının hem bebeğin demir depolarını yeterli şekilde doldurmak için gerekli olmasıdır.



- **Demir eksikliği ile doğan bebekte emmeme, büyümede yavaşlama ve halsizlik meydana gelmektedir.**



- Besinlerle demir ihtiyacını karşılamaya kalkmak aşırı kalori alışına sebep olacağından bu dönem boyunca demir tedavisi önerilmektedir.
- Demirden zengin gıdalar; kırmızı et, yumurta sarısı, kuru meyveler, mercimek, dere otu, ıspanak, maydonoz, badem, fındık, cevizdir.


Magnezyum

- Kas ve sinir sağlığında önemi vardır.
- Hücre metabolizmasında, enerji kullanımında, protein metabolizmasında önemli rolleri vardır.
- Dengeli beslenen bir gebeye magnezyum takviyesine gerek yoktur.

- Ancak gebeliğe baēlı **kas krampları** gerekleřtiēi durumlarda, dūřuk dozda magnezyum takviyesi uygulanabilmektedir.
- **Magnezyumdan zengin gıdalar; fındık, yeřil sebzeler, tahıllar ve kuru fasulyedir.**



- Preeklempsi durumu gebelikte çok önemlidir.



- Gebelikte bu durumdan korunmak için diyetteki **ekstra tuzu azaltmak** gerekir.
- Bu nedenle preeklampsi korunmasında önerilen, yemek pişirme sırasında normal miktarda tuz konması ve sofrada yemeğe **tuz ilavesinin yapılmamasıdır.**
- Sıvı elektrolit dengesinin etkilenmemesi için gebenin alması gereken **günlük sodyum miktarı 2 g'dır.**

Sodyum

- Safra tuzunda bulunan temel bir mineraldir.
- Aşırı tuz tüketimi birçok kişide hipertansiyona yol açabilmektedir.
- Gebelik döneminde oluşan **sodyum eksikliği** diüretik ilaçlar alımı olmadığı sürece nadiren meydana gelir.



Beslenmeyi Etkileyen Faktörler

Yeme alışkanlığı

Kültür

Ekonomik durum



Pika

- Bazı maddelere karşı aşırı yeme isteđi duymaktır.
- Genellikle ilk trimesterde ortaya çıkar.



Gebelikte GIS Rahatsızlıkları

- Gebelik süresince GIS'de değişiklikler görülebilir.
- Diyetteki küçük değişikliklerle bunun önüne geçilebilir.

➤ Gebelik diyabeti

➤ Üriner sistem enfeksiyonları

➤ Gebelik sırasında yetersiz kilo alma

➤ Yara enfeksiyonu



• Tromboembolizm

➤ Gebelik hipertansiyonu

➤ Doğum eyleminin uzaması

➤ Doğum travması

➤ Fetal izlem güçlüğü

Zayıflık

- Zayıflığın gebelikte oluşturacağı riskler
 - Düşük doğum ağırlıklı bebek
 - Prematüre eylem
 - Düşük apgar skoru
 - Demir eksikliği anemisi





EMZİREN ANNENİN BESLENMESİ

- Emziren annelerin günlük kalori ihtiyacı 2800 kcal'dir.
- Emzirme döneminde günlük kalori ihtiyacına **750 kalori eklenmesi** gereklidir.



- Günlük diyetine **15 gr protein** eklenmesi gerekir (kuru fasulye, nohut, mercimek, et, tavuk, balık)
- Günlük sıvı ihtiyacı **3000 ml'dir.**
- Günlük **15 mg Demir**, **1000-1200mg Kalsiyum** gereklidir.

TEŞEKKÜRLER

