


ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARI VE BAKIMI

Prof. Dr. Nursan ÇINAR

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VE BAKIMI



Kulak Enfeksiyonları

- ABD'de 3 yaşına kadar olan çocukların %85'inde bildirilmektedir.
- İnsidans kış mevsiminde ve erkek çocuklarda yüksektir.
- Genelde 6 yaşın üstündeki çocuklarda görülme sıklığı düşer.



Hastalığın önlenmesi :

- Yenidoğan bebeklerde anne sütünden geçen maddelerin sağladığı bağışıklık, akut otitis media gelişmesini önler.



- Anne st emen ocukların beslenme sırasındaki pozisyonu, biberonla beslenen ocuklarınkine oranla staki tpnn **normal fonksiyon yapması** iin daha uygundur; bu nedenle anne st emen ocuklarda orta kulak iltihabı, biberonla beslenen ocuklara oranla daha az grlmektedir.



- Eğer çocuğun biberonla beslenmesi gerekiyorsa, oturur pozisyonda beslemek yatırılarak beslemekten daha iyidir.



Evde uygulanabilecek tedavi :

- Orta kulak iltihabı önce mutlaka **doktor tarafından** değerlendirilmelidir.
- Evde uygulanabilecek yöntemler, çocuğun rahatlatılmasına yöneliktir.
- **Ağrı kesici ve ateş düşürücüler** ile çocuğun rahat uyku uyuması sağlanabilir.
- Kulak akıntısı olan çocuklar **yüzmemeli**, banyoda ise kulağa su teması tıkaçlarla önlenmelidir.

AOM ve Bakımı

- Çocuk yatarak değil , oturarak beslenir.
- Ağrılı dönemde yumuşak ve sıvı yiyecekler verilir.
- Ağrı için reçete edilen analjezikler (ağrı kesici) , ateş için antipiretikler (ateş düşürücü) verilir.



- Ateř takibi yapılır.
- Ağrılı dönemde; lokal **kuru sıcak veya soğuk** uygulama yapılır.
- Çocuğun başı ağrıyan **kulak üstüne çevrilerek** yatırılır.



- Burunda tıkanıklık varsa açılır.
- AOM 'nin kronikleşmesini önlemek için aileye, tedavinin eksiksiz uygulanması gerektiği anlatılır.
- Banyoda kulağa **su kaçması** önlenir.
- Timpanopilasti ameliyatı olan çocukların su içi aktiviteleri (dalma) kısıtlanması gerektiği aileye anlatılır.
- Seroz otite neden olan allerjik nedenler **ortadan kaldırılır.**

ÇOCUKLARDA SOĞUK ALGINLIĞI

- Soğuk algınlığından burun, boğaz, kulaklar, östaki tüpü, nefes borusu, ses telleri ve akciğerler etkilenir.



- Soğuk algınlığı en çok okul çağı çocuklarında görülür ve sıklığı yaşla azalır.



Soğuk algınlığından korunma:

- ★ Bebekleri ve çocukları **kapalı** ve **kalabalık yerlerden** uzak tutmak
- ★ Daha çok açık havada ve havalandırması iyi olan yerlerde vakit geçirmek



★ Genellikle el teması ile geçtiğinden, sık sık hem kendi ellerinizi hem de onun **ellerini yıkamak** ve **silmek**




- ★ Yatak odalarını havalandırmak
- ★ Yastık kılıflarını ve arşafaları daha sık deęiřtirmek
- ★ Evdeki ebeveynlere ve ocuklara zel havlu kullanmak
- ★ Yeterli sıvı almak
- ★ C vitamini aęırlıklı beslenme řekli uygulamak



- Öksürme ve hapşıрма esnasında ağzınızı kapamak
- Yiyecek içecek kaplarını ortak kullanmamak
- Kumaş mendil yerine, kullandıktan sonra atılan kağıt mendilleri kullanmak



- Hava şartlarına uygun, pamuk ağırlıklı giysiler giydirmek
- Ortamın havasındaki **nem oranını** artırmak
- Uzun mesafeli uçak yolculuklarından kaçınmak
- **Sigara içilen** ortamlardan uzak durmak



- Soğuk algınlığına yakalanan çocuklar, özellikle burun temizliğinden sonra olmak üzere **sık sık ellerini yıkamalı**, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunlarını kapamalıdırlar.



- Soğuk algınlığı virüsleri ellerde saatlerce canlı kalır.

Hastalığın Süresi

- Soğuk algınlığı genellikle 7 ile 14 gün arasında iyileşir. Bazen sinüzit, orta kulak iltihabı, larenjit veya bronşit gibi komplikasyonlar nedeniyle hastalığın seyri uzayabilir.



Tıbbi Tedavi

- Soğuk algınlığının tedavisi semptomatiktir.



Evde Uygulanabilecek Tedavi

- Soğuk algınlığının düzelmesi zamana bağlıdır.
- Bu süre içinde, hastanın istirahat etmesi ve **bol sıvı gıda alması** (su, meyve suları gibi) gerekir.
- Genellikle **ağrı kesici, dekonjestan** ve allerji karşıtı maddeler içeren **soğuk algınlığı ilaçları**, hastalığı iyileştirmezler; sadece kas ağrısı, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gibi belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olabilirler.

ÇOCUKLARDA ATEŞ

- Ateş vücudun savunma araçlarından biridir.
- Aslında hastalık diye algılansa da bir **hastalık belirtisidir.**
- Altta yatan hastalık süresince devam edebilir.
- Çocuklarda 37,8C- 40C arasında ateş olarak tanımlanmaktadır



"ATEŞ FOBİ" MİZ VAR MI?

- Anne babaların ateş konusunda endişe taşırlar.

ANNE BABALARI ATEŞ KONUSUNDA ENDİŞELENDİREN BAŞLICA SEBEPLER:

- Daha önce ateşin ne olduğu ve tedavisiyle ilgili bilgilendirilmemiş olması
- Ateşin 39C üstünde oluşu
- Annenin eğitim düzeyinin düşük olması
- Tek çocuk olması
- Çocuğun havale geçireceği korkusu

ATEŞİ NASIL DÜŞÜRELİM?

- İlk aşamada sıvı verilmeli,
- ince giysiler
- aktivitenin azaltılması
- Çocuk huzursuz değilse, ateş 39 Cnin üstünde değilse yoğun antipiretik tedavi önerilmiyor

ILIK UYGULAMA

- Ilık uygulama yapılacaksa 30-60 dak. öncesi antipiretik verilmiş olması uygundur,
- Ilık uyg. antipiretik verilmeden yapılırsa çocuk rahatsız olur, titreme başlar, çünkü hipotalamus vücut sıcaklığının düşmesini dengelemeye çalışır ve ılık uygulama bitince vücut sıcaklığı hemen eskisine döner

ILIK UYGULAMA TEK BAŞINA ETKİLİ Mİ?

Ateşin 37 derecenin altında kalma süresi:

- Tek başına parasetamol ile 129 dak.
- Antipiretik+ ılık uygulama ile 164 dak.
- Tek başına ılık uygulama ile 54 dak.

- Antipiretik(ateş düşürücü ilaç)+ ılık uyg., genellikle ateşin 40 dereceyi geçtiği durumlarda, antipiretiğe yanıt alınmazsa, çocuk çok huzursuzsa öneriliyor.

- Su sıcaklığı 29.4-32.2, (dirseğin dayanacağı kadar/ halka arasındaki tabir ile) yani ılık olmalı.
- Ilık uygulamaya başlayınca titreme başlamışsa su ısı artırılabilir

PİŞİK



- Diaper dermatit (pişik) en yalın anlatımıyla bebeklerde bez bağlanan bölgelerde görülen döküntülerdir.



- Hafif olgularda o bölgede **deride kızarıklık** daha ağır olgularda ise **büller** ve **açık yaralar** vardır.
- Genellikle karın alt bölgesi, inguinal (kasık) bölge, genital ve gluteal (kalça) bölgede görülür.
- Özellikle derinin birbirine sürtünen yerlerinde görülür.

Etiyoloji

- Aşırı nem
- Sürtünme
- Gaita yada idrarın uzun süre deri üzerinde kalması
- Bakteriyel enfeksiyonlar
- Mantar enfeksiyonları
- Bebeğin antibiyotik kullanımı
- Beze karşı allerjik reaksiyon



Diaper rash

ADAM

Şu durumlarda ise daha sık görülür:

- Bebek büyüdükçe (En sık 8 ve 10. aylarda görülür)
- Bebeğin altı kuru ve temiz **tutulmazsa**.
- Sık gaita (dışkı) çıkışı olan bebeklerde.
- Bebek antibiyotik kullanıyorsa yada anne sütü ile beslenen bebeklerde anne antibiyotik kullanıyorsa.
- Katı gıdalara başlandığında.



- Deri uzun süre **ıslak kaldığında** bütünlüğü zarar görür ve **bezin sürtünmesi** ile de pişik görülür.
- Kıvrım bölgelerinin **sürtünmesi** ile de daha da kötüleşir.
- **Antibiyotik kullanan** bebeklerde mantar kolonizasyonu gelişir.
- Mantarlar (*Candida albicans*) lokal direnci azalan deriyi kolayca enfekte ederler.



- Mantar ile enfekte olmuş olgular **deride parlak kırmızı lezyon** ve onun çevresinde çok sayıda uydu lezyon şeklindedir.



- Pratik olarak iki günü geçen diaper dermatitde (pişik) olaya mantarda eklenmiş olarak kabul edilmeli ve **ona göre tedavi edilmelidir.**





Bakım

- Bebeğin altı daha sık deęiřtirilmelidir.
- Alt deęiřtirilirken sadece ılık su kullanılmalıdır ve bu hafif bir basınçla uygulanmalıdır.



- Deriyi tahriş etmemek için mendil kullanılmamalıdır. Kurularken de mendil yada herhangi birşey **kullanılmamalıdır.**
- Kuruduktan sonra kalın bir şekilde deriyi koruyucu(mesala çinko oksit içeren) kremler kalın bir tabaka halinde sürülmelidir.



- Bebeğin altı havalandırılmalıdır.



- Hekimin önereceđi kremler uygulanabilir.



Önlem

- Bezler olabildiğince çabuk değiştirilmelidir
- Bez çok sıkı sarılmamalıdır. Hava almasını engellememelidir.



- Altı çok yumuřak bir bezle silinmelidir. Her gaita ıkıřından sonra sabunlu suyla yıkamaya gerek yoktur.
- Aspire edebileceklerinden talk pudrası kullanılmamalıdır.



- **Emme kapasitesi iyi olan** bezler tercih edilmeli. Alınamıyorsa kumaş bezler sık aralıklarla deęiřtirilmelidir.





PAMUKÇUK



- Pamukçuk ağız mantar enfeksiyonu

- Pamukçuk, ağızda meydana gelen hafif bir mantar enfeksiyonudur; yanakların iç tarafına, dilin üzerine ve ağzın tavanına sürülmüş beyazımsı lekeler benzer.
- Eğer beyaz leke kazınırsa, altında deri yanmış gibi görünür ve kanayabilir.
- Pamukçuk, sağlıklı yeni doğmuş bebeklerde meydana gelir.

- **Belirtiler**

Bebegin ağızında, ağzının içinde ve çevresinde süte benzer ince bir tabaka.

Pamukçuk olan bebeğin ağızı yaradır.

Bebek emzirilirken rahatsızdır ve hatta emzirilmeyi reddedebilir



Bakım

- Bebeğe pamukçuk olduğu zaman **yumuşak yiyecekler** verilmelidir.
- Biberondan besleniyorsa, biberon emziğinin **yumuşak** ve **temiz** olmasına dikkat edilmeli ve her öğünden sonra temizlenmelidir.

- **Eğer anne emziriyorsa,** meme uçlarınızın mikrop kapmaması için özen göstermeli, emzirdikten sonra suyla yıkamalıdır.
- Eğer doktor koruyucu bir merhem vermişse emzirmeden sonra sürülmeli ve sonraki emzirmeden önce yıkanmalıdır.

BEBEKLERDE GAZ SANCISI

- **Gaz sancısı olarak bilinen infantil kolik 3 ayın altındaki bebeklerin % 10-30'unda görülür.**



- Bebeklerde görülen gaz sancısına **kolik** adı verilir.
- Yeni doğan bebeklerde gaz sancısı **2 - 3 haftalıkken** başlar ve genellikle bebek **3 aylık** olduğunda büyük ölçüde geçer.
- Bununla birlikte, az sayıda bebekte **8 - 9 aylık** olana kadar kolik devam edebilir.



Gaz Sancısı Olduđu Nasıl Anlařılır?

- Bebek **aç** ve **uykusuz olmamasına** rağmen ayaklarını karnına çekip, ellerini sıkarak ve acı bir şekilde ağlıyorsa muhtemelen gaz sancısı çekiyor demektir.

- Aslında her bebek ağlar. Ağlamanın gaz sancısından kaynaklandığını anlamak için **Bebeklerde Gaz Sancısının Belirtileri** şöyle sayılabilir:

- Bebeğin sürekli ve 3 saatten fazla ağlaması
- Huzursuz oluşu
- Ağlarken bacaklarını karnına doğru çekerek ağlaması

Bebeklerde Gaz Sancısının Nedenleri?

- Nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte kolik oluşumuna etki eden faktörler;
- Bebeğin sindirim sisteminin tam olgunlaşmamış olması,
- Mama ya da anne sütündeki bazı maddelere alerji olarak sayılabilir.
- Bebeğe 6. aya kadar ek besin verilmemeli ve sadece anne sütü ile beslenmelidir.

- Buna rağmen, gaz sancısı çeken bebeğe, mama yediriliyorsa mamanın içeriğindeki bazı maddeler bebekte gaz oluşumuna neden oluyor olabilir. Sadece anne sütü vermek, bu mümkün değilse mamayı değiştirmek faydalı olabilir. Emziren anneler yedikleri bazı besinlerin bebekte gaz yaptığını fark edebilirler. Bu durumda, bu besinlere ara vermeleri bebeğin şikâyetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir?

- Gaz sancısını azaltmanın bazı yöntemleri vardır.
- Öncelikle bebek emzirilirken meme ucunu iyice kavramasına ve hava yutmamasına dikkat etmek gerekir.
- Ek besinlere erken başlamak, gereğinden fazla meyve suyu vs. vermek gaz sancılarını arttırır.
- Bebeği kundaklamak ve hareketlerini kısıtlamak da gaz çıkışını engelleyebilir.

Bebeklerde Gaz ıkarma Nasıl Yapılır?

- Bebeğın gaz sancısı çekmemesi için her beslenmeden sonra gazı ıkarmak önemlidir.
- Bunun için bebek omuza doğru yatırılıp, sırtı hafifçe ovalanır.
- Karnına hafif masajlar yapmak, ayakları üzerine bastırmak da gaz ıkarmasına yardımcı olur.



