

# La conjetura de Poincaré en dimensiones altas

Notas

[github.com/danimalabares/cohom](https://github.com/danimalabares/cohom)

August 24, 2023

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Índice</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>1 Álgebra homológica</b>                       | <b>3</b>  |
| 1.1 Repaso . . . . .                              | 3         |
| 1.2 Más álgebra homológica . . . . .              | 6         |
| 1.3 Funtores derivados . . . . .                  | 7         |
| 1.4 Grupos de cohomología . . . . .               | 13        |
| 1.5 Teorema de coeficientes universales . . . . . | 14        |
| <b>2 Cohomología</b>                              | <b>19</b> |

# 1. Álgebra homológica

## 1.1 Repaso

Sea  $R$  un anillo asociativo con 1. Podemos ahora tomar la categoría de  $R$ -módulos,  $R\text{-mod}$ , cuyos objetos son  $R$ -módulos y los morfismos son homomorfismos  $R$ -lineales. También podemos construir  $R\text{-ch-comp}$ , cuyos objetos son complejos de cadenas,

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} \cdots$$

tales que  $\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0$ , es decir,  $\text{img } \partial_n \subseteq \ker \partial_{n-1}$ . y sus morfismos son morfismos complejos de cadenas,  $C_\bullet \xrightarrow{f} D_\bullet$ , que son muchos morfismos tales que el siguiente diagrama conmuta en todos los cuadraditos:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & C_n & \xrightarrow{\partial_n} & C_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{n+1} & & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n-1} \\ \cdots & \longrightarrow & D_{n+1} & \xrightarrow{\delta_n} & D_n & \xrightarrow{\delta_n} & D_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Y definimos

$$H_n(C_\bullet) = \frac{\ker \partial_n}{\text{img } \partial_{n+1}}$$

**Definición.**

- Decimos que  $C_\bullet$  es **acíclico** si  $H_n(C_\bullet) = 0$  para toda  $n$ .
- La sucesión  $C_1 \xrightarrow{\varphi} C_2 \xrightarrow{\psi} C_3$  es **exacta** si  $\text{img } \varphi = \ker \psi$ .
- La sucesión  $0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3 \rightarrow 0$  es una **sucesión exacta corta**.
- Y si se extiende infinitamente, es una **sucesión exacta larga**.

**Proposición.** En una sucesión exacta corta,  $\varphi$  es inyectiva,  $\psi$  es suprayectiva y  $C_3 \approx C_2 / \ker \psi$ . Abusando de notación, podemos pensar que  $C_3 \approx C_2 / C_1$ , pero hay que tener cuidado aquí porque el encaje de  $C_1$  en  $C_2$  puede no ser único.

Tomemos  $n$  fijo. Entonces

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Ab} \\ & \nearrow & \uparrow \\ \text{R-ch-comp} & \xrightarrow{H_n} & \text{R-mod} \\ C_\bullet & \longmapsto & H_n(C_\bullet) \end{array}$$

Y como los morfismos de cadenas mandan ciclos en ciclos y fronteras en fronteras, podemos definir los morfismos inducidos, que satisfacen que  $(fg)_* = f_*g_*$  y  $id_{C_\bullet} = id_{H_n(C_\bullet)}$ . Como la composición de morfismos se abre en el mismo orden en el que estaba, se llama **functor covariante**.

**Definición.** Dos homomorfismos

$$f, g : (C_\bullet, \partial) \rightarrow (C'_\bullet, \partial')$$

son **homotópicos** si existen homomorfismos  $h_n : C_n \rightarrow C'_{n+1}$  para toda  $p \in \mathbb{Z}$  tales que

$$f_n - g_n = \partial'_{n+1} h_n + h_{n-1} \partial_n$$

Estas flechas se pueden visualizar aquí:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & C_n & \xrightarrow{\partial_n} & C_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{n+1}-g_{n+1} & \swarrow h_p & \downarrow f_n-g_n & \swarrow h_{n-1} & \downarrow f_{n-1}-g_{n-1} \\ \cdots & \longrightarrow & C'_{n+1} & \xrightarrow{\partial'_{n+1}} & C'_n & \xrightarrow{\partial'_n} & C'_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Así que la suma de las flechas azules es igual a la flecha roja. (No estamos diciendo que el diagrama sea conmutativo).

Esto es tanto como decir que  $H_n(f) = H_n(g)$  para toda  $n$ . Es decir, funciones homotópicas inducen los mismos homomorfismos entre complejos de cadenas.

**Teorema** (fundamental del álgebra homológica). Si

$$0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{\phi} B_\bullet \xrightarrow{\psi} C_\bullet \rightarrow 0$$

es una sucesión exacta corta de complejos de cadena, entonces existen homomorfismos

$$\delta_{*p} : H_p(C_\bullet) \rightarrow H_{p-1}(A_\bullet)$$

tales que la sucesión

$$\cdots \rightarrow H_p(A_\bullet) \xrightarrow{\bar{\phi}_p} H_p(B_\bullet) \xrightarrow{\bar{\psi}_p} H_p(C_\bullet) \xrightarrow{\delta_{*p}} H_{p-1}(A_\bullet) \xrightarrow{\bar{\phi}_{p-1}} H_{p-1}(B_\bullet) \rightarrow \cdots$$

es exacta.

En el siguiente diagrama conmutativo se ve claramente qué está pasando:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & A_{p+1} & \xrightarrow{\partial_{p+1}} & A_p & \xrightarrow{\partial_p} & A_{p-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow i_{p+1} & & \downarrow i_p & & \downarrow i_{p-1} \\
 \cdots & \longrightarrow & B_{p+1} & \xrightarrow{\partial_{p+1}} & B_p & \xrightarrow{\partial_p} & B_{p-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow j_{p+1} & & \downarrow j_p & & \downarrow j_{p-1} \\
 \cdots & \longrightarrow & C_{p+1} & \xrightarrow{\partial_{p+1}} & C_p & \xrightarrow{\partial_p} & C_{p-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

*Demostración.* Explicamos un poco cómo definir el homomorfismo de conexión haciendo cacería de diagrama. Comenzamos con un ciclo  $c \in C_p(A)$ . Como  $j_p$  es suprayectiva, existe un  $a \in B_p$  tal que  $j_p(a) = c$ . Luego,  $\partial_p(a) \in \ker j_{p-1}$ , ya que, como el diagrama conmuta,  $\partial_p j_p = j_{p-1} \partial_p$  y  $c$  es un ciclo. Como la sucesión es exacta,  $\ker j_{p-1} = \text{img } i_{p-1}$ , así que existe  $a \in A_{p-1}$  tal que  $i_{p-1}(a) = \partial_p(b)$ . Este  $a$  es un ciclo, ya que el diagrama conmuta,  $i_{p-2}(a) = \partial(\partial(b)) = 0$ , y la  $i_{p-2}$  es inyectiva por exactitud, es decir, el único elemento al que va a dar el cero es el cero. Así que definimos  $\delta_{*p}[c] = [a]$ .

Y una vez definido este homomorfismo, el resto de la prueba sale sin trucos.  $\square$

**Teorema** (Naturalidad del homomorfismo de conexión). Para dos sucesiones exactas cortas y morfismos  $f, g$  y  $h$ ,

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A_\bullet & \xrightarrow{i} & B_\bullet & \xrightarrow{j} & C_\bullet \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\
 0 & \longrightarrow & A'_\bullet & \longrightarrow & B'_\bullet & \longrightarrow & C'_\bullet \longrightarrow 0
 \end{array}$$

donde las filas son exactas.

Entonces, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & H_p(A) & \longrightarrow & H_p(B) & \longrightarrow & H_p(C) & \xrightarrow{\delta_*} & H_{p-1}(A) & \longrightarrow & H_{p-1}(B) & \longrightarrow & H_{p-1}(C) & \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow \bar{f} & & \downarrow \bar{g} & & \downarrow \bar{h} & & \downarrow \bar{f} & & \downarrow \bar{g} & & \downarrow \bar{h} & \\
 \cdots & \longrightarrow & H_p(A') & \longrightarrow & H_p(B') & \longrightarrow & H_p(C') & \longrightarrow & H_{p-1}(A') & \longrightarrow & H_{p-1}(B') & \longrightarrow & H_{p-1}(C') & \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

*Demostración.* Salvo en los cuadrados donde está  $\bar{h}$  a la izquierda y  $\bar{f}$  a la derecha, la conmutatividad se sigue por funtorialidad.  $\square$

**Lema** (de los cinco). Consideremos el diagrama conmutativo con filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc}
 M_5 & \xrightarrow{f_5} & M_4 & \xrightarrow{f_4} & M_3 & \xrightarrow{f_3} & M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_1 \\
 \downarrow h_5 & & \downarrow h_4 & & \downarrow h_3 & & \downarrow h_2 & & \downarrow h_1 \\
 N_5 & \xrightarrow{g_5} & N_4 & \xrightarrow{g_4} & N_3 & \xrightarrow{g_3} & N_2 & \xrightarrow{g_2} & N_1
 \end{array}$$

Si  $h_5, h_4, h_2$  y  $h_1$  son isomorfismos, entonces  $h_3$  también.

## 1.2 Más álgebra homológica

Tomemos  $N, M$   $R$ -módulos, y el conjunto de homomorfismos  $R$ -lineales de  $M$  en  $N$ , que es un grupo abeliano (cuya identidad es el morfismo que manda todo a 0, y  $f + g(m) = f(m) + g(m)$  que también es un morfismo,  $(-f)(m) = -f(m)$ ). También tiene estructura de  $R$ -módulo con la operación  $(rf)(m) = rf(m) = f(rm)$ .

Ahora construyamos un funtor:

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}(-, N) : R\text{-mod} &\rightarrow \text{Ab} \\
 M &\mapsto \text{Hom}(M, N) \\
 M \xrightarrow{\varphi} M' &\mapsto ?
 \end{aligned}$$

La flecha inducida será

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}(M, N) &\xleftarrow{\varphi^*} \text{Hom}(M', N) \\
 \varphi^*(f) &= f\varphi \leftarrow f
 \end{aligned}$$

De acuerdo a

$$\begin{array}{ccc}
 M & & \\
 \downarrow \varphi & \searrow f\varphi & \\
 M' & \xrightarrow{f} & N
 \end{array}$$

Así que  $\text{Hom}(-, N)$  es un funtor **contravariante**. De hecho, es un **funtor aditivo exacto izquierdo**:

- **Aditivo**. Manda sumas directas en sumas directas, es decir,

$$\text{Hom}(M_1 \oplus M_2, N) \approx \text{Hom}(M_1, N) \oplus \text{Hom}(M_2, N)$$

Que tiene que ver con la propiedad universal de la suma directa:

$$\begin{array}{ccccc}
 M_1 & \hookrightarrow & M_1 \oplus M_2 & \hookleftarrow & M_2 \\
 & \searrow f & \downarrow \exists! f \oplus g & \swarrow g & \\
 & & N & & 
 \end{array}$$

Donde  $(f \oplus g)(m_1, m_2) = f(m_1) + g(m_2)$ . Así que si tenemos  $(f, g)$  en el módulo de la derecha, lo mandamos a  $f \oplus g$ .

- **Exacto** Supongamos que tenemos la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

a la que le aplicamos el funtor para obtener la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(C, N) \xrightarrow{\psi^*} \text{Hom}(B, N) \xrightarrow{\varphi^*} \text{Hom}(A, N)$$

En general,  $\varphi^*$  no es suprayectiva.

#### Ejercicio.

- Checar lo anterior.

*Solución.* Basta ver que la flecha  $0 \rightarrow A$  no necesariamente va a dar a una flecha de la forma  $\text{Hom}(A, N) \rightarrow 0$ .  $\square$

- ¿Qué pasa con el cokernel?

**Observación.** También podemos definir el funtor análogo dejando libre la entrada de la derecha, y obtenemos un funtor covariante (que no usaremos tanto y también es aditivo exacto izquierdo).

**Observación.** Denotaremos  $\text{Hom}_R(M, N) := M^*$ , y, por si acaso  $\text{Hom}(N, M) := M_*$ .

### 1.3 Funtores derivados

Es un juego, y usaremos  $R$ -módulos libres, que tienen la ventaja de tener una base. Un  **$R$ -módulo libre** es uno de la forma  $\bigoplus_{i \in I} R_i$  donde  $R_i = R$ . Los elementos canónicos son  $e_j := (\delta_{ij})_{i \in I}$ , y  $\beta := \{e_j\}_{j \in J}$  es una **base** en cuanto a que cumple la siguiente propiedad universal: para cualquier  $R$ -módulo  $M$  y para toda función  $f : \beta \rightarrow M$  existe un único  $\bar{f} : L = \bigoplus_{i \in I} R_i \rightarrow M$  tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \beta & \xrightarrow{f} & M \\ \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ L & & \end{array}$$

Luego, diremos que  $P$  es **proyectivo** si existe  $Q$  tal que  $P \oplus Q$  es libre.

**Ejemplo.**  $\mathbb{Z}/6 \approx \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3$

**Proposición.** Todo  $R$ -módulo es cociente de un  $R$ -módulo libre.

*Demostración.*

$$\begin{array}{ccc} L = \bigoplus_{i \in M} R_i & \xrightarrow{\bar{f}} & M \\ \uparrow & \nearrow & \\ M & & \end{array}$$

Como  $\bar{f}$  es suprayectiva, por primer teorema de isomorfismo, terminamos.  $\square$

**Definición.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo. Una **resolución libre (proyectiva)** de  $M$  es una sucesión exacta de la forma

$$\cdots \longrightarrow F_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \xrightarrow{f_0} M \longrightarrow 0$$

tal que  $F_j$  es libre para toda  $j$ .

**Teorema.** Todo  $R$ -módulo tiene una resolución libre (proyectiva).

*Demostración.*  $f_0$  sale por la proposición anterior. Tomamos el módulo  $\ker f_0$ , lo incluimos en  $F_0$  escogemos  $F_1$  que cubre  $\ker f_0$  por la proposición anterior.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & F_1 & \xrightarrow{f_1} & F_0 & \xrightarrow{f_0} & M \longrightarrow 0 \\ & & & \searrow f_1 & \uparrow & & \\ & & & & \ker f_0 & & \end{array}$$

□

**Teorema.** Sea  $\alpha : M \rightarrow M'$  un homomorfismo.

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & F_2 & \xrightarrow{f_2} & F_1 & \xrightarrow{f_1} & F_0 & \xrightarrow{f_0} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha_2 & & \downarrow \alpha_1 & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \alpha & & \\ \cdots & \longrightarrow & F'_2 & \xrightarrow{f'_2} & F'_1 & \xrightarrow{f'_1} & F'_0 & \xrightarrow{f'_0} & M' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

entonces existen los  $\alpha_i$  que hacen conmutar el diagrama.

Más aún, si existen  $\beta_i : F_i \rightarrow F'_i$  que cumplen lo mismo entonces los homomorfismos determinados por los  $\alpha_i$  y  $\beta_i$  son homotópicos.

*Demostración.*

$$\begin{array}{ccccccc} & & \beta_0 & & & & \\ & & \downarrow & & & & \\ \cdots & \longrightarrow & F_0 & \xrightarrow{f_0} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \alpha & & \\ \cdots & \longrightarrow & F'_0 & \xrightarrow{f'_0} & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Tomamos un elemento  $e \in \beta_0$  en la base de  $F_0$ . Lo mandamos mediante  $f_0$  a  $M$ , luego con  $\alpha$ . Pero como  $f'_0$  es supra, podemos escoger un elemento  $e' \in F'_0$  que le pega.



Ahora

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \text{img } f_1 & & & & \\
 & & & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & F_2 & \xrightarrow{f_2} & F_1 & \xrightarrow{f_1} & F_0 & \xrightarrow{f_0} & M \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha_2 & & \downarrow \alpha_1 & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \alpha \\
 \cdots & \longrightarrow & F'_2 & \xrightarrow{f'_2} & F'_1 & \xrightarrow{f'_1} & F'_0 & \xrightarrow{f'_0} & M \longrightarrow 0 \\
 & & & & \uparrow & & & & \\
 & & & & \text{img } f'_1 & & & & 
 \end{array}$$

Hay una flecha desde  $\text{img } f_1$  hasta  $\text{img } f'_1$  que cierra el diagrama.

Faltó lo de homotopía (usando las diagonales como el diagrama coloreado).  $\square$

**Definición.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo. Tomamos una resolución libre

$$\cdots \longrightarrow F_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \xrightarrow{f_0} M \longrightarrow 0$$

Quitamos  $M$ :

$$\cdots \longrightarrow F_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \longrightarrow 0$$

Aplicamos  $\text{Hom}_R(-, N)$ :

$$0 \longrightarrow F_0^* \xrightarrow{f_1} F_1^* \longrightarrow F_2^* \xrightarrow{f_3^*} \cdots$$

Definimos

$$\text{Ext}_R^n(M, N) := H_n(0 \rightarrow F^*)$$

**Teorema.**  $\text{Ext}_R^n(M, N)$  no depende de la resolución.

*Demostración.* Usamos el teorema anterior (dos veces), tomando dos resoluciones de  $M$  usando la identidad como  $\alpha$ :

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & F_2 & \xrightarrow{f_2} & F_1 & \xrightarrow{f_1} & F_0 & \xrightarrow{f_0} & M \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha_2 & & \downarrow \alpha_1 & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow Id \\
 \cdots & \longrightarrow & F'_2 & \xrightarrow{f_2} & F'_1 & \xrightarrow{f_1} & F'_0 & \xrightarrow{f_0} & M \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \beta_2 & & \downarrow \beta_1 & & \downarrow \beta_0 & & \downarrow Id \\
 \cdots & \longrightarrow & F_2 & \xrightarrow{f_2} & F_1 & \xrightarrow{f_1} & F_0 & \xrightarrow{f_0} & M \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Y aquí resulta que  $\{\beta_i \alpha_i\} \simeq \{Id\}$ . Y dualizamos:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longleftarrow & F_1^* & \longleftarrow & F_0^* & \longleftarrow & M^* \longleftarrow 0 \\
 & & \alpha_1^* \uparrow & & \alpha_0^* \uparrow & & \\
 \cdots & \longleftarrow & F_1'^* & \longleftarrow & F_0'^* & \longleftarrow & M^* \longleftarrow 0 \\
 & & \beta_1^* \uparrow & & \beta_0^* \uparrow & & \\
 \cdots & \longleftarrow & F_1'^* & \longleftarrow & F_0'^* & \longleftarrow & M^* \longleftarrow 0
 \end{array}$$

Y como el funtor es aditivo, la homotopía pasa al dual, es decir,  $\{\beta_i^* \alpha_i^*\} \simeq \{Id\}$ . Luego pasamos a los grupos de homología:

$$\begin{array}{c}
 H_1(F^*) \\
 \alpha_1^\# \uparrow \\
 H_1(F'^*) \\
 \beta_1^\# \uparrow \\
 H_1(F^*)
 \end{array}$$

Cambiando los roles, obtenemos que estas dos funciones  $\alpha_1^\#$  y  $\beta_1^\#$  son inversas una de la otra.  $\square$

**Proposición.**  $\text{Ext}_R^0(M, N) \approx \text{Hom}_R(M, N)$ .

*Demostración.* Tenemos:

$$0 \longrightarrow \text{img } f_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \xrightarrow{f_0} M \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow M^* \xrightarrow{f_0^*} F_0^* \xrightarrow{f_1^*} \text{img } f_1^*$$

Luego  $\ker f_1^* \approx \text{img } f_0^* \approx M^*$ . Luego, por definición  $\text{Ext}_R^0(M, N) = \ker f_1^* \approx M^* = \text{Hom}(M, N)$   $\square$

**Lema** (De la herradura). *Sucesiones exactas cortas de módulos inducen sucesiones exactas cortas de resoluciones.* Tomemos una sucesión exacta corta y dos resoluciones libres de los

extremos. Entonces existe lo rojo:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 1 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & F'_0 & \longrightarrow & F_0 & \longrightarrow & F''_0 \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & F'_1 & \longrightarrow & F_1 & \longrightarrow & F''_1 \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

*Demostración.* Pa' pronto, la resolución de en medio es la suma de las resoluciones:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & & & 0 \\
 & & \uparrow & & & & \uparrow \\
 1 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & F'_0 & \longrightarrow & F'_0 \oplus F''_0 & \longrightarrow & F''_0 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Y hay que hacer todo lo de rutina. □

Ahora apliquemos  $\text{Hom}(-, N)$ :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longleftarrow & P'^*_0 & \longleftarrow & P^*_0 & \longleftarrow & P''^*_0 \longleftarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longleftarrow & P'^*_1 & \longleftarrow & P^*_1 & \longleftarrow & P''^*_1 \longleftarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \dots & & \dots & & \dots
 \end{array}$$

O sea que tenemos la sucesión exacta corta

$$0 \longleftarrow P'^*_\bullet \longleftarrow P^*_\bullet \longleftarrow P''^*_\bullet \longleftarrow 0$$

A la que aplicamos el teorema fundamental del álgebra homológica para obtener

$$0 \longrightarrow \text{Ext}_R^0(M'', N) \longrightarrow \text{Ext}_R^0(M, N) \longrightarrow \text{Ext}_R^0(M', N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M'', N) \longrightarrow \dots$$

Y notemos que los primeros tres módulos son:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M'', N) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(M', N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M'', N) \longrightarrow \dots$$

Y ahora supongamos que tenemos

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Que inducen

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longleftarrow & P_{\bullet}'^* & \longleftarrow & P_{\bullet}^* & \longleftarrow & P_{\bullet}''^* \longleftarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longleftarrow & Q_{\bullet}'^* & \longleftarrow & Q_{\bullet}^* & \longleftarrow & Q_{\bullet}''^* \longleftarrow 0 \end{array}$$

Y por fin obtenemos

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ext}_R^0(M'', N) & \longrightarrow & \text{Ext}_R^0(M, N) & \longrightarrow & \text{Ext}_R^0(M', N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M'', N) \longrightarrow \dots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ext}_R^0(A'', N) & \longrightarrow & \text{Ext}_R^0(A, N) & \longrightarrow & \text{Ext}_R^0(A', N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M'', N) \longrightarrow \dots \end{array}$$

donde todo conmuta. Y ese es más o menos el juego de los funtores derivados.

Es momento de hacer un decreto:

**A partir de ahora el anillo será  $\mathbb{Z}$ .**

Tomemos entonces  $A, B \in \mathbb{Z}\text{-mod}$  y el functor  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, B)$ . ¿Cómo será una resolución libre proyectiva para  $A$ ?

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \ker f_0 = P_1 \longrightarrow \bigoplus_{I_0} \mathbb{Z} = P_0 \xrightarrow{f_0} A \longrightarrow 0$$

Que inducen

$$0 \longleftarrow 0 \longleftarrow P_1^* \longleftarrow P_0^* \longleftarrow 0$$

Es decir,

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(A, B) = 0 \text{ para cualesquiera } \mathbb{Z}\text{-módulos } A, B \text{ y } n \geq 2.$$

**Proposición.**

- $\text{Ext}_R^n(-, N)$  es un functor aditivo para toda  $n$ , es decir,

$$\text{Ext}_R^n(M' \oplus M'', N) \approx \text{Ext}_R^n(M', N) \oplus \text{Ext}_R^n(M'', N)$$

*Demostración.* Consideremos

$$P'_\bullet \longrightarrow M' \longrightarrow 0$$

$$P''_\bullet \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

Y no es difícil ver que también tenemos

$$P'_\bullet \oplus P''_\bullet \longrightarrow M' \oplus M'' \longrightarrow 0$$

Y la homología abre sumas:  $(P''_\bullet \oplus P'_\bullet)^* \approx P''_\bullet^* \oplus P'_\bullet^*$ . □

- $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(A, B) = 0$  si  $A$  es libre.

*Demostración.* Simplemente tomamos  $0 \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow 0$ . □

- $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, B) \approx B/nB$ .

*Demostración.*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longleftarrow & \text{Hom}(\mathbb{Z}, B) & \xleftarrow{n^*} & \text{Hom}(\mathbb{Z}, B) & \longleftarrow & 0 \\ & & \downarrow \approx & & \downarrow \approx & & \\ 0 & \longleftarrow & B & \xleftarrow{n} & B & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

Así que  $B/nB = \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, B)$ . □

¿Qué obtenemos de esta proposición? Si  $A$  es finitamente generado,  $A \approx \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/m_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/m_t$ , entonces  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(A, B) \approx B/m_1B \oplus \dots \oplus B/m_tB$ .

## 1.4 Grupos de cohomología

Tomemos un grupo abeliano  $G$  y un complejo de cadenas de grupos abelianos libres

$$\dots \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} C_{n-2} \longrightarrow \dots$$

Y apliquemos el  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, G)$  para obtener

$$\dots \longrightarrow C_n^* \xrightarrow{\partial_{n+1}^*} C_{n+1}^* \xrightarrow{\partial_{n+2}^*} C_{n+2}^* \longrightarrow \dots$$

que tiene su homología,

$$H^n(C_\bullet, G) = \ker \partial_n^* / \text{img } \partial_{n-1}^*$$

que llamaremos el  $n$ -ésimo grupo de cohomología de  $C_\bullet$  con coeficientes en  $G$ .

Consideremos

$$\text{Hom}(C_{n-1}, G) \xrightarrow{\partial_{n-1}^*} \text{Hom}(C_{n-1}, G) \xrightarrow{\partial_n^*} \text{Hom}(C_n, G)$$

Y también

$$\begin{array}{ccc} C_{n-2} & \xrightarrow{f} & G \\ \partial_{n-1} \uparrow & \nearrow f\partial_{n-1} & \\ C_{n-1} & & \end{array}$$

De manera que los elementos en la homología funciones que se anulan en las fronteras, ya que  $[g] \in H^{n-1}(C; G)$  para alguna  $g : C_{n-1} \rightarrow G$  tal que

$$\begin{aligned} f\partial_{n-1} : C_{n-1} &\rightarrow G \\ g &\mapsto g\partial_n = 0 \end{aligned}$$

## 1.5 Teorema de coeficientes universales

Los funtores homología y dualizar no conmutan, es decir  $H^n(C_\bullet; G)$  y  $\text{Hom}(H_n(C_\bullet), G)$  no son iguales.

**Ejemplo.** Analizar el caso de

$$C_\bullet \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

comparando  $H^n(C_\bullet; \mathbb{Z})$  con  $\text{Hom}(H_n(C_\bullet); \mathbb{Z})$ . Para calcular la cohomología lo primero que hago es dualizar:

$$C_\bullet^* \quad 0 \xleftarrow{2} \mathbb{Z} \xleftarrow{\quad} \mathbb{Z} \xleftarrow{\quad} 0$$

De manera que  $H^0(C_\bullet; \mathbb{Z}) = 0$  y  $H^1(C_\bullet; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , pero  $\text{Hom}(H_n(C_\bullet), \mathbb{Z}) = 0$  para toda  $n$ .

Aún así, podemos construir una función

$$\begin{aligned} h : H^n(C_\bullet; G) &\rightarrow \text{Hom}(H_n(C_\bullet), G) \\ [g] &\mapsto Z_n/B_n = H_n(C_\bullet) \rightarrow G \end{aligned}$$

donde  $g : C_n \rightarrow G$  con  $g|_{B_n} = 0$ . Así que simplemente enviamos a  $[g]$  a la restricción  $g|_{Z_n} : Z_n/B_n \rightarrow G$ .

**Proposición.**  $h$  es suprayectiva. Más aún, existe una función

$$\varphi : \text{Hom}(H_n(C_\bullet), G) \rightarrow H^n(C_\bullet; G)$$

tal que  $h\varphi = id$ .

*Demostración.* Sea  $\bar{g} : H_n(C_\bullet) \rightarrow G$ . Como  $H_n(C_\bullet) = Z_n/B_n$ , lo que queremos hacer es extender  $\bar{g}$  a una función en todo  $C_\bullet$ . Observemos que tenemos esta sucesión exacta corta:

$$0 \longrightarrow Z_n \longrightarrow C_n \longrightarrow B_{n-1} \longrightarrow 0$$

Como  $B_{n-1} \subset C_{n-1}$  y  $C_n$  es libre porque **estamos suponiendo que  $C_\bullet$  es un complejo de cadenas de grupos abelianos libres**. Luego, esta sucesión exacta corta se escinde así que  $C_n = Z_n \oplus B_n$ , y la proyección a  $Z_n$  es un mapeo  $C_n \rightarrow Z_n$ . En fin,

$$\begin{array}{ccccc} Z_n & \longrightarrow & H_n(C) & \xrightarrow{\bar{g}} & G \\ \uparrow & & & \nearrow g & \\ C_n & & & & \end{array}$$

Y de hecho  $g$  sí representa un elemento en la cohomología, ya que  $g|_{B_n} = 0$  porque la flecha de  $Z_n \rightarrow H_n(C) = Z_n/B_n$  es el paso al cociente, así que se pierden los elementos de  $B_n$ . Además,  $\varphi$  es un homomorfismo. Ya además  $\varphi h = id$  por la forma en la que fue contruida: no hemos hecho más que extender y luego restringir una función.  $\square$

**Corolario.**  $H^n(C_\bullet, G) \approx \text{Hom}(H_n(C_\bullet), G) \oplus \ker h$ .

**Proposición.**  $\ker h \approx \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{n-1}, G)$ .

*Demostración.* Esta prueba tiene un truco. Comenzamos por definir el complejo de cadenas de los ciclos,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & & & & & \\ \downarrow & & & & & & \\ Z_\bullet & \cdots \longrightarrow & Z_n & \xrightarrow{0} & Z_{n-1} & \xrightarrow{0} & \cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ C_\bullet & \cdots \longrightarrow & C_n & \xrightarrow{\partial_n} & C_{n-1} & \xrightarrow{\partial_{n-1}} & \cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ B_{\bullet-1} & \cdots \longrightarrow & B_n & \xrightarrow{0} & B_{n-1} & \xrightarrow{0} & \cdots \\ \downarrow & & & & & & \\ 0 & & & & & & \end{array}$$

Los homomorfismos frontera son 0 cuando vemos este complejo de cadenas como sub-complejo de cadenas de  $C_\bullet$ . Y algo parecido para  $B_{\bullet-1}$ . Ahora, la sucesión exacta corta de complejos de cadenas se escinde y al dualizar obtenemos

$$0 \longrightarrow B_{\bullet-1}^* \longrightarrow C_\bullet^* \longrightarrow Z_\bullet^* \longrightarrow 0$$

Ahora sí, aplicamos el teorema fundamental del álgebra homológica para obtener

$$\cdots \longrightarrow B_{n-1}^* \longrightarrow H^n(C_\bullet, G) \longrightarrow Z_n^* \longrightarrow B_n^* \longrightarrow H^{n+1}(C_\bullet, G) \longrightarrow \cdots$$

**Afirmación.**  $Z_n^* \xrightarrow{i_n^*} B_n^*$  dado por  $g \mapsto g|_{B_n}$  es el dual de  $B_n \hookrightarrow Z_n$ .

**Observación.** El dual de una inclusión es una restricción.

En la prueba simplemente mostramos que el mapeo  $g \mapsto \bar{g}\partial_{n+1} : B_n \rightarrow G$  es una restricción.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & Z_{\bullet} & \cdots \longrightarrow & Z_n^* & \xrightarrow{0} & Z_{n-1}^* \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & C_{\bullet} & \cdots \longrightarrow & C_n^* & \xrightarrow{\partial_n^*} & C_{n-1}^* \xrightarrow{\partial_{n-1}^*} \cdots \\
 & & \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & B_{\bullet-1} & \cdots \longrightarrow & B_n^* & \xrightarrow{0} & B_{n-1}^* \xrightarrow{0} \cdots \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & 0 & & & & 
 \end{array}$$

Perseguimos ese diagrama para construir el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc}
 & & Z_n & \xrightarrow{g} & G \\
 & \nearrow & \downarrow & \nearrow \bar{g} & \\
 B_n & \hookrightarrow & C_n & & \\
 & \nwarrow & \uparrow & & \\
 & & C_{n+1} & & 
 \end{array}$$

Parece que la  $\bar{g}$  cambió de ser una restricción a una extensión...

Luego

$$0 \longrightarrow \text{coker } i_{n-1}^* \longrightarrow H^n(C_{\bullet}; G) \xrightarrow{h} \ker i_n^* \longrightarrow 0$$

**Afirmación.**  $\ker i_n^* = \text{Hom}(H_n(C_{\bullet}), G)$

**Afirmación.**  $\ker h = \text{coker } i_{n-1}^*$ .

Entonces,

$$Z_{n-1}^* \xrightarrow{i_{n-1}^*} B_{n-1}^* \longrightarrow \text{coker } i_{n-1}^* \longrightarrow 0$$

Y ahora nada más tomamos

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & 0 \\
 & & & & \nearrow & & \\
 0 & \longrightarrow & B_{n-1} & \hookrightarrow & Z_{n-1} & \longrightarrow & H_{n-1}(C_{\bullet}) \longrightarrow 0
 \end{array}$$



Y de aquí que

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & & & & & 0 \\ & \searrow & & & \nearrow & & \\ & Z_{n-1}^* & \xrightarrow{i_{n-1}^*} & B_{n-1}^* & \longrightarrow & \text{coker } i_{n-1}^* & \longrightarrow 0 \end{array}$$

Y esa de cuatro no es exacta pero sí concluimos que  $\text{coker } i_{n-1}^* = \text{Ext}^1(H_n(C_\bullet), G)$ .  $\square$

**Teorema** (de coeficientes universales). Sean  $G$  un grupo abeliano y  $C_\bullet$  un  $\mathbb{Z}$ -complejo de cadenas de grupos abelianos libres, entonces tenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^1(H_{n-1}(C_\bullet), G) \longrightarrow H^n(C_\bullet, G) \xrightarrow{h} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(C), G) \longrightarrow 0$$

que se escinde.

Además, esta sucesión es **natural** en  $C_\bullet$ , es decir, si  $\alpha : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$ , entonces el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ext}^1(H_{n-1}(C_\bullet), G) & \longrightarrow & H^n(C_\bullet, G) & \xrightarrow{h} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(C), G) \longrightarrow 0 \\ & & \alpha_* \uparrow & & \alpha^* \uparrow & & \alpha_* \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ext}^1(H_{n-1}(C'_\bullet), G) & \longrightarrow & H^n(C'_\bullet, G) & \xrightarrow{h'} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(C'), G) \longrightarrow 0 \end{array}$$

donde estamos abusando de notación con las flechas inducidas por  $\alpha$ , que son distintas, pero se obtienen usando que  $H_n$  y  $\text{Ext}$  son funtores.

**Observación.** El nombre *coeficientes universales* tiene que ver con que la homología con coeficientes en  $\mathbb{Z}$  determina la cohomología con cualesquiera coeficientes.

*Demostración.* Ahora demostremos la naturalidad. Comenzamos con el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Z_\bullet & \longrightarrow & C_\bullet & \xrightarrow{\partial} & B_{\bullet,-1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha \\ 0 & \longrightarrow & Z'_\bullet & \longrightarrow & C'_\bullet & \longrightarrow & B'_{\bullet,-1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Luego dualizamos:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Z_\bullet^* & \longrightarrow & C_\bullet^* & \longrightarrow & B_{\bullet,-1}^* \longrightarrow 0 \\ & & \alpha^* \uparrow & & \alpha^* \uparrow & & \alpha^* \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & Z_{\bullet}^{'*} & \longrightarrow & C_{\bullet}^{'*} & \longrightarrow & B_{\bullet,-1}^{'*} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Y por último

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{coker } i_{n-1}^* & \longrightarrow & H^n(C_\bullet, G) & \longrightarrow & \ker i_n^* \longrightarrow 0 \\
 & & \alpha^* \uparrow & & \alpha^* \uparrow & & \alpha^* \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \text{coker } i'_{n-1} & \longrightarrow & H^n(C'_\bullet, G) & \longrightarrow & \ker i_n'^* \longrightarrow 0
 \end{array}$$

□

**Corolario.** Supongamos que  $H_n(C_\bullet)$  y  $H_{n-1}(C_\bullet)$  son finitamente generados. Podemos expresarlos así:

$$H_n(C_\bullet) = \mathbb{Z}^{r_n} \oplus T_n \quad H_{n-1}(C_\bullet) = \mathbb{Z}^{r_{n-1}} \oplus T_{n-1}$$

Con  $T_n$  y  $T_{n-1}$  finitos. Entonces,

$$H^n(C_\bullet, \mathbb{Z}) \approx \mathbb{Z}^{r_n} \oplus T_{n-1}$$

*Demostración.*

$$\begin{aligned}
 H^n(C_\bullet, \mathbb{Z}) &\approx \text{Hom}(H_n(C_\bullet, \mathbb{Z})) \oplus \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{n-1}(C_\bullet), \mathbb{Z}) \\
 &\approx \text{Hom}(\mathbb{Z}^{r_n} \oplus T_n, \mathbb{Z}) \oplus \text{Ext}(\mathbb{Z}^{r_{n-1}} \oplus T_{n-1}, \mathbb{Z}) \\
 &\approx \text{Hom}(\mathbb{Z}^{r_n}, \mathbb{Z}) \oplus \text{Hom}(T_n, \mathbb{Z}) \oplus \text{Ext}(\mathbb{Z}^{r_{n-1}}, \mathbb{Z}) \oplus \text{Ext}(T_{n-1}, \mathbb{Z}) \\
 &\approx \mathbb{Z}^{r_n} \oplus T_{n-1}
 \end{aligned}$$

□

**Corolario.** Si  $\alpha : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$  induce isomorfismos en homología, entonces induce isomorfismos en cohomología.

*Demostración.* En la prueba de la naturalidad del teorema de coeficientes universales, los  $\alpha_*$  de los extremos son isomorfismos. Por el lema de los cinco,  $\alpha_*$  también lo es. □

## 2. Cohomología

Sea  $X$  un espacio topológico y  $G$  un grupo abeliano. Podemos definir el complejo de cadenas singulares de  $X$ ,

$$C_{\bullet}(X) \quad \cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

donde

$$C_n(X) := \left\{ \sum_{i=1}^m r_i \sigma_i \mid m \in \mathbb{Z}, r_i \in \mathbb{R}, \sigma_i \text{ es un simplejo singular} \right\} \approx \bigoplus_{n \text{ sim. sing.}} \mathbb{Z}$$

Y definimos

$$\begin{aligned} H_n(X; \mathbb{Z}) &= H_n(C_{\bullet}(X)) \\ C^{\bullet}(X; G) &= \text{Hom}(C_{\bullet}(X), G) \\ H^n(X; G) &= H_n(C^{\bullet}(X, G)) \end{aligned}$$

de donde

$$\cdots \longleftarrow \text{Hom}(C_{n+1}, G) \xleftarrow{\partial_{n+1}^*} \text{Hom}(C_n, G) \xleftarrow{\partial_n^*} \text{Hom}(C_{n-1}, G) \longleftarrow \cdots$$

Y las fronteras están definidas mediante

$$\begin{array}{ccc} C_n & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \partial_{n+1} \uparrow & \nearrow & \\ C_{n+1} & & \end{array}$$

Y definimos los cociclos y las cofronteras.

Y el **teorema de coeficientes universales en cohomología** nos dice que:

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^1(H_{n-1}(X), G) \longrightarrow H^n(X, G) \xrightarrow{h} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(X), G) \longrightarrow 0$$

También podemos definir los **grupos de cohomología reducidos** comenzando con el complejo de cadenas

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

dualizando, y calculando homología. Como con la homología reducida,  $\tilde{H}^n(X; G) = H^n(X; G)$ , y  $H^0(X) \approx \text{Hom}(H_0(X), G) \approx \bigoplus_{\pi_0(X)} G$ . Para verlo, usamos el teorema de coeficientes universales. Y si  $X$  es arco-conexo, por la propiedad universal del abelianizado y usando el homomorfismo de Hurewics,  $H^n(X) \approx \text{Hom}(\pi_1(X), G)$ .

También hay un **teorema de coeficientes universales para la cohomología reducida**.

Ahora tratemos de definir la cohomología de la pareja. Todo comienza usando

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A) \longrightarrow C_\bullet(X) \longrightarrow C_\bullet(A, X) \longrightarrow 0$$

Que se escinde ya que la base de  $C_\bullet(A)$  es una sub-base de  $C_\bullet(X)$ . Aplicamos  $\text{Hom}(-, G)$  para obtener

$$0 \longrightarrow C_\bullet^*(X, A) \longrightarrow C_\bullet^*(X) \longrightarrow C_\bullet^*(A) \longrightarrow 0$$

Y aquí calculamos los grupos de homología

$$H^n(X, A) := H_n(C_\bullet^*(X, A))$$

Aplicamos el teorema fundamental del álgebra para obtener

$$\cdots \longrightarrow H^n(X, A) \longrightarrow H^n(X) \longrightarrow H^n(A) \longrightarrow H^{n+1}(X, A) \longrightarrow \cdots$$

Y también tenemos **naturalidad**, es decir, si tenemos  $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$  es decir, una función continua con  $f(A) \subset B$ , entonces el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_\bullet(A) & \longrightarrow & C_\bullet(X) & \longrightarrow & C_\bullet(A, X) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f_\# & & \downarrow f_\# & & \downarrow f_\# \\ 0 & \longrightarrow & C_\bullet(B) & \longrightarrow & C_\bullet(Y) & \longrightarrow & C_\bullet(Y, B) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Luego dualizamos,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_\bullet^*(A) & \longrightarrow & C_\bullet^*(X) & \longrightarrow & C_\bullet^*(A, X) \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow f_\#^* & & \uparrow f_\#^* & & \uparrow f_\#^* \\ 0 & \longrightarrow & C_\bullet^*(B) & \longrightarrow & C_\bullet^*(Y) & \longrightarrow & C_\bullet^*(Y, B) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Y también aquí todo conmuta:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^n(X, A) & \longrightarrow & H^n(X) & \longrightarrow & H^n(A) \longrightarrow H^{n+1}(X, A) \longrightarrow \cdots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \cdots & \longrightarrow & H^n(Y, B) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^n(B) \longrightarrow H^{n+1}(Y, B) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Aprovechamos para decir que una función de parejas como ésta tiene una **función inducida**

$$f^* : H^n(Y, B) \rightarrow H^n(X, A)$$

y de hecho  $(fg)^* = g^* f^*$ ,  $id_{(X,A)}^* = id_{H^n(X,A)}$ . O sea que de verdad tenemos un funtor.

También tenemos **invarianza homotópica**, es decir, si  $f, g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$  son homotópicas, entonces  $f^* = g^*$ . Recordemos un poco la demostración: si dos funciones de parejas son homotópicas, entonces las funciones inducidas en los complejos de cadenas son homotópicas con la definición algebraica, así que inducen iguales en la homología. Dualizando ese diagrama con flechas diagonales de colores, obtenemos que las funciones en cocadenas son homotópicas, así que serán iguales en cohomología.

También tenemos un **teorema de coeficientes universales para parejas**, que se enuncia así:

$$0 \longrightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_n(X, A), G) \longrightarrow H^n(X, A; G) \longrightarrow \text{Hom}(H_n(X, A), G) \longrightarrow 0$$

que se puede aplicar simplemente porque el complejo de cadenas  $C_\bullet(X, A)$  es de grupos abelianos libres.

Y además el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{n-1}(X, A), G) & \longrightarrow & H^n(X, A; G) & \xrightarrow{h} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(X, A), G) \longrightarrow 0 \\ & & \alpha_* \uparrow & & \alpha^* \uparrow & & \alpha_* \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{n-1}(Y, B), G) & \longrightarrow & H^n(Y, B; G) & \xrightarrow{h'} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(Y, B), G) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Y también hay **escisión**: si  $Z \subseteq A \subseteq X$  tal que  $\bar{Z} \subseteq A$ ,  $i : (X - Z, A - Z) \hookrightarrow (X, A)$ , entonces  $i^* : H^n(X - Z, A - Z) \xrightarrow{\cong} H^n(X, A)$ , cuya demostración se puede dar con escisión homológica y coeficientes universales vía lema de los cinco.

Ahora tomemos la cuña de espacios tales que el punto de pegado tiene una vecindad contraíble, entonces:

$$\begin{aligned} \tilde{H}_n \left( \bigvee_{\alpha} X_{\alpha} \right) &\approx \bigoplus_{\alpha} H_n(X_{\alpha}) & \tilde{H}^n \left( \bigvee_{\alpha} X_{\alpha} \right) &\approx \prod_{\alpha} \tilde{H}^n(X_{\alpha}) \\ H_n \left( \bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha} \right) &\approx \bigoplus_{\alpha} H_n(X_{\alpha}) & H^n \left( \bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha} \right) &\approx \prod_{\alpha} H^n(X_{\alpha}) \end{aligned}$$

Para complejos CW,

$$H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \approx H_n(X^{(n)}/X^{(n-1)}) \approx H_n \left( \bigvee_{n\text{-células}} S^n \right) \approx \bigoplus_{n\text{-células}} \mathbb{Z}$$

Recordemos que la homología celular se construye de acuerdo al siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H_{n-1}(X^{n-1}) & & \\
 & \nearrow \partial_n & & \searrow j_{n-1} & \\
 H_n(X^n, X^{n-1}) & \xrightarrow{d_n} & H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) & \xrightarrow{d_{n-1}} & H_{n-2}(X^{n-2}, X^{n-3}) \\
 & & \searrow \partial_{n-1} & & \nearrow j_{n-2} \\
 & & & & H_{n-2}(X^{n-2})
 \end{array}$$

Dualicemos esto:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H^{n-1}(X^{n-1}) & & \\
 & \nwarrow \partial_n^* & & \swarrow j_{n-1}^* & \\
 H^n(X^n, X^{n-1}) & \xleftarrow{D^n} & H^{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) & \xleftarrow{D^{n-1}} & H^{n-2}(X^{n-2}, X^{n-3}) \\
 & & \nwarrow \partial_{n-1}^* & & \swarrow j_{n-2}^* \\
 & & & & H^{n-2}(X^{n-2})
 \end{array}$$

Obtenemos funciones  $D_n$  en vez de las  $d_n$ , y pues nada, tenemos **chomología celular**, y otra vez,  $H_n(C_{CW}^\bullet(X)) := H_{CW}^n(X) \approx H^\bullet(X)$ .