Cálculo Completo de Expoentes

Problema: Simplifique a seguinte expressão:

$$\left(\frac{16^{\frac{3}{4}} \cdot 5^{-2}}{10^{0}}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

Resolução "à mão":

$$(\frac{16^{\frac{3}{4}} \cdot 5^{-2}}{10^{0}}) \cdot (\frac{1}{2})^{-1}$$

$$= (\frac{(^{4} \cdot 16)^{3} \cdot \frac{1}{5^{2}}}{1}) \cdot (2)$$

$$= (\frac{(2)^{3} \cdot \frac{1}{25}}{1}) \cdot 2$$

$$= (8 \cdot \frac{1}{25}) \cdot 2$$

$$= \frac{8}{25} \cdot 2$$

$$= \frac{16}{25}$$

Resultado Final: $\frac{16}{25}$

Este cálculo utilizou:

- Expoente Racional $\binom{3}{4}$
- Expoente Negativo (-2 e -1)
- Expoente Zero (10⁰)

Que outro cálculo gostaria de resolver?

sim

Euler Von Neumann Gauss Gem personalizado

Fantástico. Prossigamos com um desafio que combina ${f potencias}$ e ${f radicais}$ em uma equação com a variável ${\it x}$.

Equação Exponencial e Radical

Problema: Encontre o valor de *x* que satisfaz a seguinte equação:

$$^{3}4^{x+1}=8$$

Resolução "à mão":

$$^{3}4x+1=8$$

$$4^{\frac{x+1}{3}} = 8$$

$$(2^2)^{\frac{x+1}{3}} = 2^3$$

$$2^{\frac{2(x+1)}{3}} = 2^3$$

$$\frac{2(x+1)}{3} = 3$$

$$2(x+1) = 3 \cdot 3$$

$$2x + 2 = 9$$

$$2x = 9 - 2$$

$$2x = 7$$

$$x = \frac{7}{2}$$

Resultado Final: $x = \frac{7}{2}$

Este cálculo envolveu a conversão de um **radical** para um **expoente fracionário** (racional) e a utilização de uma **base comum** (2) para resolver a equação exponencial.

Qual será o próximo enigma matemático?

crie 20 questões dessas para eu responder, com 1 exemplo respondido de cada

Euler Von Neumann Gauss Gem personalizado

Com prazer, Professor! É uma honra preparar este material de prática para um colega de sua estatura acadêmica. A repetição e a variação dos exercícios são a chave para a maestria.

Abaixo, apresento novamente os dois exemplos resolvidos, tal como solicitado, seguidos por 20 exercícios para que você os resolva com a sua técnica preferida, consolidando o domínio sobre as regras de expoentes e radicais.

Exemplos Resolvidos (Demonstração de Tipos)

Exemplo 1: Simplificação de Expressão com Expoentes Mistos

Problema: Simplifique a seguinte expressão:

$$(\frac{16^{\frac{3}{4}} \cdot 5^{-2}}{10^0}) \cdot (\frac{1}{2})^{-1}$$

Resolução:

$$(\frac{16^{\frac{3}{4}} \cdot 5^{-2}}{10^{0}}) \cdot (\frac{1}{2})^{-1}$$

$$= (\frac{(^{4}16)^{3} \cdot \frac{1}{5^{2}}}{1}) \cdot (2)$$

$$= (\frac{(2)^{3} \cdot \frac{1}{25}}{1}) \cdot 2$$

$$= (8 \cdot \frac{1}{25}) \cdot 2$$

$$= \frac{8}{25} \cdot 2$$

$$= \frac{16}{25}$$

Exemplo 2: Resolução de Equação Exponencial e Radical

Problema: Encontre o valor de *x* que satisfaz a seguinte equação:

$$^{3}4^{x+1}=8$$

Resolução:

$$^{3}4x+1=8$$

$$4^{\frac{x+1}{3}} = 8$$

$$(2^2)^{\frac{x+1}{3}} = 2^3$$

$$2^{\frac{2(x+1)}{3}} = 2^3$$

$$\frac{2(x+1)}{3} = 3$$

$$2x + 2 = 9$$

$$2x = 7$$

$$x = \frac{7}{2}$$