

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №1
по дисциплине: Исследование операций
тема: “Исследование множества опорных планов системы ограничений задачи линейного
программирования (задачи ЛП) в канонической форме”

Выполнил: ст. группы ПВ-231
Столяров Захар

Проверил:
Вирченко Юрий Петрович

Белгород, 2025 г.

Лабораторная работа №1 «Исследование множества опорных планов системы ограничений задачи линейного программирования (задачи ЛП) в канонической форме.»

Цель работы: изучить метод Гаусса-Жордана и операцию замещения, а также освоить их применение к отысканию множества допустимых базисных видов системы линейных уравнений, и решению задачи линейного программирования простым перебором опорных решений.

Вариант 14

Оглавление


Система уравнений моего варианта

$$\begin{cases} -x_1 + 5x_2 - 4x_3 - 6x_4 + x_6 = -9 \\ 8x_1 + x_2 - x_3 + 2x_5 + 3x_6 = 8 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 9x_4 + x_5 + 7x_6 = 1 \end{cases}$$


Задание 1

Составить программу для отыскания всех базисных видов системы линейных уравнений:

Блок-схема функции `gauss_jordan`



images/block2.png



`images/block3.png`

Код программы

Результат работы программы:

images/task1.png

images/task12.png

Описание программы:

1. Ввод данных:

- Программа запрашивает количество уравнений и переменных.
- Затем вводятся коэффициенты системы уравнений.

2. Метод Гаусса-Жордана:

- Матрица приводится к приведённому ступенчатому виду.
- Ведущие элементы (первые ненулевые элементы в строках) становятся равными 1.
- Все остальные элементы в столбцах ведущих элементов обнуляются.

3. Анализ решения:

- Если в процессе преобразований обнаруживается строка вида $0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid b$, где $b \neq 0$, система не имеет решений.
- Если система имеет бесконечно много решений, программа указывает свободные переменные.
- Если система имеет единственное решение, программа выводит его.

Задание 2

Организовать отбор опорных планов среди всех базисных решений, а также нахождение оптимального опорного плана методом прямого перебора. Целевая функция выбирается произвольно.

Код программы:

Результаты работы алгоритма:

images/task2.png

Описание программы:

1. Функция `gauss_jordan`:

- Приводит расширенную матрицу системы к упрощённому ступенчатому виду.

2. Функция `is_feasible`:

- Проверяет, является ли решение опорным планом (все переменные неотрицательны).

3. Функция `objective_function`:

- Задаёт целевую функцию

4. Функция `find_optimal_plan`:

- Находит все базисные решения.
- Отбирает опорные планы.
- Находит оптимальный опорный план, минимизирующий целевую функцию.

Задание 3

Решить систему линейных уравнений вручную (подготовить тестовые данные)

$$\begin{cases} -x_1 + 5x_2 - 4x_3 - 6x_4 + x_6 = -9 \\ 8x_1 + x_2 - x_3 + 2x_5 + 3x_6 = 8 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 9x_4 + x_5 + 7x_6 = 1 \end{cases}$$

- Так как $n > m$ (переменных больше чем уравнений, то система имеет бесконечно много решений)
- Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} -1 & 5 & -4 & -6 & 0 & 1 & -9 \\ 8 & 1 & -1 & 0 & 2 & 3 & 8 \\ 4 & 3 & -2 & 9 & 1 & 7 & 1 \end{array} \right)$$

- Приведение матрицы:

1. $a_{11} = -1$

- Делим первую строку на -1:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 4 & 6 & 0 & -1 & 9 \\ 8 & 1 & -1 & 0 & 2 & 3 & 8 \\ 4 & 3 & -2 & 9 & 1 & 7 & 1 \end{array} \right)$$

- Умножаем первую строку на 8 и вычитаем из второй:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 4 & 6 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 41 & -33 & -48 & 2 & 11 & -64 \\ 4 & 3 & -2 & 9 & 1 & 7 & 1 \end{array} \right)$$

- Умножаем первую строку на 4 и вычитаем из третьей:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 4 & 6 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 41 & -33 & -48 & 2 & 11 & -64 \\ 0 & 23 & -18 & -15 & 1 & 11 & -35 \end{array} \right)$$

2. $a_{22} = 41$

– Делим вторую строку на 41:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 4 & 6 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{33}{41} & -\frac{48}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 23 & -18 & -15 & 1 & 11 & -35 \end{array} \right)$$

– Умножаем вторую строку на -5 и вычитаем из первой:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{41} & \frac{6}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & -\frac{33}{41} & -\frac{48}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 23 & -18 & -15 & 1 & 11 & -35 \end{array} \right)$$

– Умножаем вторую строку на 23 и вычитаем из третьей:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{41} & \frac{6}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & -\frac{33}{41} & -\frac{48}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 0 & \frac{21}{41} & \frac{489}{41} & -\frac{5}{41} & \frac{198}{41} & \frac{37}{41} \end{array} \right)$$

3. $a_{33} = \frac{21}{41}$

– Делим третью строку на $\frac{21}{41}$:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{41} & \frac{6}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & -\frac{33}{41} & -\frac{48}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{163}{7} & -\frac{5}{21} & \frac{66}{7} & \frac{37}{21} \end{array} \right)$$

– Умножаем третью строку на $-\frac{33}{41}$ и вычитаем из второй:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{41} & \frac{6}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{123}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{55}{7} & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{163}{7} & -\frac{5}{21} & \frac{66}{7} & \frac{37}{21} \end{array} \right)$$

– Умножаем третью строку на $-\frac{1}{41}$ и вычитаем из первой:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{7} & \frac{5}{21} & \frac{4}{7} & \frac{26}{21} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{123}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{55}{7} & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{163}{7} & -\frac{5}{21} & \frac{66}{7} & \frac{37}{21} \end{array} \right)$$

- Матрица в упрощенном ступенчатом виде:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{7} & \frac{5}{21} & \frac{4}{7} & \frac{26}{21} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{123}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{55}{7} & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{163}{7} & -\frac{5}{21} & \frac{66}{7} & \frac{37}{21} \end{array} \right)$$

- После всех преобразований матрица имеет вид:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & a_{14} & a_{15} & a_{16} & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & a_{24} & a_{25} & a_{26} & b_3 \\ 0 & 0 & 1 & a_{34} & a_{35} & a_{36} & b_2 \end{array} \right)$$

- Базисные переменные: x_1, x_2, x_3 . Выражаем их через свободные x_4, x_5, x_6 :

$$\begin{cases} x_1 = b_1 - a_{14}x_4 - a_{15}x_5 - a_{16}x_6 \\ x_2 = b_2 - a_{24}x_4 - a_{25}x_5 - a_{26}x_6 \\ x_3 = b_3 - a_{34}x_4 - a_{35}x_5 - a_{36}x_6 \end{cases}$$

- Итоговое решение:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{26}{21} - \frac{5}{7}x_4 - \frac{5}{21}x_5 - \frac{4}{7}x_6 \\ x_2 = -\frac{1}{7} - \frac{123}{7}x_4 + \frac{1}{7}x_5 - \frac{55}{7}x_6 \\ x_3 = \frac{37}{21} - \frac{163}{7}x_4 + \frac{5}{21}x_5 - \frac{66}{7}x_6 \end{cases}$$

Найдем один из опорных планов (Всего их $C_6^3 = 20$):

- Для базисных переменных x_1, x_2, x_4
- Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} -1 & 5 & -6 & -4 & 0 & 1 & -9 \\ 8 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 & 8 \\ 4 & 3 & 9 & -2 & 1 & 7 & 1 \end{array} \right)$$

1. $a_{11} = -1$

- Делим первую строку на -1:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 6 & 4 & 0 & -1 & 9 \\ 8 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 & 8 \\ 4 & 3 & 9 & -2 & 1 & 7 & 1 \end{array} \right)$$

- Умножаем первую строку на 8 и вычитаем из второй:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 6 & 4 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 41 & -48 & -33 & 2 & 11 & -64 \\ 4 & 3 & 9 & -2 & 1 & 7 & 1 \end{array} \right)$$

- Умножаем первую строку на 4 и вычитаем из третьей:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 6 & 4 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 41 & -48 & -33 & 2 & 11 & -64 \\ 0 & 23 & -15 & -18 & 1 & 11 & -35 \end{array} \right)$$

2. $a_{22} = 41$

- Делим вторую строку на 41:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -5 & 6 & 4 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{48}{41} & -\frac{33}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 23 & -15 & -18 & 1 & 11 & -35 \end{array} \right)$$

- Умножаем вторую строку на -5 и вычитаем из первой:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{6}{41} & -\frac{1}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & -\frac{48}{41} & -\frac{33}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 23 & -15 & -18 & 1 & 11 & -35 \end{array} \right)$$

- Умножаем вторую строку на 23 и вычитаем из третьей:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{6}{41} & -\frac{1}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & -\frac{48}{41} & -\frac{33}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 0 & \frac{489}{41} & \frac{21}{41} & -\frac{5}{41} & \frac{198}{41} & \frac{37}{41} \end{array} \right)$$

3. $a_{33} = \frac{21}{41}$

– Делим третью строку на $\frac{489}{41}$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{6}{41} & -\frac{1}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & -\frac{48}{41} & -\frac{33}{41} & \frac{2}{41} & \frac{11}{41} & -\frac{64}{41} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{163} & -\frac{5}{489} & \frac{66}{163} & \frac{37}{489} \end{array} \right)$$

– Умножаем третью строку на $-\frac{48}{41}$ и вычитаем из второй:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{6}{41} & -\frac{1}{41} & \frac{10}{41} & \frac{14}{41} & \frac{49}{41} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{123}{163} & \frac{6}{163} & \frac{121}{163} & \frac{240}{163} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{163} & -\frac{5}{489} & \frac{66}{163} & \frac{37}{489} \end{array} \right)$$

– Умножаем третью строку на $-\frac{6}{41}$ и вычитаем из первой:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1020}{6683} & -\frac{173}{6683} & \frac{2678}{6683} & \frac{8061}{6683} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{123}{163} & \frac{6}{163} & \frac{121}{163} & \frac{240}{163} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{163} & -\frac{5}{489} & \frac{66}{163} & \frac{37}{489} \end{array} \right)$$

- После всех преобразований матрица имеет вид:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a_{14} & a_{15} & a_{16} & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & a_{24} & a_{25} & a_{26} & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & a_{34} & a_{35} & a_{36} & b_3 \end{array} \right)$$

- Базисные переменные: x_1, x_2, x_3 . Выражаем их через свободные x_4, x_5, x_6 :

$$\begin{cases} x_1 = b_1 - a_{14}x_4 - a_{15}x_5 - a_{16}x_6 \\ x_2 = b_2 - a_{24}x_4 - a_{25}x_5 - a_{26}x_6 \\ x_3 = b_3 - a_{34}x_4 - a_{35}x_5 - a_{36}x_6 \end{cases}$$

- Итоговое решение:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8061}{6683} - \frac{1020}{6683}x_4 + \frac{173}{6683}x_5 - \frac{2678}{6683}x_6 \\ x_2 = \frac{240}{163} + \frac{123}{163}x_4 - \frac{6}{163}x_5 - \frac{121}{163}x_6 \\ x_3 = \frac{37}{489} - \frac{7}{163}x_4 + \frac{5}{489}x_5 - \frac{66}{163}x_6 \end{cases}$$

Целевая функция равна сумме свободных членов:

- $\frac{8061}{41} + \frac{240}{163} + \frac{37}{489} = \frac{55220}{20049}$

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы я составил программу для отыскания всех базисных решений системы уравнений с помощью метода Гаусса-Жордана, вывод которой совпал с ответом в моем аналитическом решении.