

Solutions for Sheet 2

Raphael Wude, Martin Brückmann, Claude Jordan, Daniel Degenstein

PATTERN MATCHING AND MACHINE LEARNING FOR AUDIO SIGNAL PROCESSING

April 16, 2022

Task 2.1

Theorem 1. *Let $1 \neq q \in \mathbb{C}$ then for all positive integers n : $\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1-q^N}{1-q}$*

Proof. Base Case ($N = 1$)

$$\sum_{n=0}^{1-1} q^n = \sum_{n=0}^0 q^n = q^0 = 1 = \frac{1-q}{1-q} = \frac{1-q^1}{1-q}$$

Inductive Step ($N \rightarrow N+1$)

$$\sum_{n=0}^{N+1-1} q^n = \sum_{n=0}^N q^n = \sum_{n=0}^{N-1} q^n + q^N \stackrel{\text{IV}}{=} \frac{1-q^N}{1-q} + q^N = \frac{1-q^N}{1-q} + \frac{q^N \cdot (1-q)}{1-q} = \frac{1-q^N}{1-q} + \frac{q^N - q^{N+1}}{1-q} = \frac{1-q^N + q^N - q^{N+1}}{1-q} = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$$

□