

5.4.9 $y'' + 9y = \cos 3t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$

$$s^2 Y - s y(0) - y'(0) + 9Y(s) = \frac{s}{s^2 + 3^2}$$

$$(s^2 + 9)Y - s + 1 = \frac{s}{s^2 + 9}$$

$$Y = -\frac{1}{s^2 + 9} + \frac{s}{s^2 + 9} + \frac{s}{(s^2 + 9)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{s^2 + a^2} \right\} = \sin at$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + a^2} \right\} = \cos at$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2} \right\} = t \sin(at)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \{Y(s)\} = -\frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{s^2 + 3^2} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 3^2} \right\} + \frac{1}{6} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2 \cdot 3 \cdot s}{(s^2 + 3^2)^2} \right\}$$

$y(t) = -\frac{1}{3} \sin 3t + \cos 3t + \frac{1}{6} t \sin 3t$

5.4.11 $y'' - 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 4$

$$s^2 Y - s y(0) - y'(0) - 2(sY - y(0)) + 5Y = 0$$

$$s^2 Y - 2s - 4 - 2sY + 4 + 5Y = 0$$

$$(s^2 - 2s + 5)Y = 2s$$

$$Y(s) = \frac{2s}{s^2 - 2s + 5} = 2 \frac{s}{(s-1)^2 + 2^2}$$

$$Y(s) = 2 \frac{s-1}{(s-1)^2 + 2^2} + \frac{2}{(s-1)^2 + 2^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2} \right\} = e^{at} \cos bt$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{(s-a)^2 + b^2} \right\} = e^{at} \sin bt$$

$y(t) = 2e^t \cos 2t + e^t \sin 2t$

5.4.13 $y'' + 3y' + 2y = 6$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$

$$s^2 Y - 0 - 2 + 3sY - 0 + 2Y = 6/s$$

$$(s^2 + 3s + 2)Y = 2 + 6/s$$

$$2s + 6 = A(s+1)(s+2) + Bs(s+2) + Cs(s+1)$$

$$\begin{aligned} 6 &= 2A & 4 &= -B & 2 &= 2C \\ 3 &= A & -4 &= B & 1 &= C \end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{2s+6}{s(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$y(t) = 3 - 4e^{-t} + e^{-2t}$

Section 5.4

1. $t+1$ 2. e^t 3. $(t+1)e^t$ 4. $(t+1)e^{-t}$ 5. $e^t - t$ 6. $2e^t - e^{2t}$ 7. $3e^{-2t} + 2t - 2$
 8. $2e^{-t} + \sin 3t - 2 \cos 3t$ 9. $\cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{6} t \sin 3t$ 10. $y(t) = 1$ 11. $e^t(2 \cos 2t + \sin 2t)$
 12. $10te^{-5t}$ 13. $3 - 4e^{-t} + e^{-2t}$ 14. $-\frac{1}{2} \sin t + 2 \cos t - \frac{1}{2} t \cos t$ 15. $\frac{3}{4}e^t - \frac{3}{2}te^t + \frac{3}{2}t^2e^t - \frac{3}{4}e^{-t}$
 16. $e^{-2t} + \cos t + 1$ 17. $\cos t$ 23. $Y' + s^2Y = 1$ 24. $c_1 \sin t + c_2 \cos t + 1$
 25. The solution of $y' = ky$ grows faster ($e^t > \cosh kt$).

§5.4 Initial Value Problems

5.4 : 3, 7, 9, 11, 13

5.4.3 $y' - y = e^t, y(0) = 1$

$$\mathcal{L}\{y'\} - \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^t\}$$

$$sY(s) - y(0) - Y(s) = \frac{1}{s-1} \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$(s-1)Y(s) = 1 + \frac{1}{s-1}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\}$$

$$\underline{y(t) = e^t + te^t} \quad \mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

5.4.7 $y'' + 2y' = 4, y(0) = 1, y'(0) = -4$

$$\mathcal{L}\{y'' + 2y'\} = \mathcal{L}\{4\}$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2sY(s) - 2y(0) = 4/s$$

$$s^2 Y - s + 4 + 2sY - 2 = 4/s$$

$$s(s+2)Y = s - 2 + 4/s$$

$$Y = \frac{1}{s+2} - \frac{2}{s(s+2)} + \frac{4}{s^2(s+2)}$$

$$Y = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s} - \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s+2}$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^2} - \frac{2}{s} + \frac{3}{s+2} \longrightarrow \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 2\mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\} - 2\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} + 3\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+2)\}$$

$$\underline{y(t) = 2t - 2 + e^{-2t}} \quad \mathcal{L}^{-1}\{n!/s^{n+1}\} = t^n, \mathcal{L}^{-1}\{1/(s-a)\} = e^{at}$$

For Problems 1-14, use the Laplace transform to solve the given initial-value problem.

1. $y' = 1$	$y(0) = 1$
2. $y' - y = 0$	$y(0) = 1$
3. $y' - y = e^t$	$y(0) = 1$
4. $y' + y = e^{-t}$	$y(0) = 1$
5. $y'' = e^t$	$y(0) = 1, y'(0) = 0$
6. $y'' - 3y' + 2y = 0$	$y(0) = 1, y'(0) = 0$
7. $y'' + 2y' = 4$	$y(0) = 1, y'(0) = -4$
8. $y'' + 9y = 20e^{-t}$	$y(0) = 0, y'(0) = 1$
9. $y'' + 9y = \cos 3t$	$y(0) = 1, y'(0) = -1$
10. $y'' + 4y = 4$	$y(0) = 1, y'(0) = 0$
11. $y'' - 2y' + 5y = 0$	$y(0) = 2, y'(0) = 4$
12. $y'' + 10y' + 25y = 0$	$y(0) = 0, y'(0) = 10$
13. $y'' + 3y' + 2y = 6$	$y(0) = 0, y'(0) = 2$
14. $y'' + y = \sin t$	$y(0) = 2, y'(0) = -1$

5.3.13 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+16}{s^2+4s+13}\right\}$

$$\frac{2s+16}{s^2+4s+13} = \frac{2s+16}{s^2+4s+4+9} = \frac{2s+16}{(s+2)^2+3^2} = \frac{2(s+2)+12}{(s+2)^2+3^2} = 2 \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + 4 \frac{3}{(s+2)^2+3^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+16}{s^2+4s+13}\right\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+a^2}\right\} = \cos at$$

$$= 2 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}\right\} + 4 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+3^2}\right\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{s^2+b^2}\right\} = \sin bt$$

$$= \underline{2e^{-2t} \cos 3t + 4e^{-2t} \sin 3t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-c)\} = e^{ct} f(t)$$

5.3.17 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s^2+1)(s^2+4)}\right\}$

$$3 = (As+B)(s^2+4) + (Cs+D)(s^2+1)$$

$$s=i: 3 = 3Ai + 3B \rightarrow A=0, B=1$$

$$s=2i: 3 = -6Ci - 3D \rightarrow C=0, D=-1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s^2+1)(s^2+4)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1^2}\right\} - \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+2^2}\right\} = \underline{\sin t - \frac{1}{2} \sin 2t}$$

5.3.21 Find $\mathcal{L}^{-1}\{\arctan(1/s)\}$ using the property

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{(-1)^n}{t^n} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^n F(s)}{ds^n}\right\}$$

$$\frac{d}{ds} \arctan(1/s) = \frac{1}{1+(1/s)^2} (-s^{-2}) = -\frac{1}{1+1/s^2} \frac{1}{s^2} = -\frac{1}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{\arctan(1/s)\} = \frac{(-1)^1}{t^1} \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{s^2+1}\right\} = \frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = \underline{\frac{\sin t}{t}}$$

5.3.23 Find $\mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\}$ using the property $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = \int_0^t f(\tau) d\tau$.

$$\begin{aligned} 1/s^2 &= \frac{1/s}{s} = \frac{F(s)}{s}, \quad F(s) = 1/s \\ f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = 1 \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \underline{\mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\} = \int_0^t 1 d\tau = t}$$

§5.3 The Inverse Laplace Transform

5.3: 5, 7, 11, 13, 17, 21, 23

5.3.5 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+3s}\right\}$

$$\frac{1}{s(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+3} \rightarrow 1 = A(s+3) + Bs$$

$$s=0 : 1=3A \rightarrow A=1/3$$

$$s=-3 : 1=-3B \rightarrow B=-1/3$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+3s}\right\} = \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-3t}$$

5.3.7 $\mathcal{L}^{-1}\{(s^2+4s+4)^{-1}\}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s+4}\right\}$$

$$s^2+4s+4 = (s+2)^2$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2}\right\}$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2} = \frac{1!}{s^{1+1}}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\{F(s-(-2))\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-c)\} = e^{ct}f(t)$$

$$= e^{-2t}f(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$

$$= \underline{te^{-2t}}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}$$

5.3.11 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+4}{s^2-1}\right\}$

$$\frac{2s+4}{s^2-1} = 2\frac{s}{s^2-1} + 4\frac{1}{s^2-1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+4}{s^2-1}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-1^2}\right\} + 4\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-1^2}\right\}$$

$$= 2\cosh t + 4\sinh t$$

$$= e^t + e^{-t} + 2e^t - 2e^{-t}$$

$$= \underline{3e^t - e^{-t}}$$

1. $\frac{1}{s^3}$
2. $\frac{2}{s} + \frac{3}{s-1} + \frac{7}{s^3}$

3. $\frac{5}{s^2+3}$
4. $\frac{3}{s-3} + \frac{4}{s+3}$

5. $\frac{1}{s^2+3s}$
6. $\frac{s+1}{s^2+2s+10}$

7. $\frac{1}{s^2+4s+4}$
8. $\frac{3s+5}{s^2-6s+25}$

9. $\frac{s+1}{s^2+s-2}$

10. $\frac{5}{s^2+s-6}$

11. $\frac{2s+4}{s^2-1}$

12. $\frac{7}{(s+2)^2+3}$

13. $\frac{2s+16}{s^2+4s+13}$

14. $\frac{6}{(s+2)^4}$

15. $\frac{7s^2+23s+30}{(s-2)(s^2+2s+5)}$

16. $\frac{4}{s^2(s^2+4)}$

17. $\frac{3}{(s^2+1)(s^2+4)}$

18. $\frac{7s-1}{(s+1)(s+2)(s-3)}$

19. $\frac{s^2-2}{s^3+8s^2+7s}$

20. $\frac{s^2+9s+2}{(s-1)^2(s+3)}$

The Inverse of Derivatives

For Problems 21–22, use Property 3 from Table 5.4 to find the given inverse Laplace transforms.

21. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\tan^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)\right\}$

22. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s-a}{s-b}\right)\right\}$

Division by s Equals Integration in t

For Problems 23–26, use Property 4 from Table 5.4 to find the inverse transform of the given function.

23. $F(s) = \frac{1}{s^2}$

25. $F(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$

Section 5.3

1. $\frac{1}{2}t^2$ 2. $2+3e^t+\frac{7}{2}t^2$ 3. $\frac{5}{\sqrt{3}}\sin\sqrt{3}t$ 4. $3e^{2t}+4e^{-3t}$ 5. $\frac{1}{3}-\frac{1}{3}e^{-3t}$ 6. $e^{-t}\cos 3t$ 7. te^{-2t}
8. $e^{3t}\left(3\cos 4t+\frac{7}{2}\sin 4t\right)$ 9. $\frac{1}{3}e^{-2t}+\frac{2}{3}e^t$ 10. $e^{2t}-e^{-3t}$ 11. $3e^t-e^{-t}$ 12. $\frac{7}{\sqrt{3}}e^{-2t}\sin 3t$
13. $2e^{-2t}\cos 3t+4e^{-2t}\sin 3t$ 14. t^3e^{-2t} 15. $8e^{2t}-e^{-t}\cos 2t+3e^{-t}\sin 2t$ 16. $t-\frac{1}{2}\sin 2t$
17. $\sin t-\frac{1}{2}\sin 2t$ 18. $2e^{-t}-3e^{-2t}+e^{3t}$ 19. $-\frac{2}{7}+\frac{1}{6}e^{-t}+\frac{47}{42}e^{-7t}$ 20. $2e^t+3te^t-e^{-3t}$ 21. $\frac{\sin t}{t}$
22. $\frac{e^{4t}-e^{6t}}{t}$ 23. t 24. e^t-1 25. $1-\cos t$ 26. $(t-1)e^t+1$ 30. $5e^{-t}-18e^{-2t}+15e^{-3t}$
31. (b) $\frac{3}{s-2}-\frac{2}{s+1}$