Require: natural-language input $x \in \mathcal{X}$, formalism Σ, budget K

$y^{\text{orig}} \leftarrow T_1(x); \quad x' \leftarrow T_2(y^{\text{orig}}); \quad y^{\text{rt}} \leftarrow T_3(x')$
for $k = 1$ to K **do**
  if $y^{\text{orig}} \equiv_\Sigma y^{\text{rt}}$ **then**
    return SUCCESS, $(y^{\text{orig}}, x', y^{\text{rt}})$
  $(i, e) \leftarrow D(x, y^{\text{orig}}, x', y^{\text{rt}})$ {first failed stage, explanation}
  if $i = 1$ **then**
    $y^{\text{orig}} \leftarrow R_1(x, y^{\text{orig}}, e); \quad x' \leftarrow T_2(y^{\text{orig}}); \quad y^{\text{rt}} \leftarrow T_3(x')$
  else if $i = 2$ **then**
    $x' \leftarrow R_2(y^{\text{orig}}, x', e); \quad y^{\text{rt}} \leftarrow T_3(x')$
  else
    $y^{\text{rt}} \leftarrow R_3(x', y^{\text{rt}}, e)$
return FAILURE, $(y^{\text{orig}}, x', y^{\text{rt}})$