

ÉCOLE DOCTORALE ÉNERGIE, MATÉRIAUX, SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS

Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace

THÈSE présentée par : Benoît D'ANGELO

soutenue le : [XX mois en lettres 2015]

pour obtenir le grade de : **Docteur de l'université d'Orléans**

Discipline : Sciences de la Terre et de l'Univers

[Titre de la thèse]

[Sous titre éventuel]

THÈSE dirigée par :

Christophe GUIMBAUD Co-directeur de recherche, LPC2E, Orléans
Fatima LAGGOUN Co-directeur de recherche, ISTIT, Orléans

RAPPORTEURS :

Prénom Nom Titre, établissement
Prénom Nom Titre, établissement

JURY:

Table des matières

Table des matières	iii
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	ix
Remerciements	xi
Introduction	1
1 Synthèse Bibliographique	7
1.1 Les tourbières et le cycle du carbone	8
1.1.1 Zones humides et tourbières : définitions et terminologies	8
1.1.2 Tourbières et fonctions environnementales	12
1.1.3 Les tourbières et les changements globaux	14
1.2 Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants	16
1.2.1 GES et Tourbières	16
1.2.2 Les flux entre l'atmosphère et les tourbières	19
1.2.3 Les facteurs majeurs contrôlant les flux	22
1.2.4 Bilans de carbone	27
2 Sites d'études et méthodologies employées	31
2.1 Présentation de la tourbière de La Guette	32
2.2 Autres sites du service national d'observation	37
2.3 Mesures de flux	38
2.3.1 Présentation des méthodologies possibles	38
2.3.2 Les mesures de CO ₂	39
2.3.3 Les mesures de CH ₄	42
2.3.4 Le calcul des flux	43
2.4 Facteurs contrôlants	43
2.4.1 acquisitions automatisées	43
3 Bilan de C de la tourbière de La Guette	45
3.1 Introduction	46
3.2 Procédure expérimentale et analytique	47
3.2.1 Méthodes de mesures	47
3.2.2 Modélisation du bilan de C	49
3.3 Résultats	52
3.3.1 Cinétique des facteurs contrôlant et des flux sur la tourbière de La Guette	52
3.3.2 Sélection des modèles	59

3.3.3	Le bilan de carbone de la tourbière de La Guette à l'échelle de l'écosystème	66
3.3.4	Variabilité spatiale du bilan	72
3.4	Discussion	75
3.4.1	Estimations des flux	75
3.4.2	Estimations des bilans	78
3.4.3	Sensibilité et limitations du bilan	78
3.4.4	Représentativité locale du modèle	79
3.4.5	Variation du bilan avec la végétation	80
3.4.6	perspectives	80
4	Effets de l'hydrologie sur les flux de GES	81
4.1	Introduction	82
4.2	Procédure expérimentale	83
4.2.1	Expérimentation A	84
4.2.2	Expérimentation B	84
4.2.3	traitement	85
4.3	Résultats	86
4.3.1	Expérimentation A	86
4.3.2	Expérimentation B	89
4.3.3	tendances générales	92
4.4	Discussion	92
4.4.1	Comparaison aux mesures <i>in-situ</i>	92
4.4.2	Effet des variations du niveau de la nappe sur les flux de gaz	94
4.4.3	Effet cycles multiples	95
5	Variation journalière de la respiration de l'écosystème (article)	97
5.1	Introduction	99
5.2	Procédure expérimentale et analytique	101
5.2.1	Sites étudiés	101
5.2.2	Acquisition des données	101
5.2.3	Synchronisation des données	102
5.2.4	Sensibilité de RE à la température	102
5.2.5	Différence entre mesures de jour et mesures de nuit	103
5.2.6	Caractérisation physico-chimique	104
5.3	Résultats	104
5.3.1	Température de l'air et variabilité de RE	104
5.3.2	Synchronisation RE et température du sol	105
5.3.3	Équations utilisées	107
5.3.4	Relation entre RE et la température	108
5.3.5	Évolution du Q10	109
5.3.6	Différence entre mesures de jour et de nuit	112
5.3.7	Caractérisation de la tourbe	112
5.4	Discussion	112
5.4.1	Différence de RE entre les différents sites	112
5.4.2	Temps de latence entre température et RE	115
5.4.3	La synchronisation entre RE et la température améliore la représentation de la sensibilité de RE à la température	116

5.4.4	Différence entre mesure de RE faite le jour et la nuit	116
5.4.5	La sensibilité du Q10 à la profondeur de la température et à la synchronisation	117
5.5	Conclusions	117
Conclusions et perspectives		119
5.6	Bilan du bilan (de C) ?	120
5.7	Résilience de la tourbe par rapport aux 2 années sèches qui précèdent le BdC	120
5.8	Ouverture vers d'autre méthodes de mesures	120
Références bibliographiques		130
Index		131
Annexes		133
A	Photos supplémentaires	134
B	protocole végétation	134
C	CARBODIV	137
D	package m70r	137

Liste des figures

1.1	Micro-topographie dans les tourbières. Modifié d'après Rydin et Jeglum (2013a)	11
1.2	Global distribution of peatlands	12
1.3	Nombre de tourbières nouvellement formées pendant l'holocène. Modifié d'après (MacDonald <i>et al.</i> , 2006)	17
1.4	Projection des changements à l'horizon 2100, des moyennes et extrêmes annuels (sur terre) des températures de l'air et des précipitations : (a) température de surface moyenne par °C de changement global moyen, (b) 90 ^e percentile des températures journalières maximum par °C de changement de température moyenne maximale, (c) précipitations moyenne (en % par °C de changement de température moyenne) et (d) fraction de jours ayant des précipitations dépassant le 95 ^e percentile. Sources : (a) et (c) simulations CMIP5, scénario RCP4.5, (b) et (d) adaptation d'après Orlowsky et Seneviratne (2012)(IPCC2013).	18
1.5	Décroissance de la proportion de CO ₂ de l'atmosphère suite à une émission idéalisée de 100 PgC. les graphes (a) et (b) est une moyenne de modèles (Joos <i>et al.</i> , 2013), le graphe (c) est une moyenne d'autres modèles (Archer <i>et al.</i> , 2009). Modifié d'après (Ciais <i>et al.</i> , 2014).	19
1.6	schéma des flux de carbone entre une tourbière et l'atmosphère	20
1.7	Productivités moyennes des espèces de sphagnes en g m ⁻² an ⁻¹ . Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard. Le nombre d'observation est indiqué par les nombres à l'intérieur des barres. Les espèces en orange sont celles rencontrées sur le site d'étude. modifié d'après Gunnarsson (2005)	24
2.1	Site d'études SNO	32
2.2	Carte de la tourbière de La Guette	33
2.3	Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure.	35
2.4	Évolution du niveau de la pluviométrie, en mm, des années 2011 à 2014	36
2.5	Évolution du niveau de la nappe, en cm par rapport à la surface, des années 2011 à 2014	36
2.6	Évolution de la température de l'air (en °C) des années 2011 à 2014	37
2.7	Mesures de CO ₂	40
2.8	SPIRIT	41
3.1	Répartition des 20 placettes de mesures suivant un échantillonnage aléatoire stratifié.	47
3.2	Partitionnement des placettes en fonction de leur similarité en termes de composition végétale (pourcentage des strates muscinales, herbacées et arbustives)	52

3.3	Évolution du niveau de la nappe moyen des 20 embases mesuré pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)	53
3.4	Évolution des températures de l'air (Tair) et du sol à -5, -30, -50 et -100 cm (T5, T30, T50 et T100 respectivement) moyenne mesurée lors des campagnes de terrain de mars 2013 à février 2015	54
3.5	Évolution de la conductivité pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)	54
3.6	Évolution du pH pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)	55
3.7	Évolution de la concentration en carbone organique dissous dans l'eau du sol pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)	55
3.8	Évolution du niveau de PPB, RE et ENE pendant la période de mesure. Moyenne des 20 embases de mars 2013 à février 2015.	56
3.9	Évolution des flux de méthane moyen (N ?) pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)	58
3.10	Relations entre les flux de gaz et une sélection de facteurs contrôlant	58
3.11	PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.1	60
3.12	PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.3	62
3.13	RE modèles avec Tair	64
3.14	RE modèles avec Tair	65
3.15	CH ₄ modèle H	66
3.16	Flux de CO ₂ interpolé à partir de PPB-1 et PPB-2	68
3.17	Flux de CO ₂ interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3	69
3.18	Flux de CO ₂ interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3	69
3.19	Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres des modèles RE-1 et RE-3	73
3.20	Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2	74
3.21	Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2	74
4.1	Prélèvement des mésocosmes	85
4.2	Schéma d'un mésocosme	86
4.3	Expérimentation A : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux, CH ₄ , RE, PPB, ENE en $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$, B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent à la phase de dessiccation (D) en rouge et à la phase de réhumectation (R) en bleu.	87
4.4	Expérimentation B : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux, CH ₄ , RE, PPB, ENE en $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$, B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent aux phases de dessiccation (D) en rouge et aux phases de réhumectation (R) en bleu.	90
4.5	Relations entre les flux de GES et le niveau de la nappe	93
5.1	Ecosystem Respiration (ER), air and peat temperature, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT).	106
5.2	Time delay between temperature at different depths and ER, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT)	107

5.3	Profile of R ² and NRMSE, (RMSE, normalized by the mean), with depth, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT) using the exponential model.	110
5.4	Profile of Q ₁₀ with depth for synchronised (white) and non synchronised (black) data and exponential model in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT).	111
5.5	Differences between daytime and nighttime measurements using 3 models : non-synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – NS), synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – S), and non-synchronised data at air temperature (Tair).	113
6	Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure.	134
7	Calibration de la biomasse en fonction de la hauteur	135
8	Scanne des feuilles	135
9	Calibration de la biomasse herbacées pour <i>molinia Caerulea</i> (a), pour <i>eriophorum</i> (b) et de la surface de feuille pour <i>molinia Caerulea</i> (c), pour <i>eriophorum</i> (d) en fonction de la hauteur	136

Liste des tableaux

1.1	Estimations des stocks de C pour différents environnements	13
1.2	Surface de tourbe utilisée selon les usages considérés (tourbières non-tropicale). Modifié d'après Joosten et Clarke (2002).	15
1.3	Vitesse apparente d'accumulation du carbon à long terme en $\text{gC m}^{-2} \text{s}^{-1}$	28
3.1	Valeur des paramètres des équations utilisées pour modéliser les flux et sensibilité relative (en %) des flux en réponse à une variation de $\pm 10\%$ de chacun des paramètres des modèles.	67
3.2	Bilan des flux en gCm2an1	70
3.3	Bilan des flux en gCm2an1	71
3.4	Sensibilité relative (en %) du bilan de CO ₂ (ENE) en réponse à une variation de $\pm 10\%$ de chacun des paramètres des modèles.	71
3.5	Bilan des flux de CO ₂ en gCm2an1, en utilisant PPB-2 et RE-3	75
4.1	Récapitulatif des mesures pour les deux expérimentations	85
5.1	R ² and NRMSE profile with depth for models using non-synchronised and synchronised data and for the three equations (linear : lin, exponential : exp, arrhenius : arr).	108
5.2	Peat chemical properties as a function of depth in cm : content (%) N, C, H, S, the total, retention and effective porosity, Φ_T , Φ_R , Φ_E respectively in $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$, solid peat volumic fraction in $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$ and the bulk density (Bd) in g.cm^{-3}	114

Remerciements

Fatima, Christophe, Sébastien Franck, Fabien Marielle Emélie, Étienne, Zi, Tianyi, Sarah, Paul, Xiaole, Guillaume Frédéric Stéphane Gilles Catherine, Catherine, Marie-Noëlle, Olivier

¹ Introduction

² Contexte général

³ En 1957, Charles David Keeling, scientifique américain, met au point et utilise
⁴ pour la première fois, un analyseur de gaz infra-rouge pour mesurer la concentration
⁵ de CO₂ de l'atmosphère sur l'île d'Hawaii, à Mauna Loa. La précision et la fréquence
⁶ importante de ses mesures lui permirent de voir pour la première fois les variations
⁷ journalière et saisonnière des concentrations en CO₂ atmosphérique, mais également à
⁸ plus long terme leur tendance haussière [Harris \(2010\)](#). Le CO₂ est un gaz à effet de serre
⁹ (GES) et son accumulation dans l'atmosphère... **force ? comparaison ? explication**
¹⁰ **effet de serre ?** Ce constat a probablement joué un rôle considérable dans la prise de
¹¹ conscience, par la communauté scientifique, de l'importance et de l'intérêt de l'étude du
¹² changement climatique et plus largement des changements globaux. Car si à l'époque
¹³ les concentration en CO₂ était inférieure à 320 ppm (partie par millions) elles ont
¹⁴ dépassées, au printemps 2014, la barre symbolique des 400 ppm selon un communiqué
¹⁵ de l'Organisation Météorologique Mondiale. Les concentrations pré-industrielles (avant
¹⁶ 1800) sont quand à elles généralement estimée à 280 ppm [Siegenthaler et Oeschger](#)
¹⁷ ([1987](#)).

¹⁸ Aujourd'hui, que ce soit pour le comprendre, le caractériser ou bien le prédire,
¹⁹ de nombreux **Combien ? cf fact sheet IPCC** scientifiques dans un grand nombre
²⁰ de disciplines, travaillent directement ou indirectement sur les changements globaux.
²¹ Ils sont nombreux également à collaborer au sein du Groupe d'experts Intergouver-
²² nemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), qui rassemble, évalue et synthétise les
²³ connaissances internationales liée au sujet.

²⁴ De manière générale, parmi les flux de C mesurés entre la biosphère et l'atmosphère,
²⁵ la respiration et la photosynthèse sont les plus important, 98 et 123 PgC/yr pour le flux
²⁶ de respiration globale (+ les feux) et la photosynthèse respectivement [Bond-Lamberty](#)
²⁷ et [Thomson \(2010\)](#); [Beer et al. \(2010\)](#). Pour comparaison les flux liés à la production
²⁸ de ciment et aux ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz) représentent 7.8 PgC/yr

29 Ciais *et al.* (2014).

30 Étroitement lié aux changements globaux, le cycle du carbone est particulièrement étudié, quels sont les réservoirs, quels sont les flux et comment vont-ils évoluer ?

32 **schéma ?**

33 Zones humides tourbières

34 historique des tourbières, généralités sur l'histoire des tourbières vis à vis des
35 hommes Sujets principaux qui ont menés à l'étude des tourbières jusqu'à nos jours
36 (Exploitation, effet de serre)

37 Pourquoi étudier les tourbières aujourd'hui ?

38 L'étude des tourbières se poursuit car, en plus de rendre de nombreux services éco-
39 logiques (épuration du sol, régulation des flux hydriques, biodiversité), elles constituent
40 un stock de carbone relativement important au regard de la surface qu'elle occupent.

41 Ainsi il est généralement admis que les tourbières contiennent un quart à un tiers
42 du carbone présent Chiffres (**surfaces...**) dans l'ensemble des terres émergées tandis
43 qu'elle ne constituent que 3 % des surfaces continentales (**Réf needed**). Ce ratio rela-
44 tivement important, correspond à un stock d'environ 455 Gt Gorham (1991); Turunen
45 *et al.* (2002) est à mettre perspective avec les autres stock du cycle du carbone. On
46 observe que ce stock est du même ordre de grandeur que celui de la végétation

47 En conséquence dans un contexte **d'augmentation des GES dans l'atm et de
48 réchauffement**, l'évolution de ce stock, sa pérennité ou sa remobilisation est un sujet
49 d'étude important. De plus cette importance n'est à ce jour pas prise en compte de
50 façon spécifique dans les modèles climatiques globaux.

51 En France les tourbières s'étendent sur environ 60 000 Ha ((**Réf needed**)).

52 Transition modèles

53 En octobre 2013 le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
54 (GIEC) a publié le rapport du groupe de travail I qui travaille sur les aspects scientifique
55 physique du système et du changement climatique. S'il note que les connaissances ont
56 avancées, il note également que de nombreux processus ayant trait à la décomposition
57 du carbone sont toujours absents des modèles notamment en ce qui concerne le carbone

58 des zones humides boréales et tropicales et des tourbières. (Réf needed)

59 Objectif de la thèse et approche mise en oeuvre

60 L'objectif de ces travaux est donc de mieux comprendre la dynamique du carbone
61 au sein des tourbières. Tout d'abord en caractérisant la variabilité spatiale et temporelle
62 des flux de carbone à travers l'établissement de bilan de carbone. De déterminer quels
63 facteurs environnementaux contrôlent le fonctionnement comme puits ou source de
64 carbone de ces écosystèmes. Enfin construire, dans un esprit de synthèse et d'ouverture
65 et à l'aide des connaissances acquise, un modèle intégrateur permettant un lien avec
66 les modèles globaux et notamment ORCHIDE, afin que ces écosystèmes puissent être
67 pris en compte à cette échelle.

68 Pour atteindre ces objectifs, nos travaux ont été articulés autour de trois volets
69 **volet... t'as pas mieux ? Branche ? -_-**" principaux : Dans un premier temps,
70 l'**observation** régulière des flux de gaz (CO_2 et CH_4) ainsi que d'un certain nombre de
71 paramètres environnementaux servant à la caractérisation des variabilités spatiales et
72 temporelles, ainsi qu'à l'étude des facteurs contrôlant. Certains facteurs contrôlant qui
73 sont, dans un second temps, étudiés plus spécifiquement à travers un volet **expérimenta-**
74 **tion**. Ce dernier doit permettre une meilleure compréhension de processus clé avec
75 notamment l'impact de l'hydrologie. Enfin un troisième volet axé sur la **modélisation**,
76 avec le développement d'un modèle le plus mécaniste possible.

77 Cette thèse est structurée de la façon suivante : Le chapitre 1 est une synthèse
78 bibliographique, un état de l'art des connaissances liées au sujet. Les chapitres 2 et
79 3 rassemblent les travaux du volet observation, ils concernent respectivement le suivi
80 XX et le suivi YY Les chapitres 4 et 5 développent la partie expérimentale à travers
81 l'impact d'un assèchement et celui d'un rehaussement du niveau de l'eau. Le chapitre 6
82 concerne plus spécifiquement la modélisation, même si ce volet interviendra par ailleurs
83 de façon transverse dans les autres chapitres. Enfin une conclusions et des perspectives

⁸⁴ seront exposées.

⁸⁵ 1 Synthèse Bibliographique

⁸⁶

⁸⁷	1.1 Les tourbières et le cycle du carbone	8
⁸⁸	1.1.1 Zones humides et tourbières : définitions et terminologies	8
⁸⁹	1.1.2 Tourbières et fonctions environnementales	12
⁹⁰	1.1.3 Les tourbières et les changements globaux	14
⁹¹	1.2 Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants	16
⁹²	1.2.1 GES et Tourbières	16
⁹³	1.2.2 Les flux entre l'atmosphère et les tourbières	19
⁹⁴	1.2.3 Les facteurs majeurs contrôlant les flux	22
⁹⁵	1.2.4 Bilans de carbone	27
⁹⁶		
⁹⁷		
⁹⁸		

1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

⁹⁹ Dans ce chapitre, nous commenceront par donner une vue de ce que sont les tour-

¹⁰⁰ bières : Que sont-elles ? Depuis quand sont-elles étudiées ? Pourquoi les a-t-on étudiés ?

¹⁰¹ Nous continuerons en entrant plus en détails sur leur fonctionnement vis à vis des flux

¹⁰² de carbone. Enfin nous verrons quels sont les facteurs contrôlant majeurs de ces flux.

¹⁰³ 1.1 Les tourbières et le cycle du carbone

¹⁰⁴ 1.1.1 Zones humides et tourbières : définitions et terminologies

¹⁰⁵ Définitions

¹⁰⁶ Les tourbières font partie d'un ensemble d'écosystèmes plus large que l'on appelle

¹⁰⁷ les zones humides. Ces zones humides ne sont ni des écosystèmes terrestres au sens

¹⁰⁸ strict, ni des écosystèmes aquatiques. Elles sont à la frontière entre les deux et sont

¹⁰⁹ caractérisées par un niveau de nappe élevé, proche de la surface du sol, voire au dessus.

¹¹⁰ L'omniprésence de l'eau joue fortement sur l'aération du milieu et constraint, de façon

¹¹¹ plus ou moins importante, l'accès à l'oxygène. Elles ont été définie en 1971, lors de la

¹¹² convention dite de RAMSAR¹ de la façon suivante :

ZONES HUMIDES :

«les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes², de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.»

(Ramsar, 1987)

¹¹⁴ Les zones humides regroupent donc des écosystèmes très variés parmi lesquels les

¹¹⁵ marais, les mangroves, les plaines d'inondations et les tourbières. Leurs particularités :

1. La convention de RAMSAR est un traité international visant à la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides.

2. Marais tourbeux situé sur une hauteur

¹¹⁶ niveau de nappe élevé et zone anaérobie importante, entraînent le développement d'une
¹¹⁷ végétation spécifique, qui s'est adaptée aux milieux fortement humides ou inondés.

¹¹⁸ Les tourbières représentent 50 à 70 % des zones humides [Joosten et Clarke \(2002\)](#).

¹¹⁹ Leur définition est variable selon les régions ((**Réf needed**), exple). Deux définitions
¹²⁰ sont régulièrement utilisées :

TOURBIÈRE :

¹²¹ Écosystèmes, avec ou sans végétation, possédant au moins 30 cm de tourbe
naturellement accumulée.

Définition traduite d'après [Joosten et Clarke \(2002\)](#)

¹²² Cette première définition correspond au *peatland* anglo-saxon. L'épaisseur de tourbe
¹²³ accolée à cette définition peut varier selon le pays, elle est par exemple établie à 40 cm
¹²⁴ au Canada ([National Wetlands Working Group, 1997](#))

TOURBIÈRE ACTIVE :

¹²⁵ Écosystèmes dans lesquels un processus de tourbification est actif.

Définition traduite d'après [Joosten et Clarke \(2002\)](#)

¹²⁶ Cette seconde définition correspond au *mire* anglo-saxon et peut être traduite en fran-
¹²⁷ çais par le terme de tourbière active. Les concepts derrières ces deux définitions se
¹²⁸ chevauchent mais ne sont pas complètement similaires : une tourbière drainée peut
¹²⁹ avoir plus de 30 cm de tourbe et ne plus former de tourbe, ne plus être active. À l'in-
¹³⁰ verse il peut exister des zones où l'épaisseur de tourbe est inférieure à 30 cm malgré
¹³¹ un processus de tourbification actif. Un même écosystème tourbeux pouvant d'ailleurs
¹³² avoir à la fois des zones correspondant à la première définition et d'autres à la seconde.
¹³³ Les tourbières sont donc, selon la définition utilisée, des écosystèmes contenant ou des
¹³⁴ écosystèmes formant de la tourbe. Mais qu'est ce que la tourbe ?

TOURBE :

¹³⁵ «Accumulation sédentaire de matériel composé d'au moins 30 % (matière
sèche), de matières organiques mortes.»

Définition traduite d'après [Joosten et Clarke \(2002\)](#)

1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

136 Le seuil de 30 %, souvent utilisé pour rapprocher sa définition de celle d'un sol organique (histosol) au sens large, dans lesquels sont classés la majorité des sols tourbeux.
137 D'autres définitions existent, faisant la distinction entre sols organiques et tourbes avec
138 un seuil à 75 % (Andrejko *et al.*, 1983) ou 80 % (Landva *et al.*, 1983). Il est également
139 nécessaire de préciser que, au delà de la classification utilisée, ce que les écologues
140 considèrent comme de la tourbe contient généralement 80 % de matières organiques au
141 minimum (Rydin et Jeglum, 2013b). Ce processus de formation est appelé la tourbifica-
142 tion ou turfogénèse et les matières organiques accumulées proviennent majoritairement
143 de la végétation. On définit les matières organiques de la façon suivante :
144

MATIÈRES ORGANIQUES :

145 Matières constituées d'un assemblage de composés ayant une ou plusieurs liaisons C–H. Elles sont composées de nombreux éléments dont des carbohydrates (sucres, cellulose ...), des composés azotés (protéines, acides aminés ...) et phénoliques (lignine ...), des lipides (cires, résines, ...) et d'autres³.

146 Ces variations de définitions ajoutées aux limites floues qui peuvent exister entre
147 certains écosystèmes tourbeux et non-tourbeux rendent la cartographie de ces écosys-
148 tèmes délicate. Les estimations généralement citées évaluent la surface occupée par
149 les tourbières à environ 4 000 000 km² (Lappalainen, 1996). Cette surface correspond
150 à 2 à 3 % de l'ensemble des terres émergées du globe. Plus de 85 % d'entre elles sont
151 situées dans l'hémisphère nord, majoritairement dans les zones boréales et sub-boréales
152 (Strack, 2008) (Figure 1.2). Ce sont sur ces écosystèmes que sera focalisé ce travail, lais-
153 sant de côté les tourbières tropicales dont le fonctionnement est distinct et spécifique
154 (**Réf needed**).

3. Cette définition, utile pour définir simplement les matières organiques, est cependant limitée car elle inclut des composés traditionnellement considérés comme minéraux (le graphite) et exclut certains autres considérés comme organiques (acide oxalique) (Liste de diffusion ResMO).




FIGURE 1.1 – Micro-topographie dans les tourbières. Modifié d'après [Rydin et Jeglum \(2013a\)](#)

¹⁵⁵ La formation des tourbières

¹⁵⁶ L'atterrissement et la paludification sont les deux processus principaux permettant
¹⁵⁷ la formation des tourbières. Il s'agit pour le premier du comblement progressif d'une
¹⁵⁸ zone d'eau stagnante. La paludification est la formation de tourbe directement sur un
¹⁵⁹ sol minéral, grâce à des conditions d'humidité importante. Ces modes de formation ne
¹⁶⁰ sont pas exclusif, une tourbière pouvant se développer, selon les endroits considérés ou
¹⁶¹ le temps, via des processus différents.

¹⁶² Classifications

¹⁶³ Différentes classifications sont utilisées pour différencier ces écosystèmes. La plus
¹⁶⁴ générale et la plus utilisée dans la littérature distingue les tourbières dite haute, ou de
¹⁶⁵ haut marais, correspondant au *bog* anglais, et les tourbières basse, ou de bas marais,
¹⁶⁶ correspondant au *fen* anglais.

¹⁶⁷ Les tourbières de haut-marais ont généralement une épaisseur de tourbe supérieure
¹⁶⁸ à 30 cm et sont alimenté principalement alimentée par les précipitations : elles sont
¹⁶⁹ dites ombrotrophes. Leur surface parfois bombée (tourbières élevées ou bombées) peut

1.1. Les tourbières et le cycle du carbone




FIGURE 1.2 – Global distribution of peatlands

170 également être plate ou en pente. Cette géométrie situe une partie au moins de l'éco-
171 système au dessus du niveau de la nappe. Elles ont une concentration en nutriments
172 relativement faible : elles sont oligotrophes et sont fortement acide avec des eaux de
173 surface dont le pH est autour de 4 voire moins.

174 Les tourbière de bas-marais ont une épaisseur généralement supérieure à 30 cm avec
175 un niveau de nappe très proche de la surface du sol. De forme concave ou en pente elles
176 sont généralement alimentée en eaux par des sources ou par ruissellement et sont donc
177 dites minerotrophes. Le pH de leur eaux de surface varient de 4 à 8. Les végétations
178 dominantes de ces écosystèmes peuvent être des bryophytes, des graminées ou des
179 arbustes bas.

180 1.1.2 Tourbières et fonctions environnementales

181 Biodiversité dans les tourbières

182 Les tourbières sont le siège d'une biodiversité importante et spécifique. Ainsi les
183 Sphaignes, qui sont des bryophytes, (des mousses) sont caractéristiques des écosystèmes
184 tourbeux. Ce sont des espèces dites ingénierues, capable de modifier l'environnement

Tableau 1.1 – Estimations des stocks de C pour différents environnements

Compartiment	Stock (en Gt de C)	référence
Tourbières	270 – 455	Gorham (1991); Turunen <i>et al.</i> (2002)
Végétation	450 – 650	Robert et Saugier (2003)
Sols	1500 – 2000	Robert et Saugier (2003); Post <i>et al.</i> (1982); Eswaran <i>et al.</i> (1993)
CO ₂ atmosphérique	750 – 800	Robert et Saugier (2003)
Permafrost	1700	

¹⁸⁵ dans lequel elles vivent afin de l'adapter à leurs besoins. Les sphaignes sont ainsi capable
¹⁸⁶ d'abaisser le pH, de capter des nutriments et de les séquestrer et ce même quand
¹⁸⁷ elles n'en ont pas besoin afin d'empêcher d'autres espèces notamment vasculaire d'en
¹⁸⁸ profiter. Plus précisément, le fait que les sphaignes captent les nutriments via leur
¹⁸⁹ capitulum leur permet de les intercepter avant qu'ils ne soient captés par d'éventuelles
¹⁹⁰ racines positionnées plus bas. Les sphaignes, comme de nombreuse mousses ont des
¹⁹¹ litières relativement récalcitrantes⁴.

¹⁹² Qualité des eaux

¹⁹³ Puits de carbone

¹⁹⁴ Par définition les tourbières stockent ou ont stocké du carbone. C'est cette fonction
¹⁹⁵ de puits de carbone qui rend l'importance de ces écosystèmes non négligeable malgré
¹⁹⁶ la faible surface qu'ils représentent. Les estimations du stock de carbone présent dans
¹⁹⁷ les tourbières tempérées/boréales sont comprises entre 270 et 455 Gt C (Gorham, 1991;
¹⁹⁸ Turunen *et al.*, 2002). Les différences entre les estimations sont liées aux incertitudes
¹⁹⁹ de cartographie citées précédemment auxquelles s'ajoutent des incertitudes concernant
²⁰⁰ l'épaisseur et la densité moyenne de la tourbe. Le carbone stocké dans les tourbières
²⁰¹ représente 10 à 25 % du carbone présent dans les sols et entre 30 et 60 % du stock de
²⁰² carbone atmosphérique.

²⁰³ Ce stock est un héritage datant des 10 derniers milliers d'années, l'holocène, période
²⁰⁴ pendant laquelle se sont formés la majorité des tourbières (**Réf needed**) (Yu *et al.*,

4. il est d'usage de parler de litières récalcitrantes sans plus de précision. Il s'agit en fait de litières difficilement dégradables

1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

205 2010). Le fonctionnement naturel de ces écosystèmes permet le stockage du C. C'est un
206 des services écologiques que rendent les tourbières et que l'on appelle la fonction puits
207 de carbone. Cette fonction est liée au niveau élevé de la nappe d'eau, qui rend l'accès à
208 l'oxygène est plus difficile diminuant d'autant l'activité aérobie, dont la respiration des
209 micro-organismes et des plantes. Cela se traduit par une dégradation relativement faible
210 des matières organiques. Elle est également liée à la production de litière récalcitrante
211 par les bryophytes.

212 En comparaison avec un sol forestier, l'accumulation de matières organiques n'est
213 donc pas lié à une production primaire plus forte, mais bien à une dégradation des
214 matières produites plus faible.

215 Ces perturbations peuvent induire des modifications de fonctionnement, notamment
216 l'envahissement de ces écosystèmes par une végétation vasculaire, et changer cette
217 fonction puits.

218 1.1.3 Les tourbières et les changements globaux

219 On définit les changements globaux comme l'ensemble des modifications environne-
220 mentales plus ou moins rapide, ayant lieu à l'échelle mondiale, quelle que soit leur ori-
221 gine. Les deux contraintes développées dans cette partie sont la pressions de l'homme :
222 contrainte anthropique, et celle du climat : contrainte climatique.

223 Contrainte anthropique

224 L'interaction entre les Hommes et les zones humides au sens large et les tourbières
225 en particulier remonte probablement à l'aube de l'humanité. De grandes découvertes
226 archéologiques ont été faites dans ces écosystèmes témoins d'époques révolues. Des
227 chemins de rondins néolithique aux crannogs de l'époque romaine (Buckland, 1993).
228 L'utilisation de la tourbe et des tourbières a du commencer relativement tôt, mais c'est
229 à partir du 17^e siècle que le drainage de ces écosystèmes, pour les convertir en terres
230 agricoles, s'est intensifié. Au 19^e siècle, l'apparition de machines permettant une ré-
231 colte industrialisée de la tourbe, a développé son utilisation comme combustible. Enfin

Tableau 1.2 – Surface de tourbe utilisée selon les usages considérés (tourbières non-tropicale). Modifié d'après [Joosten et Clarke \(2002\)](#).

Utilisation	Surface (km ²)	proportion (%)
Agriculture	250 000	50
Sylviculture	150 000	30
Extraction de tourbe	50 000	10
Urbanisation	20 000	5
Submersion	15 000	3
Pertes indirectes (érosion, ...)	5000	1
Total	490 000	100

232 depuis le milieu du 20^e une part importante de ces écosystèmes ont été drainé pour
 233 développer la sylviculture. Aujourd’hui l’exploitation principale de la tourbe est liée à
 234 son utilisation comme substrat horticole ([Lappalainen, 1996; Chapman et al., 2003](#)).
 235 Suite à ces perturbations, la surface de tourbières altérée est estimée à 500 000 km² en-
 236viron, principalement du fait de leur reconversion pour l’agriculture et la sylviculture
 237 ([Tableau 1.2](#)). En France, suite à leur utilisation, principalement agricole, la surface
 238 des tourbières a été par deux entre 1945 et 1998, passant de 1200 km² à 600 km² ([Lap-](#)
 239 [palainen, 1996; Manneville, 1999](#)).

240 Ces écosystèmes ont donc été et sont encore perturbés par différentes activités
 241 humaines.

242 Contrainte climatique

243 Comme nous l’avons dit, le stock de C accumulé par les tourbières s’est majori-
 244 tairement constitué pendant l’Holocène. À cette époque déjà ces écosystèmes étaient
 245 influencés par le climat, et leur développement n’a pas été linéaire sur ces douze derniers
 246 milliers d’années. Il est reconnu que le développement des tourbières est très important
 247 au début de cette période entre il y a 12 000 et 8000 ans ([Smith et al., 2004; MacDo-](#)
 248 [nald et al., 2006; Yu et al., 2009](#)). Cette période coïncide avec le maximum thermique
 249 holocène (HTM), période pendant laquelle le climat était plus chaud que aujourd’hui
 250 ([Kaufman et al., 2004](#)). Ce constat peu sembler paradoxal si l’on considère que dans
 251 la littérature concernant les tourbières et le réchauffement actuel, la crainte de voir

1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

ces écosystèmes se transformer en source de C est majoritaire. Cependant ces même auteurs qui ont montré cette relation, entre le HTM et le développement important des tourbières, ne préjugent pas de l'effet du réchauffement actuel. Notamment [Jones et Yu \(2010\)](#) expliquent que pendant cette période de maximum thermique, existe également une saisonnalité très importante, avec des été chauds et des hivers froid, qui a dû en minimisant la respiration hivernale de ces écosystèmes, jouer un rôle important dans leur développement.

Cette forte saisonnalité n'est pas attendue lors du réchauffement actuel. L'effet estimé dans les hautes latitudes, semble plus important pendant l'hiver et l'automne, et tendrait donc à la minimiser ([Christensen et al., 2007](#)). Les effets directs attendus du réchauffement dans les hautes latitudes sont une augmentation des températures de 2 à 8 °C dans les zones boréales, et de 2 à 6 °C dans les zone tempérées, ainsi qu'une augmentation probable des précipitations ([Christensen et al., 2013; Frolking et al., 2011](#)). De façon plus indirecte est attendue la fonte du permafrost, l'augmentation de l'intensité et de la fréquence de feux et des changements dans les compositions des communautés végétales.

Les tourbières, qui ont accumulées un stock de carbone important, sont donc soumises à des contraintes fortes. Afin de mieux cerner le devenir de ce carbone, l'étude de ces écosystèmes, des flux de gaz qu'ils échangent avec l'atmosphère, est une nécessité.

1.2 Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

1.2.1 GES et Tourbières

Dans l'atmosphère le carbone est principalement présent dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone (CO₂) et de méthane (CH₄).

La concentration en CO₂ dans l'atmosphère fluctuait avant l'ère industrielle entre




FIGURE 1.3 – Nombre de tourbières nouvellement formées pendant l’holocène. Modifié d’après ([MacDonald *et al.*, 2006](#))

²⁷⁷ 180 et 290 ppm. En 1750 au début de l’ère industrielle sa concentration était toujours
²⁷⁸ de 280 ppm avant d’augmenter pour atteindre 391 ppm aujourd’hui (en 2011) ([Ciais
²⁷⁹ *et al.*, 2014](#)). Différents processus permettent d’extraire du CO₂ de l’atmosphère, la
²⁸⁰ photosynthèse, la dissolution du CO₂ dans l’océan et enfin l’altération de silicate et les
²⁸¹ réactions avec le carbonate de calcium. Ces processus s’effectuent avec des échelles de
²⁸² temps différentes, en conséquence après une émission de CO₂, il ne reste que 40 % de
²⁸³ cette émission après 100 ans, mais il reste toujours plus de 20 % après 1000 ans et plus
²⁸⁴ de 10 % après 10 000 ans ([Joos *et al.*, 2013; Ciais *et al.*, 2014](#)) (Figure 1.5).

²⁸⁵ La concentration en méthane de l’atmosphère est estimée à 350 ppb il y a 18 000 ans
²⁸⁶ environ lors de la dernière glaciation, à 720 ppb en 1750, et à 1800 ppb aujourd’hui (ou
²⁸⁷ plutôt en 2011) ([Ciais *et al.*, 2014](#)). À l’inverse du CO₂ sa durée de vie dans l’atmosphère
²⁸⁸ est limitée : moins de 10 ans ([Lelieveld *et al.*, 1998; Prather *et al.*, 2012](#)). Malgré sa faible
²⁸⁹ durée dans l’atmosphère son potentiel de réchauffement global (PRG) est important 72
²⁹⁰ à 20 ans. Les zones humides sont la première source naturelle de CH₄ atmosphérique
²⁹¹ pour avec un flux à l’échelle globale estimé entre 145 et 285 Tg an⁻¹ ([Lelieveld *et al.*,
²⁹² 1998; Wuebbles et Hayhoe, 2002; Ciais *et al.*, 2014](#)) (Tableau ?). Les tourbières de




FIGURE 1.4 – Projection des changements à l’horizon 2100, des moyennes et extrêmes annuels (sur terre) des températures de l’air et des précipitations : (a) température de surface moyenne par °C de changement global moyen, (b) 90^e percentile des températures journalières maximum par °C de changement de température moyenne maximale, (c) précipitations moyenne (en % par °C de changement de température moyenne) et (d) fraction de jours ayant des précipitations dépassant le 95^e percentile. Sources : (a) et (c) simulations CMIP5, scénario RCP4.5, (b) et (d) adaptation d’après Orlowsky et Seneviratne (2012)(IPCC2013).




FIGURE 1.5 – Décroissance de la proportion de CO₂ de l'atmosphère suite à une émission idéalisée de 100 PgC. les graphes (a) et (b) est une moyenne de modèles (Joos *et al.*, 2013), le graphe (c) est une moyenne d'autres modèles (Archer *et al.*, 2009). Modifié d'après (Ciais *et al.*, 2014).

²⁹³ l'hémisphère nord comptent pour 46 Tg an⁻¹ (Gorham, 1991) (**pas de source plus**
²⁹⁴ **récente ?**).

²⁹⁵ À l'échelle globale, le stockage de C par les tourbières, prenant en compte à la fois
²⁹⁶ le CO₂ et le CH₄, est estimé à 70 Tg an⁻¹ (Clymo *et al.*, 1998).

²⁹⁷ 1.2.2 Les flux entre l'atmosphère et les tourbières

²⁹⁸ De l'atmosphère à l'écosystème

Avant de stocker et de conserver du carbone, le faut le capturer. Ce transfert du carbone de l'atmosphère à la tourbe se fait sous la forme de CO₂, assimilé par la photosynthèse, principalement des végétaux supérieurs, et éventuellement, bien que dans de moindre proportions, par des algues, des lichens ou des bactéries photosynthétiques Girard *et al.* (2011). On peut écrire la réaction de photosynthèse de la façon suivante :



1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants




FIGURE 1.6 – schéma des flux de carbone entre une tourbière et l'atmosphère

²⁹⁹ Ce flux est généralement appelé **Production Primaire Brute** (PPB), *Gross Primary Production*, (GPP) en anglais (Figure 1.6). Les tourbières sont des écosystèmes dont ³⁰⁰ la production primaire est estimée à environ 500 gC m^{-2} (Francez, 2000). Si la photo-³⁰¹ synthèse est un processus majeur d'assimilation du CO_2 , il existe d'autres voies métaboliques permettant la capture du CO_2 de l'atmosphère. Ainsi les micro-organismes ³⁰² chemolithotrophes (**expliciter**) sont capables d'assimiler le CO_2 en utilisant l'énergie ³⁰³ issue de l'oxydation de composés inorganiques.

³⁰⁶ Les voies métaboliques permettant l'assimilation du CO_2 sont plutôt bien connues et ³⁰⁷ le fait que les substrats de départ de varient pas (mal dit..) a permis une compréhension ³⁰⁸ relativement fine du processus (Farquhar *et al.*, 1980). Cependant une fois assimilé par ³⁰⁹ la végétation le devenir du carbone est moins direct. À plus long terme, et après son ³¹⁰ assimilation par la plante, le carbone est stocké principalement à travers la partie non ³¹¹ décomposée des litières végétales. Litières qui à force de compressions et de tassements ³¹² va devenir de la tourbe.

313 Il n'y a pas de flux direct de CH₄ de l'atmosphère vers les écosystèmes terrestres,
314 la majorité du méthane atmosphérique, 90 %, réagit avec des radicaux hydroxyles,
315 principalement dans la troposphère ou il sera un précurseur de l'ozone

316 **De l'écosystème à l'atmosphère**

317 Les sources de carbone émises par les tourbières vers l'atmosphère sont multiples.
318 D'abord différents gaz peuvent être émis, notamment le CO₂ et le CH₄, éventuellement
319 du N₂O, et certains d'entre eux peuvent avoir plusieurs sources.

320 Le CO₂ est émis dans l'atmosphère à travers différents processus, la respiration
321 aérobie (le plus gros contributeur), les respirations anaérobies ou fermentations (e.g.
322 du glucose, de l'acétate), ou encore l'oxydation du méthane. Les principales sources de
323 CO₂, sont représentées dans la figure 1.6. La ou plutôt les respirations sont généralement
324 séparées en deux. D'un côté la respiration végétale, que ce soit celle de feuilles, des tiges,
325 des racines et que l'on appelle la **respiration autotrophe**. De l'autre rassemblé sous le
326 vocable de **respiration hétérotrophe**, la respiration de la rhizosphère, liée à l'émission
327 d'exsudats par les racines, la décomposition des litières et des matières organiques, la
328 respiration de la faune et l'oxydation du CH₄ par les organismes méthanotrophes. On
329 appelle **Respiration de l'Écosystème** (RE) l'ensemble des respirations autotrophe
330 et hétérotrophe, en incluant à la fois ses composantes aérienne et souterraine. On la
331 distingue de la respiration du sol qui est définie comme l'ensemble des respirations de
332 la colonne de sol, en excluant la partie aérienne. La production de CO₂ est donc un
333 signal intégré sur l'ensemble de la colonne de tourbe. C'est cette multitude de processus
334 qui rend l'estimation de ce flux difficile, en effet chacune des respirations n'aura pas la
335 même sensibilité vis à vis de facteurs contrôlant.

336 La strate muscinale pouvant jouer/participer/produire jusqu'à 80 % de la produc-
337 tion primaire ([Francez, 2000](#)). Cette production primaire n'est pas particulière élevée
338 (**Réf needed**)et c'est en fait la faible décomposition des matières organiques qui per-
339 met aux tourbières de stocker du carbone. L'accumulation moyenne estimée dans les
340 tourbières boréales est de 30 gC m⁻². Le taux d'accumulation varie en fonction des

341 espèces végétales présentes ((Réf needed)), le niveau d'eau ((Réf needed)), ... (??)

342 Conséquence du niveau de nappe élevé des tourbières, le développement d'une zone

343 anoxique importante dans la colonne de sol favorise la production de CH₄. En moyenne



344 des flux de CH₄ mesurés dans les tourbières s'étendent de 0 à plus 0,96 µmol m⁻² s⁻¹,

345 avec généralement des flux compris entre 0,0048 et 0,077 µmol m⁻² s⁻¹ (Blodau, 2002).

346 Le CH₄ est principalement produit à partir d'acétate (CH₃COOH) ou de dihydrogène

347 (H₂), ces deux composés étant dérivés de la décomposition préalable de matières orga-

348 niques (Lai, 2009).



349 Le CH₄ produit est transporté dans l'atmosphère par diffusion, ébullition ou à travers

350 certaines plantes (Joabsson *et al.*, 1999; Colmer, 2003). Pendant ce transport le CH₄

351 peut être oxydé par des organismes méthanotrophes. Cette transformation produit

352 tour à tour différents composés (méthanol, formaldéhyde, formate) aboutissant à la

353 production de CO₂ (Whalen, 2005).



354 Le méthane (Lai2009, seger1998, barlett1993 review)

355 1.2.3 Les facteurs majeurs contrôlant les flux

356 Les facteurs qui contrôlent ces flux de carbone sont globalement connus : la tempé-

357 rature, le niveau de la nappe et la végétation. L'augmentation de la vitesse de réaction

358 de nombreuses réactions biochimiques avec la température est connue depuis long-

359 temps. Elle a été mise en évidence par un chimiste suédois en 1889 : Svante August

360 Arrhenius sur la base de travaux réalisés par un autre chimiste, néerlandais, Jaco-

361 bus Henricus Van't Hoff. Depuis, de nombreuses mesures de terrain confirment cette

362 relation (Réf needed). La photosynthèse et l'ensemble des respirations sont donc

363 contrôlées, au moins en partie, par la température. L'hydrologie est un autre facteur
 364 contrôlant majeur. Le niveau de la nappe, défini ici comme la distance entre la sur-
 365 face du sol de l'écosystème et le toit de l'aquifère/l'eau libre/la zone saturée, sépare la
 366 colonne de tourbe en une zone oxique, et une zone anoxique. L'épaisseur relative de
 367 ces deux zones va influer sur la production du CO₂, majoritairement produit dans la
 368 zone oxique, et du CH₄ produit dans la zone anoxique. Le niveau de la nappe constraint
 369 également le teneur en eau du sol et la hauteur de la frange capillaire qui va influer sur
 370 la végétation ([Laiho, 2006](#)). La végétation est également un facteur important. D'abord
 371 car elle exerce une influence directe sur les flux, avec d'un côté la photosynthèse et les
 372 respirations des plantes vivantes, ou la décomposition des plantes mortes. La composi-
 373 tion des communautés végétales va également influer sur le potentiel photosynthétique
 374 de l'écosystème, ce potentiel pouvant varier selon le végétal considéré [Moore et al.](#)
 375 ([2002](#)), et sur la vitesse de décomposition des litières qui peut également varier en
 376 fonction du végétal. De façon plus indirecte, la végétation peut également stimuler la
 377 respiration des micro-organismes présent dans la rhizosphère⁵ via la libération d'exsu-
 378 dats racinaires [Moore et al. \(2002\)](#). Enfin certaines plantes vasculaires, adaptées aux
 379 conditions de saturations en eau, peuvent faciliter l'échange de gaz entre l'atmosphère
 380 et l'écosystème grâce à un espace intercellulaire agrandi, l'Aerenchyme.

381 Cependant la sensibilité des flux à ces facteurs ne fait pas consensus et peut varier
 382 selon les conditions environnementales ou l'échelle de temps ou d'espace considérée.
 383 Par la suite nous considérons les processus à l'échelle d'une colonne de sol ou d'un
 384 écosystème

385 Facteurs contrôlant la production primaire brute

386 Le premier facteur contrôlant la PPB est bien sur la végétation et notamment la
 387 composition végétale des communautés présentes. Les bryophytes n'ont pas la même
 388 productivité primaire que les graminées ou que les arbustes. En plus de ces différences
 389 entre groupes de végétaux, il existe également des différences de productivité pour un

5. zone du sol impacté par les racines




FIGURE 1.7 – Productivités moyennes des espèces de sphaignes en $\text{g m}^{-2} \text{an}^{-1}$. Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard. Le nombre d'observation est indiqué par les nombres à l'intérieur des barres. Les espèces en orange sont celles rencontrées sur le site d'étude. modifié d'après Gunnarsson (2005)

390 même groupe selon le type de tourbière (Moore *et al.*, 2002 dans Rydin et Jeglum,
 391 2013b) . Alors que dans les tourbières de haut-marais, les sphaignes et les arbustes ont
 392 une productivité importante, les herbacées et graminées ont une productivité beaucoup
 393 plus faible. À l'inverse ce sont les herbes et les graminées qui ont la plus forte producti-
 394 vité dans les tourbières de bas-marais pauvres. Elles sont suivie par les sphaignes puis
 395 les arbustes. Au sein même de ces groupes la productivité peut varier de façon impor-
 396 tante, c'est ce que montrent Gunnarsson (2005) avec les sphaignes, dont la productivité,
 397 selon l'espèce et les conditions dans lesquelles elle vit, varie fortement (Figure 1.7).

398 L'effet d'une variation du niveau de la nappe et de la température, jouant sur
 399 la végétation va également jouer sur la PPB. Distinguer ces deux facteurs n'est pas
 400 anodin, la majorité des études réalisées sur le terrain montre les effets des deux fac-
 401 teurs combinés. Ainsi Cai *et al.* (2010) ont montré que des conditions plus chaudes
 402 et sèches pouvaient augmenter la PPB. L'effet du niveau de la nappe peut varier se-
 403 lon le contexte : Dans une étude des effets à long terme de variation du niveau de la

404 nappe, [Ballantyne et al. \(2014\)](#) montrent qu'une baisse du niveau de la nappe entraîne
405 une augmentation de la PPB en facilitant l'accès des plantes vasculaire à l'oxygène
406 et aux nutriments. Paradoxalement, la hausse d'un niveau de nappe, initialement bas
407 et entraînant un stress hydrique important, conduira également à une augmentation
408 de la PPB ([Strack et Zuback, 2013](#)). Ces effets sont variables selon les communautés
409 végétales et le contexte dans lequel elles se trouvent. Pour un gradient de niveau de
410 nappe qui augmente dans une tourbière de haut-marais, [Weltzin et al. \(2000\)](#) montent
411 une diminution de la productivité des arbustes, tandis que celle des graminées n'est
412 pas affectée. À l'inverse, pour un gradient similaire dans une tourbière de bas-marais,
413 la productivité des arbustes n'est pas affectés tandis que celle des graminées augmente.
414 Un opposition similaire est également relevé concernant les graminées soumises à un
415 traitement infra-rouge afin de les réchauffer. Ces dernières voient leur productivité di-
416 minuer dans la tourbière de haut-marais et augmenter dans la tourbière de bas-marais.
417 [Munir et al. \(2015\)](#) isolent également l'effet de la température en utilisant des OTC
418 (*Open Top Chamber*). Ces dispositifs, ressemblant à des serres ouvertes, permettent de
419 réchauffer une zone de la tourbière. Ils montrent que dans les zones sans manipulation
420 du niveau de la nappe, le réchauffement des OTC, augmente la PPB.

421 Facteurs contrôlant la respiration de l'écosystème

422 Un facteur majeur contrôlant la RE est la température. Dans des conditions plus
423 sèches et plus chaude [Cai et al. \(2010\)](#) qui montrait une augmentation de la PPB,
424 montre une augmentation plus importante encore de la RE. [Updegraff et al. \(2001\)](#)
425 montrent, dans une expérimentation à base de mésocosme, que la respiration de l'éco-
426 système est contrôlée presque exclusivement par la température du sol. La modélisation
427 de ce flux se fait donc généralement en utilisant la température que se soit celle de l'air
428 ([Bortoluzzi et al., 2006](#)) ou celle du sol à différentes profondeurs ([Görres et al., 2014](#);
429 [Zhu et al., 2015](#)).

430 Le niveau de nappe, conditionnant l'accès à l'oxygène, joue également un rôle im-
431 portant. Un niveau qui diminue se traduit généralement pas une hausse de la RE que

1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

ce soit à long terme ([Strack et al., 2006; Ballantyne et al., 2014](#)) ou à plus court terme ([Réf needed](#)).

Facteurs contrôlant l'ENE

On défini l'Échange Net de l'Écosystème (ENE) comme la différence entre la Photosynthèse Primaire Brute (PPB) et la Respiration de l'écosystème (RE). Les facteurs contrôlants l'ENE sont donc les mêmes que ceux qui contrôlent ces 2 flux. Cependant l'effet d'un même facteur de contrôle peut être différent vis à vis de PPB et de RE selon le contexte environnemental, que ce soit par rapport à la nature de l'effet ou son importance. Ainsi une variation de l'ENE peut parfois être contrôlée majoritairement soit par la PPB soit par la RE soit par les deux. Par exemple, une baisse du niveau de la nappe est souvent liée dans la littérature à une baisse de l'ENE. Cependant certains attribuent cette baisse à une augmentation de la Respiration ([Alm et al., 1999; Ise et al., 2008](#)) ([aurela2013, oechel1993](#)) quand d'autres l'attribuent à une diminution de la photosynthèse ([Sonnentag et al., 2010; Peichl et al., 2014](#)). Enfin certains voient un effet à la fois de l'augmentation de la respiration et de la diminution de la photosynthèse ([Strack et Zuback, 2013](#)).

À noter un article particulièrement intéressant ([Lund et al., 2012](#)) dans lequel, dans un même site une baisse du niveau de la nappe 2 années différentes entraînera une baisse de l'ENE dans les 2 cas, mais dans l'un des cas cette baisse est contrôlée par un augmentation de la respiration et dans l'autre cas cette baisse est contrôlée par une diminution de la photosynthèse.

Également un article de [Ballantyne et al. \(2014\)](#) qui lui ne note pas d'effet d'une baisse du niveau de la nappe sur l'ENE car l'augmentation de la respiration est compensée par une augmentation de la photosynthèse.

Facteurs contrôlant les flux de méthane

Le niveau de la nappe et la température semblent être les facteurs prépondérants du contrôle des flux de méthane

459 La prépondérance relative des ces différents flux, contrôlée par les conditions envi-
460 ronnementale, va donc impacter le fonctionnement des tourbières. Soit elles stockent
461 du carbone, en accumulant des matières organiques, et donc fonctionnent comme des
462 puits ou soit elle relâchent du carbone et fonctionnent comme des sources.

463 L'étude individuelle de tel ou tel flux avec tel ou tel facteur contrôlant est nécessaire
464 afin de comprendre ce qu'il se passe au niveau des processus. Il est tout aussi nécessaire
465 d'arriver à intégrer l'ensemble de la complexité naturelle. C'est l'intérêt d'établir des
466 bilans de carbone.

467 1.2.4 Bilans de carbone

468 Le calcul d'un bilan de carbone à l'échelle d'un écosystème permet de détermi-
469 ner si l'équilibre (ou le déséquilibre) des flux tend à stocker du carbone, le système
470 fonctionnant alors comme un puits, ou à libérer du carbone, le système fonctionnant
471 alors comme une source. Il existe différentes façons de réaliser le bilan de carbone d'une
472 tourbière que l'on peut séparer en deux approches principales. La première approche
473 consiste à utiliser l'archive tourbeuse pour estimer des vitesses d'accumulation de la
474 tourbe. Cette méthode permet d'étudier la fonction puits sur des temps longs (derniers
475 millénaires) et de lier d'éventuels changements dans les vitesses d'accumulation à des
476 facteurs environnementaux. La seconde approche se base d'avantage sur des mesures
477 actuelles des différents flux afin d'étudier, sur des temps forcément plus courts, l'évolu-
478 tion de la prépondérance puits/source d'un écosystème. Les deux approches sont donc
479 complémentaires.

480 passé

481 long-term apparent rate of carbon accumulation (LORCA) datations + dry bulk
482 density + carbon content (Tableau 1.3)

483 tableau LORCA ajouter colonne contexte (exple : 7 tourbières ombro-
484 tropiques)

1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

Tableau 1.3 – Vitesse apparente d'accumulation du carbon à long terme en gC m⁻² s⁻¹

min – max	moyenne	référence
20 – 140	?	Mitra2005
?	18.6	Yu2009
	17.2	Gorham2012
	20	Jones2010
	16.2	Borren2004
	18.5	Packalen2014
	19.4	Vitt2000
	19	Turunen2004
5.74 – 129.31	33.66	Xing2015

485 présent

486 Dans cette approche on estime les flux actuels de carbone entrant et sortant de
487 l'écosystème afin de déterminer un bilan. Un certain nombre de flux de carbone sont
488 présent au sein des écosystèmes terrestre (équation (1.1))

$$BCNE = \frac{dC}{dt} = \overbrace{PPB - Re}^{ENE} - F_{COD} - F_{COP} - F_{CH_4} - F_{CID} - F_{COV} - F_{CO} \quad (1.1)$$

489 — ENE : Échange Net de l'Écosystème

490 — PPB : Production Primaire Brute

491 — Re : Respiration de l'Écosystème

492 — F_{COP} : Flux de Carbone Organique Dissous

493 — F_{COP} : Flux de Carbone Organique Particulaire

494 — F_{CH_4} : Flux de Méthane

495 — F_{CID} : Flux de Carbone Inorganique Dissous

496 — F_{COV} : Flux de Composés Organique Volatils

497 — F_{CO} : Flux de Monoxyde de Carbone

498 Les bilans les plus complets réalisées sur les tourbières comprennent la partie ga-

499 zeuse, dissoute...

500 Dans les tourbières, les flux de CO₂ sont généralement les plus importants (**Réf
needed**), puis les flux de CH₄ et/ou de COD et enfin les flux de COP.

502 Pour estimer ces flux différentes techniques existent, notamment l'eddy covariance
503 et les méthodes de chambre pour les flux de gaz.

504 D'autres méthodes, moins souvent utilisées, existent comme l'utilisation du ratio
505 C :N (Kirk2015)


506 2 Sites d'études et méthodologies employées

507

508	2.1 Présentation de la tourbière de La Guette	32
509		
510	2.2 Autres sites du service national d'observation	37
511		
512	2.3 Mesures de flux	38
513	2.3.1 Présentation des méthodologies possibles	38
514	2.3.2 Les mesures de CO ₂	39
515	2.3.3 Les mesures de CH ₄	42
516	2.3.4 Le calcul des flux	43
517	2.4 Facteurs contrôlants	43
518	2.4.1 acquisitions automatisées	43
519		

520 2.1 Présentation de la tourbière de La Guette

521 Le site d'étude, la tourbière de La Guette, est l'un des quatre sites du service
522 national d'observation des tourbières (SNOT) qui vise à étudier la fonction puits de
523 carbone des tourbières tempérées notamment vis-à-vis des changements globaux.



BDZ: Bernadouze (1400 m), FRN: Frasne (840 m),
LDM: Landemarais (155 m), LGT: La Guette (145 m)

FIGURE 2.1 – Site d'études SNO

524 La tourbière de La Guette est située à Neuvy-sur-Barangeon, en Sologne, ($N\ 47^{\circ}19'44''$,
525 E $2^{\circ}17'04''$) dans le département du Cher (Figure 2.1). Le site s'étend sur une surface
526 d'une vingtaine d'hectare avec une géométrie relativement allongée 2.2. Cette surface
527 la classe parmi les plus grandes de Sologne. L'épaisseur moyenne de la tourbe est de
528 80 cm avec des maximums locaux atteignant 180 cm. La tourbière de La Guette est pro-
529 bablement topogène (**Réf needed**), formée par l'accumulation d'eau de pluie dans une
530 cuvette imperméabilisée par une couche d'argile issue d'alluvions de la rivière du même
531 nom (La Guette). Les précipitations annuelles moyennes sur le site sont de 880 mm et




FIGURE 2.2 – Carte de la tourbière de La Guette

532 les températures moyenne annuelle de 11 °C. L'eau du site à une conductivité généra-
 533 lement inférieure à $80 \mu\text{S m}^{-2}$ et un pH compris entre 4 et 5. Ces caractéristiques classe
 534 la tourbière parmi les tourbières minérotrophes pauvres en nutriments (*poor fen*). Les
 535 datations effectuées sur le site permettent de dire que les premiers dépôts tourbeux
 536 remontent à environ 5 à 6000 ans.

537 Le site a subi un certain nombre de perturbations au cours de son existence. D'abord
 538 la construction d'une route, avant 1945, qui coupe l'extrémité sud de la tourbière
 539 favorisant son drainage. Le site est également brûlé par un incendie en 1976. En 1979
 540 des pins noirs (*Pinus nigra*) sont plantés au nord du site. Enfin 2008 le récurage du
 541 fossé de drainage bordant la route semble entraîner une augmentation significative des
 542 pertes d'eau du système.

543 Ces perturbations, ou au moins une partie d'entre elles, ont probablement favorisé
 544 l'envahissement du site par une végétation vasculaire, notamment arborée et composée
 545 de pins (*Pinus sylvestris*) et de bouleaux (*Betula verrucosa* et *pubescens*). [Viel et al.](#)

2.1. Présentation de la tourbière de La Guette

546 (2015) a pu calculé, grâce à l'étude de photos aérienne, la vitesse de fermeture du site,
547 entre 1945 et 2010, estimée à $2020 \text{ m}^2 \text{ an}^{-1}$ avant l'incendie de 1976 et à $3469 \text{ m}^2 \text{ an}^{-1}$
548 après. La tourbière est également envahie de façon importante par la molinie bleue
549 (*Molinia caerulea*) de la famille des *Poaceae* (Figure 2.3c). Leur présence favorisant la
550 dégradation des matières organiques (Gogo *et al.*, 2011). Sont également présentes sur
551 le site un certain nombre d'espèces caractéristiques des tourbières comme les sphaignes,
552 principalement *Sphagnum cuspidatum* et *Sphagnum rubellum*, qui forment des tapis.
553 Un tapis de sphaignes en cours de formation est visible sur la photo 2.3a. Sur cette
554 même photo sont également visible des Linaigrettes à feuilles étroites (*Eriophorum*
555 *angustifolium*), une plante de la famille des *Cyperaceae* caractéristique des marais et
556 des landes tourbeuses (Rameau *et al.*, 2008). Des bruyères sont également présentes de
557 façon importante sur le site avec notamment *Erica tetralix*, parfois appelée la Bruyère
558 des marais, de la famille des *Ericaceae* (Figure 2.3b). De la même famille est présente
559 sur le site, mais de façon moins omniprésente, la Callune (*Calluna vulgaris*). L'ensemble
560 de ces espèces tendent à préférer les milieux riches en matières organiques et pauvres
561 en nutriment (tela-botanica). D'autres espèces sont présentes sur ce site notamment,
562 *Rhynchospora alba* de la famille des *Cyperaceae*, *Juncus bulbosus*(image annexe ?),
563 de la famille de *Juncaceae*, et des Droséras, une plante insectivore, de la famille des
564 *Droseraceae* (Annexe A, Figure 6a) .

565 Au cours des dernières années, les précipitations sont relativement différentes avec
566 deux années plus sèche que la moyenne avant 2013 et deux années plus humide en 2013
567 et 2014 (Figure 2.4). On observe également cette dualité au niveau du niveau de la
568 nappe. Avant 2013 les étés sont marqués par des étiages important avec des baisses du
569 niveau de nappe allant jusqu'à -60 cm en 2012 (Figure 2.5). Après 2013, les étiages
570 sont beaucoup moins importants sur le site (Figure 2.6). Les variations inter-annuelles
571 de la température moyenne de l'air semblent moins marquées. L'année 2011 est très
572 proche de 2014 avec une température moyenne supérieure à 11 °C. De la même façon
573 les années 2012 et 2013 sont très proche avec des température moyenne inférieure à
574 10 °C.



(a) *Sphagnum – Eriophorum austifolium*



(b) *Erica tetralix – Molinia caerulea*



(c) *Molinia caerulea*

FIGURE 2.3 – Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure.

2.1. Présentation de la tourbière de La Guette




FIGURE 2.4 – Évolution du niveau de la pluviométrie, en mm, des années 2011 à 2014




FIGURE 2.5 – Évolution du niveau de la nappe, en cm par rapport à la surface, des années 2011 à 2014




FIGURE 2.6 – Évolution de la température de l'air (en °C) des années 2011 à 2014

⁵⁷⁵ 2.2 Autres sites du service national d'obser- ⁵⁷⁶ vation

577 Bien que moins étudiés, les autres sites du SNOT, Bernadouze, Frasne et Landemarais
578 ont également fait l'objet d'un suivi ponctuel en 2013. La tourbière de Bernadouze
579 est situé à 1400 m dans les Pyrénées, en Ariège (N 42°48'09", E 1°25'24"). Elle est
580 relativement petite avec 3,75 ha seulement. La tourbière de Frasne est situé à 840 m
581 dans le Doubs et s'étend sur une surface de 98 ha. Enfin la tourbière de Landemarais
582 est située en Ille-et-villaine, à 154 m et s'étend sur 23 ha. les températures annuelles
583 moyennes sur ces trois sites sont respectivement de 6, 7,5 et 11 °C. les précipitations
584 annuelles étant de 1700, 1400, 870 mm.

585 Au sein de ses sites de nombreuses mesures ont été effectuées et notamment des
586 mesures de flux de GES notamment le CO₂ et le CH₄. La méthodologie utilisée pour
587 les mesurer étant transverse aux différentes expérimentations elle sera détaillée dans
588 ce chapitre.

₅₈₉ 2.3 Mesures de flux

₅₉₀ 2.3.1 Présentation des méthodologies possibles

₅₉₁ De nombreuses techniques permettent de mesurer des flux de gaz, avec en premier
₅₉₂ lieu les méthodes de chambres.

₅₉₃ Les chambres peuvent être ouvertes, c'est à dire que la mesure se fait lorsque le
₅₉₄ gaz à l'intérieur de la chambre à l'équilibre avec celui à l'extérieur, ou fermées, dans
₅₉₅ ce cas le gaz à l'intérieur de la chambre n'est pas à l'équilibre avec celui à l'extérieur.
₅₉₆ Elles peuvent également être dynamique, lorsqu'un système de pompe, permettant
₅₉₇ notamment de transporter le gaz jusqu'à l'analyseur, est présent. Ou statique si le
₅₉₈ système est sans flux artificiel.

₅₉₉ Trois grandes techniques de chambre existent. D'abord les chambres **dynamiques**
₆₀₀ **ouvertes** qui se basent sur un état d'équilibre et mesurent une différence de concen-
₆₀₁ tration d'un gaz dont une partie passe par la chambre et l'autre non. Cette méthode
₆₀₂ nécessite un système de pompe et donc le passage d'un flux. Ensuite les chambres **dy-
namiques fermées** qui mesurent l'évolution de la concentration du gaz au sein de la
₆₀₄ chambre à l'aide d'un système de pompe permettant l'envoi du gaz dans un analyseur
₆₀₅ externe. Enfin les chambres **statiques fermées** qui mesurent également l'évolution de
₆₀₆ la concentration du gaz au sein de la chambre sans qu'un système de pompe ne soit
₆₀₇ présent. Dans ce cas soit l'analyseur est présent dans la chambre, soit des prélèvements
₆₀₈ sont fait à intervalles réguliers puis analysés par la suite en chromatographie gazeuse.

₆₀₉ Il faut noter que les dénominations anglaises de ces méthodes doit faire l'objet d'une
₆₁₀ attention particulière. *Closed chamber* par exemple est parfois utilisé pour se référer
₆₁₁ à l'état ou non d'équilibre, comme défini dans ce document, mais parfois également
₆₁₂ pour désigner les méthodes de chambre sans système de flux ce qui peut prêter à
₆₁₃ confusion [Pumpenan et al. \(2004\)](#). Souvent utilisées les dénominations *open/closed* et
₆₁₄ *dynamic/static* sont décrites dans [Luo et Zhou \(2006b\)](#), une autre convention peut être
₆₁₅ rencontrée : *flow-through/non-flow-through* et *steady state/non-steady state* [Livingston](#)

616 et Hutchinson (1995)

617 Ces différentes méthodes ont divers avantages et inconvénients.

618 Ces méthodes sont souvent utilisées car elles ont un coût modeste, et sont très ver-
619 satiles ce qui permet leur utilisation dans de nombreuses situations. D'autres méthodes
620 plus globales existent comme les méthodes d'Eddy Covariance.

621 Les méthodes d'Eddy Covariance se base sur...

622 Comparaison entre les méthodes de chambre et les méthodes d'Eddy Covariance.

623 2.3.2 Les mesures de CO₂

624 Toutes les mesures de CO₂ présentées par la suite ont été faite avec les mêmes ma-
625 tériels et le même protocole. Les chambres utilisées sont en plexiglass et ont été conçue
626 (LPC2E) et fabriquées (ISTO) au CNRS. Ce sont des chambres transparentes, cylin-
627 drique, de 30 cm de diamètre et 30 cm de hauteur. Les mesures de CO₂ à proprement
628 parler ont été faite à l'aide d'une sonde Vaisala CARBOCAP® GMP 343. La sonde est
629 directement insérée dans la chambre ainsi qu'une sonde Vaisala HUMICAP® HMP 75
630 mesurant d'humidité et la température dans la chambre.

631 Avant toute mesure, des embases sont installées sur le site. Ce sont des cylindres
632 de PVC d'une hauteur de 15 cm pour 30 cm de diamètres, insérés dans le sol sur 8
633 à 10 cm. La partie basale et enterrée de ces cylindres (sur 7 cm) a été préalablement
634 percée d'une quarantaine de trous (1 cm de diamètre) afin de minimiser les impacts de
635 l'embase sur le développement racinaire et permettre les écoulements d'eau.

636 Pour les raisons détaillée précédemment, la méthode mise en œuvre est celle de
637 la chambre statique fermée, aucun système de pompe n'est donc utilisé. la chambre
638 est posée sur l'embase, elle contient l'analyseur de CO₂ qui mesure la variation de
639 la concentration en gaz au cours du temps. Un ventilateur de faible puissance est
640 également présent à l'intérieur de la chambre afin d'homogénéiser l'air. 1 à 3 min de
641 stabilisation sont nécessaires après la pose de la chambre afin d'éviter les effets pouvant
642 y être liés. Ensuite l'enregistrement est lancé, avec l'acquisition toutes les 5 s pendant
643 5 min de la concentration en CO₂, de la température et de l'humidité. La mesure se

2.3. Mesures de flux




FIGURE 2.7 – Mesures de CO₂

644 déroule donc sur une période de temps relativement courte afin de minimiser le dés-
 645 équilibre avec le milieu extérieur. Dans ce but les mesures ont parfois été manuellement
 646 raccourcies, 2 à 3 min d'acquisition, si une pente claire se dégageait rapidement. Ceci
 647 notamment lorsque les conditions météorologiques, chaudes et ensoleillées, laissaient
 648 supposer une différence rapidement importante vis-à-vis des conditions extérieures.
 649 Généralement, deux acquisitions de CO₂ sont faites à la suite sur une même embase.
 650 La première, avec la chambre transparente nue, permettant l'enregistrement de l'ENE
 651 (Figure 2.7-a). La seconde avec la chambre recouverte d'une chaussette de tissu occul-
 652 tant, isolant la chambre de la lumière, permettant d'interrompre la photosynthèse et
 653 donc d'enregistrer les respirations (RE) (Figure 2.7-b).

654 De nombreux écueils peuvent rendre une mesure inexploitable. D'abord le placement
 655 de la chambre, cela peut sembler trivial mais positionner la chambre au milieu d'her-



FIGURE 2.8 – SPIRIT

656 bacées et de bruyères n'est pas toujours évident. Plus anecdotiquement des sphaignes
657 gelées, recouvrant les bords de l'embase rendent la pose de la chambre difficile voire
658 impossible. Enfin selon l'heure de la journée des gradients de concentrations peuvent
659 être présent et augmenter localement les concentrations de CO₂ de façon importante
660 allant jusqu'à saturer la sonde.

661 Au vu du volume de données acquises et souhaitant garder l'intérêt de mesures
662 manuelles, à savoir le contrôle humain des flux et des conditions de mesure, il a été
663 nécessaire de développer un outil de traitement facilitant le contrôle et le calcul des flux.
664 Ceci afin d'éviter de recourir à des seuils arbitraires (typiquement une valeur de R²)
665 pour le contrôle qualité des données, mais également de permettre une reproductibilité
666 et un traçage des modifications effectuées sur les données brutes. (donner des exemples)
667 Ce travail est présenté dans l'annexe D.

⁶⁶⁸ **2.3.3 Les mesures de CH₄**

⁶⁶⁹ Les mesures de CH₄ ont été réalisée avec une chambre aux caractéristiques similaires
⁶⁷⁰ à celles utilisées pour les mesures de CO₂ à l'exception de l'interface avec l'analyseur.
⁶⁷¹ La méthode de la chambre dynamique fermée a été utilisée pour réaliser ces mesures,
⁶⁷² elle diffère donc légèrement de celle utilisée pour le CO₂ puisqu'elle nécessite la mise en
⁶⁷³ oeuvre d'un système de pompe pour transporter le gaz jusqu'à l'analyseur. Les mesures
⁶⁷⁴ de concentration en CH₄ ont été réalisée à l'aide du SPIRIT (Figure 2.8).

⁶⁷⁵ C'est un SPectrometre Infra Rouge In-situ Troposphérique développé par le LPC2E.
⁶⁷⁶ La spectrométrie infra-rouge se base sur la mesure de l'absorption d'un rayonnement
⁶⁷⁷ infrarouge par des molécules conduisant Cet instrument profite de l'expertise acquise
⁶⁷⁸ par le laboratoire dans le domaine de la métrologie infra-rouge, notamment avec le
⁶⁷⁹ développement de son ancêtre le SPIRALE (SPectroscopie Infra Rouge par Absorption
⁶⁸⁰ de Lasers Embarqués). Plus petit et plus léger (100 kg), le SPIRIT a été développé
⁶⁸¹ en différentes versions, fonction des usages. Il existe actuellement une version sol et
⁶⁸² une version avion de l'appareil. Les capacités du SPIRIT sont principalement liées
⁶⁸³ à deux éléments. Premièrement l'invention d'une cellule à réflexion multiple par le
⁶⁸⁴ LPC2E ([Robert, 2007](#)), permettant d'adapter facilement la longueur du parcours op-
tique en fonction de la concentration des gaz à mesurer. Deuxièmement l'utilisation de
⁶⁸⁶ lasers à cascades quantique (QCL), dont la puissance permet d'augmenter le nombre
⁶⁸⁷ de réflexion et la sensibilité des mesures d'absorption. Les QCL installés émettent sé-
⁶⁸⁸ quentiellement dans le moyen infra-rouge (2,5 à 25 µm) (Choix dicté par l'absorbance
⁶⁸⁹ à ces longueurs d'onde d'un grand nombre d'espèce d'intérêt et l'intensité importante
⁶⁹⁰ des raies d'absorption.) et dans une fenêtre spécifique aux espèces que l'on souhaite
⁶⁹¹ mesurer. Après son émission, le laser est divisé en deux La première partie traverse
⁶⁹² une cellule de référence, contenant un gaz de concentration connue. La seconde partie
⁶⁹³ traverse une cellule de mesure, contenant le gaz à mesurer. Les deux parties du laser
⁶⁹⁴ débouchent finalement sur les détecteurs. Le fonctionnement détaillé du SPIRIT-sol
⁶⁹⁵ est décrit dans [Guimbaud *et al.* \(2011\)](#).

696 2.3.4 Le calcul des flux

697 Que ce soit pour le CO₂ ou le CH₄, le flux de gaz est calculé à l'aide de l'équation
 698 suivante :

$$F = \frac{dX}{dt} \times \frac{P}{R \times T} \times \frac{V}{S} \quad (2.1)$$

699 Avec :

700 F : le flux en $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$

701 X : la concentration en gaz mesuré en $\mu\text{mol mol}^{-1}$

702 P : la pression atmosphérique en $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$

703 R : la constante des gaz parfait en $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$

704 T : la température dans la chambre en K

705 V : le volume de la chambre en m³

706 S : la surface occupée par l'embase en m²

707 2.4 Facteurs contrôlants

708 Afin de déterminer l'impact de facteurs contrôlants sur ces flux, mesurer les flux
 709 ne suffit pas il faut également mesurer les variables environnementales dont on pense
 710 qu'elles seront des facteurs contrôlants important. La description des techniques et
 711 matériels communs aux différentes expérimentations utilisées est développée ci-dessous.
 712 Par contre leur mise en œuvre ou caractéristiques spécifiques, comme la fréquence des
 713 mesures, sera décrite individuellement au niveau des parties détaillant chacune des
 714 expérimentations.

715 2.4.1 acquisitions automatisées

716 Les paramètres météorologiques ont été mesurés, en un point, au centre de la tour-
 717 bière (Figure 2.2)(carte ?) à l'aide d'une station d'acquisition Campbell installée sur le

2.4. Facteurs contrôlants

718 site en 2008. Les variables ont été acquises à une fréquence horaire jusqu'au 20 février
719 2014 puis toutes les demi-heures par la suite. Les paramètres enregistrés sont la pres-
720 sion atmosphérique, l'humidité relative de l'air, la pluviométrie, l'irradiation solaire,
721 la vitesse et la direction du vent. (**détail du matos ?**). Cette même station à égale-
722 ment permis l'acquisition de la température de l'air et de la tourbe à -5, -10, -20 et
723 -40 cm. Installées à la même époque, quatre sondes **OTT ?** de mesure du niveau de
724 la nappe d'eau permettent le suivi du niveau de la nappe dans la tourbière.

725 3 Bilan de C de la tourbière de La Guette

726

727	3.1 Introduction	46
728	3.2 Procédure expérimentale et analytique	47
729	3.2.1 Méthodes de mesures	47
730	3.2.2 Modélisation du bilan de C	49
731	3.3 Résultats	52
732	3.3.1 Cinétique des facteurs contrôlant et des flux sur la tourbière de La Guette	52
733	3.3.2 Sélection des modèles	59
734	3.3.3 Le bilan de carbone de la tourbière de La Guette à l'échelle de l'écosystème	66
735	3.3.4 Variabilité spatiale du bilan	72
736	3.4 Discussion	75
737	3.4.1 Estimations des flux	75
738	3.4.2 Estimations des bilans	78
739	3.4.3 Sensibilité et limitations du bilan	78
740	3.4.4 Représentativité locale du modèle	79
741	3.4.5 Variation du bilan avec la végétation	80
742	3.4.6 perspectives	80
743		
744		
745		
746		
747		

₇₄₈ 3.1 Introduction

₇₄₉ La majorité des écosystèmes tourbeux pour lesquels un bilan de carbone a été es-
₇₅₀ timé, se situe sous les hautes latitudes de l'hémisphère nord comme par exemple en
₇₅₁ Suède ([Waddington et Roulet, 2000; Peichl *et al.*, 2014](#)), en Finlande ([Alm *et al.*, 1997](#)),
₇₅₂ au Canada ([Trudeau *et al.*, 2014](#)). Les tourbières situées plus au sud ont fait l'objet de
₇₅₃ rare estimation de bilan (e.g. tourbière du Jura français par [Bortoluzzi *et al.* \(2006\)](#)).
₇₅₄ L'étude de ces écosystèmes présent à la limite sud de leur extension est importante car
₇₅₅ ils expérimentent des conditions plus extrêmes que les autres qui sans être identiques,
₇₅₆ peuvent se rapprocher de celles que subiront d'autres écosystèmes tourbeux suite au
₇₅₇ réchauffement climatique. Par ailleurs, concernant la tourbière de La Guette, ce site
₇₅₈ est représentatif d'une grande partie des tourbières dans les perturbations qu'elle su-
₇₅₉ bie : son drainage et son envahissement par une végétation vasculaire (cf Chapitre 2)
₇₆₀ Le premier objectif de ce chapitre est donc d'établir le bilan de C de la tourbière de
₇₆₁ La Guette. Le second objectif est de caractériser la variabilité spatiale de ces flux de
₇₆₂ GES à travers ce bilan de C. En effet les tourbières sont des écosystèmes avec des
₇₆₃ conditions environnementales qui peuvent varier dans l'espace. Par exemple le niveau
₇₆₄ de la nappe, à cause de variation micro-topographique peut être plus ou moins élevé,
₇₆₅ faire des flaques d'eau libre ou au contraire être quelques dizaines de centimètres sous
₇₆₆ la surface du sol. Conséquence de ces variations, ces micro-environnements abritent
₇₆₇ des communautés végétales et microbiennes différentes. Finalement ces conditions en-
₇₆₈vironnementales contrôlant les flux, ceux-ci varient également. Estimer ces variations
₇₆₉ est donc nécessaire afin de préciser dans quelle mesure elles influent sur le bilan de C.




FIGURE 3.1 – Répartition des 20 placettes de mesures suivant un échantillonnage aléatoire stratifié.

770 3.2 Procédure expérimentale et analytique

771 3.2.1 Méthodes de mesures

772 Mesures de flux de gaz

773 Les mesures des flux de CO₂ et de CH₄ ont été effectuées en utilisant la méthode
 774 décrite dans la partie 2.3. En juin 2011, 20 placettes ont été installées ¹ selon un échan-
 775 tillonnage aléatoire stratifié : La surface de la tourbière a été divisée selon une grille de
 776 20 mailles et un point choisi aléatoirement dans chaque maille localise chaque placette.
 777 La taille de la maille a été ajustée de manière à avoir vingt 20 carrés sur la surface de
 778 la tourbière. Cette méthode permet de conserver un échantillonnage aléatoire tout en

¹. je remercie ici Sébastien Gogo pour avoir installé ces placettes sur le terrain avant même mon arrivée.

3.2. Procédure expérimentale et analytique

étant assuré d'avoir une représentativité homogène du site. Les placettes, délimitées par des piquets, occupaient une surface de 4 m^2 ($2\times 2\text{ m}$), à l'intérieur de laquelle ont été installé de façon permanente un piézomètre et une embase permettant la mesure des flux de gaz (Les embases sont décrites dans le chapitre 2, partie 2.3.2). Usuellement les placettes sont séparées en groupes micro-topographique (Figure 1.1), avec des embases positionnées sur les buttes (*hummock*), les trous (*hollows*) et les zones d'eau libre (*pool*) (Alm *et al.*, 1997; Waddington et Roulet, 2000). Ceci a l'avantage de permettre une distinction fine des capacités sources/puits mais a l'inconvénient du placement proche des embases les unes des autres limitant la représentativité spatiale des mesures. Elles peuvent également être séparées en zone dans la tourbière, haut-marais *versus* bas-marais, ou réhabilité *versus* non-réhabilité. Afin de gagner en représentativité spatiale, la taille du site le permettant, il a été décidé de positionner des placettes sur l'ensemble du site. De plus, du fait de l'omniprésence de végétation vasculaire, et de la taille des chambres par rapport à la micro-topographie une telle approche était difficile à mettre en oeuvre.

Les flux de CO₂ et de CH₄ sont mesurés. Des tests effectués sur la tourbière ayant montré des émissions nulles de N₂O, ce gaz n'a pas été étudié. Les mesures de CO₂ ont été effectuées de mars 2013 à février 2015, avec une fréquence quasiment mensuelle (20 campagnes, pour 24 mois de mesures). Les mesures de CH₄ ont été effectuées avec une fréquence et sur un nombre d'embases inférieur (12 campagnes, 5 embases). Ceci a été déterminé par la difficulté de déploiement *in-situ* de l'instrument SPIRIT (lourd, difficilement transportable dans un milieu tourbeux).

Les facteurs contrôlant mesurés manuellement sont la pression atmosphérique, le rayonnement photosynthétique actif (*photosynthetically active radiation*, PAR), les températures du sol à différentes profondeurs, la végétation (pourcentage de recouvrement), le niveau de la nappe d'eau. Des prélèvements d'eau ont été effectués chaque mois pour mesurer le pH et la conductivité (mesures effectuées sur le terrain après les mesures de flux). Les échantillons ont été congelés pour la mesure ultérieure de la concentration en carbone organique dissout. Ces mesures nécessitant d'accéder aux placettes régulières.

808 lièrement, des planches de bois ont été utilisées comme pontons mobiles pour limiter
809 les perturbations. La dispersion des placettes sur l'ensemble du site a rendu impossible
810 une installation plus permanente.

811 Les mesures automatiquement acquise via une station météo Campbell sont la tem-
812 pérature de l'air, température de la tourbe à -5, -10, -20 et -40 cm de profondeur,
813 vitesse et direction du vent, humidité relative de l'air, rayonnement solaire, pression
814 atmosphérique.

815 **3.2.2 Modélisation du bilan de C**

816 **Estimation du bilan et variabilité temporelle**

817 Pour estimer le bilan de carbone du site il est nécessaire d'établir des modèles
818 reliant des flux mesurés ponctuellement avec des variables explicatives mesurées à haute
819 fréquence (e.g. relation entre la respiration de l'écosystème et la température de l'air).
820 Ces relations empiriques permettront d'interpoler les données acquises mensuellement
821 sur l'ensemble des deux années de mesure et de reconstituer ainsi une chronique de flux
822 dont l'intégration dans le temps permettra d'estimer une quantité sur l'année. Pour
823 établir ces modèles empiriques les données acquises ont été moyennées par campagne
824 de mesure. Ceci permettant, dans un premier temps, de s'affranchir de la variabilité
825 spatiale des flux pour se concentrer sur la variabilité temporelle. Les relations entre
826 flux et facteurs contrôlant ont ensuite été étudiées deux à deux.

827 La RE, et l'ENE sont mesurés directement sur le terrain. Cependant afin d'établir
828 le bilan de C tout en gardant une discrimination entre flux d'entrée et de sortie la RE et
829 la PPB (obtenue grâce à l'équation $PPB = ENE - RE$) ont été modélisé séparément.
830 Les flux en phase gazeuse ont été modélisés en partant d'équations usuellement utilisées
831 et dans lesquelles la température est le facteur contrôlant majeur. Puis les résidus² de
832 ces modèles de base ont ensuite été étudiés en fonction des facteurs de contrôle restant.
833 Dans le cas où une tendance est visible, le facteur est intégré.

2. Valeurs moyennes - Valeurs moyennes estimées

3.2. Procédure expérimentale et analytique

834 Les modèles ont été comparés avec différents indicateurs : Le coefficient de dé-
835 terminaison (R^2), l'erreur standard normalisée (*Normalised Root Mean Square Error*,
836 NRMSE) et le critère d'information d'Akaike (*Akaike Information Criterion*, AIC). Le
837 R^2 est utilisé comme indicateur de la proportion de la variabilité des données expliquée
838 par le modèle, sa valeur est comprise entre 0 et 1. La RMSE et sa normalisation par la
839 moyenne NRMSE sont utilisés comme indicateur de l'écart entre les données mesurées
840 et les données modélisées. L'AIC permet de déterminer la pertinence de l'ajout d'un
841 paramètre sur la représentation des données par le modèle.

842 La température a été choisie comme base de départ à la construction des modèles
843 de RE et PPBsat, à la fois car c'est le facteur de contrôle le plus souvent invoqué et à
844 la fois car les corrélations avec les flux étaient les plus forte. Concernant la respiration
845 de l'écosystème, les températures utilisées dans la littérature sont variables. La tem-
846 pérature la plus utilisée est la température du sol à -5 cm (Ballantyne *et al.*, 2014).
847 La température de l'air et la température du sol à -10 cm sont aussi régulièrement
848 utilisées (Bortoluzzi *et al.*, 2006; Kim et Verma, 1992). Cette profondeur, -5 cm, est
849 régulièrement utilisée car c'est dans la tourbe, proche de la surface que la respiration
850 du sol est la plus importante. **production CO2 ? profils ?** C'est également à des
851 profondeurs relativement faibles que se situent la majorité des racines (**Réf needed**).
852 La respiration liée aux racines (autotrophe et hétérotrophe stimulée par les exsudats
853 racinaires) peut contribuer à la respiration du sol (**de l'écosystème ?**) pour 35 à 60 %
854 (Silvola *et al.*, 1996; Crow et Wieder, 2005). La RE est estimée directement à partir
855 des données acquises moyennées en partant de la température connue pour contrô-
856 ler une grande partie de ce flux. Les modèles les plus fréquemment utilisés (linéaire,
857 exponentiel, arrhénius) ont été testés.

858 Pas de consensus émerge de la littérature quant aux facteurs contrôlant les émissions
859 de CH₄. La température, (Alm *et al.*, 1999; Bubier *et al.*, 1995), le niveau de la nappe
860 (Bubier *et al.*, 1993) et/ou la végétation (Bortoluzzi *et al.*, 2006) peuvent être utilisés
861 isolément ou conjointement.

862 Après la phase de calibration, les facteurs de contrôle utilisés dans les modèles

863 ont été évalués à l'aide de données indépendantes issues d'une autre expérimentation
864 réalisée sur le même site en 2014. Les méthodes de mesures des flux sont strictement
865 identiques à celles utilisées pour établir le bilan de carbone. En revanche le position-
866 nement des placettes est beaucoup plus standard avec 4 placettes dans une station en
867 amont et 4 en aval de la tourbière de La Guette (plus de détails dans l'annexe **XXX**).
868 Le terme d'évaluation est préféré à celui de validation car le nouveau jeu de données
869 utilisé bien qu'indépendant de celui utilisé pour la calibration n'a pas été acquis de
870 manière strictement identique, notamment au niveau de la répartition des embases sur
871 le site.

872 Enfin les facteurs contrôlants ont été interpolés au pas de mesure de la station
873 météo présente sur le site, c'est-à-dire à l'heure. L'interpolation étant soit une simple
874 interpolation linéaire entre les données mensuelles, soit une relation avec les facteurs
875 acquis par la station météorologique. À l'aide de ces interpolations et des équations les
876 flux ont ensuite été recalculés, à l'échelle horaire, sur les 2 années de mesure puis les
877 flux ont été sommés afin de calculer les bilans.

878 Étude de la variabilité spatiale

879 Deux approches ont été testées afin de caractériser la variabilité spatiale des flux et
880 du bilan. La première consiste à calibrer par placette les modèles sélectionnés lors de la
881 modélisation à l'échelle de l'écosystème. Cette opération permet ainsi calculer des flux
882 par placette et éventuellement un bilan. L'inconvénient de cette méthode étant le faible
883 nombre de points permettant la calibration des modèles conduisant éventuellement à
884 une forte erreur sur l'estimation des paramètres voire à la non convergence des modèles.
885 La seconde approche permet de palier en partie à ce souci en faisant des groupes de
886 placette. Ces ensembles de placette ont été fait en regroupant les placettes ayant la
887 composition végétale la plus proche. Ce choix se justifie par le fait que la végétation
888 joue un rôle important tout en étant délicate à prendre en compte. La température,
889 plus facile à mesurer et le niveau de la nappe, qui n'a que peu varié, semblait des choix
890 moins pertinent. Le partitionnement a été faite via une classification hiérarchique et




FIGURE 3.2 – Partitionnement des placettes en fonction de leur similarité en termes de composition végétale (pourcentage des strates muscinales, herbacées et arbustives)

⁸⁹¹ quatre groupes ont été déterminés (Figure 3.2).

⁸⁹² 3.3 Résultats

⁸⁹³ 3.3.1 Cinétique des facteurs contrôlant et des flux sur la tour-bière de La Guette

⁸⁹⁵ Les Facteurs contrôlant

⁸⁹⁶ L'évolution du niveau de la nappe des 20 placettes est marquée par un étiage d'une
⁸⁹⁷ vingtaine de centimètres en moyenne en 2013 et l'absence d'un étiage net en 2014
⁸⁹⁸ (Figure 3.3). Le niveau de la nappe moyen se situe à -10 cm Ces observations sont
⁸⁹⁹ cohérentes avec les mesures haute fréquence (Figure 2.5), et confirment l'étiage parti-




FIGURE 3.3 – Évolution du niveau de la nappe moyen des 20 embases mesuré pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)

900 culièrement haut de ces 2 années vis-à-vis des précédentes.

901 La température de l'air mesurée manuellement montre une variabilité saisonnière
 902 cohérente avec celle mesurées par la station météo. La variabilité saisonnière de la
 903 température est également visible dans le sol avec cependant un amortissement et une
 904 diminution de la variabilité avec la profondeur (figure 3.4)

905 La conductivité moyenne mesurée sur le site varie entre 35 and 55 $\mu\text{S m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (fi-
 906 gure 3.5).

907 En moyenne le pH mesuré sur la tourbière de La Guette est compris entre 4 et 5
 908 (figure 3.6). Ces valeurs sont cohérentes avec la classification en *poor-fen* du site .

909 La concentration en carbone organique dissous présente dans l'eau de la tourbière
 910 est compris en moyenne entre 10 et 30 mg L^{-1} (figure 3.7).

911 Les flux de carbone

912 L'ensemble des mesures de CO_2 s'étendent de mars 2013 à février 2015. Cependant
 913 de novembre 2013 à février 2014 les mesures ont été interrompue suite à des problèmes
 914 techniques. Les deux saisons de végétation, ont pu être mesurées dans leur ensemble,
 915 permettant d'avoir un jeu de données représentatif sur le fonctionnement de l'écosys-
 916 tème. À noter également que pour l'ensemble des flux, la déviation standard augmente
 917 avec les valeurs mesurées.

3.3. Résultats




FIGURE 3.4 – Évolution des températures de l'air (Tair) et du sol à -5 , -30 , -50 et -100 cm (T5, T30, T50 et T100 respectivement) moyenne mesurée lors des campagnes de terrain de mars 2013 à février 2015




FIGURE 3.5 – Évolution de la conductivité pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)




FIGURE 3.6 – Évolution du pH pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)




FIGURE 3.7 – Évolution de la concentration en carbone organique dissous dans l'eau du sol pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)

3.3. Résultats




FIGURE 3.8 – Évolution du niveau de PPB, RE et ENE pendant la période de mesure. Moyenne des 20 embases de mars 2013 à février 2015.

918 En 2013, les valeurs de la PPB (flux de CO₂ entrant dans l'écosystème) augmentent
919 au printemps et une partie de l'été avec un maximum de $12,80 \pm 4,91 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$
920 atteint fin juillet, avant de diminuer à partir d'août (Figure 3.8a). En 2014 la PPB
921 maximale est atteinte en juin ($13,16 \pm 4,70 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), soit environ un mois plus tôt
922 que l'année précédente. Puis pendant l'été et l'automne les valeurs décroissent jusqu'à
923 être proche de 0. En moyenne les valeurs de la PPB sont de $7,12 \pm 5,19 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$
924 en 2013 et de $6,56 \pm 4,72 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ en 2014 (Figure 3.8a).

925 La RE (flux de CO₂ sortant de l'écosystème) en 2013 augmente pendant le prin-
926 temps et une partie de l'été (Figure 3.8b). Elle atteint un maximum de $9,43 \pm 3,48 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$
927 en juillet avant de diminuer. En 2014 la RE atteint, comme la PPB, son maximum plus
928 tôt, en juin à $7,83 \pm 2,55 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ avant de décroître jusqu'en hiver pour approcher
929 des valeurs nulles. La moyenne annuelle de RE en 2013 est de $4,27 \pm 3,16 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$,
930 ce qui est légèrement supérieure à celle de 2014 : $3,63 \pm 2,56 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (Figure 3.8b).

931 Concernant l'ENE (bilan des flux de CO₂ entrant et sortant), elle augmente en 2013
932 jusque $5,19 \pm 4,51 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, avec un maximum en juin, avant de diminuer jusqu'à
933 la fin de l'année. Cependant, cette baisse est moins homogène que celle des deux flux
934 précédents, avec notamment une augmentation de l'ENE entre juillet et août 2013.
935 Ceci étant, il faut également noter les valeurs importantes de la déviation standard
936 particulièrement en juin et en août. En 2014, l'ENE maximum est atteinte en juillet
937 avec $5,79 \pm 2,77 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ avant qu'elle ne décroisse. Cette baisse est cependant plus
938 homogène qu'en 2013. les moyennes de l'ENE en 2013 et 2014 sont très proches et sont
939 respectivement de $2,85 \pm 3,05 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ et $2,93 \pm 2,77 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (Figure 3.8c).

940 Les flux de CH₄ comme ceux du CO₂ montrent une variabilité saisonnière importante.
941 Cependant les flux de CH₄ mesurés sont un ordre de grandeur en dessous de ceux
942 mesurés pour le CO₂ (Figure 3.9). À l'inverse de ce dernier, l'importance des flux de
943 CH₄ mesurés en 2013 et 2014 est différente. En 2013 les flux sont moins importants
944 qu'en 2014 avec des maximum de $0,078$ et $0,196 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ respectivement.

3.3. Résultats




FIGURE 3.9 – Évolution des flux de méthane moyen (N ?) pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)




FIGURE 3.10 – Relations entre les flux de gaz et une sélection de facteurs contrôlant

945 Les relations flux gazeux et facteurs contrôlant

946 Comme précisé précédemment, le niveau de la nappe n'a que peu varié pendant les
 947 deux années de mesures. De ce fait aucune relation claire ne se distingue entre les flux
 948 et le niveau de la nappe que ce soit pour le CO₂ (PPB et RE) ou le CH₄ (Figure 3.10).
 949 La PPB et la RE présentent cependant des relations avec la température de l'air,
 950 et l'indice de végétation, même si pour ce dernier les tendances sont moins claires,
 951 particulièrement pour la RE (Figure 3.10). Le CH₄ quant à lui ne présente pas de
 952 relation avec la température de l'air, mais une tendance exponentielle est visible vis-à-
 953 vis de l'indice de végétation (Figure 3.10). (**CH₄ et Température dans la tourbe ?**)

954 3.3.2 Sélection des modèles

955 La Production Primaire Brute

956 L'estimation de la PPB se fait en deux étapes. Dans un premier temps on estime le
 957 potentiel maximum de photosynthèse à un instant donné dans des conditions de lumière
 958 saturante (PPBsat). Ce potentiel peut varier avec les conditions environnementales et
 959 a été déterminé en utilisant l'équation de (June *et al.*, 2004) qui relie la vitesse de
 960 transport des électrons photosynthétiques à lumière saturante à la température :

$$PPBsat = a * \exp\left(\frac{Tair - b}{c}\right)^2 \quad (3.1)$$

961 Avec a la vitesse de transport des électrons photosynthétique à lumière saturante, b
 962 la température optimale pour ce transport et c la différence de température à laquelle
 963 à laquelle PBBsat vaut e⁻¹ de sa valeur à la température optimale. À partir de ce
 964 potentiel à lumière saturante, la PPB est estimée en prenant en compte la lumino-
 965 sité. On utilise l'équation 3.2 proposée par (Bubier *et al.*, 1998) et régulièrement et
 966 majoritairement utilisée (Bortoluzzi *et al.*, 2006; Worrall *et al.*, 2009) :

$$PPB = \frac{PPBsat * a * PAR}{PPBsat + a * PAR} \quad (3.2)$$

3.3. Résultats




FIGURE 3.11 – PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.1

967 L'utilisation de l'équation de June seule, avec la température de l'air comme variable
 968 explicative de la PPBsat, permet d'expliquer 66 % des variations observées avec une
 969 erreur standard de l'estimation de 32 % (Figure 3.11-a). Les résidus de ce modèle se ré-
 970 partissent de façon relativement homogène et non biaisée (Figure 3.11-b). Corrélés avec
 971 l'indice de végétation IV, ils présentent une tendance linéaire croissante (Figure 3.11-
 972 c). On observe la même tendance avec le recouvrement de la strate herbacée avec une
 973 dispersion des points plus importante (Figure 3.11-d). Par contre aucune tendance par-
 974 ticulièrue n'est visible vis-à-vis du niveau de la nappe (Figure 3.11-e) Le recouvrement
 975 des sphaignes (non présenté) ne montre également, aucune tendance avec les résidus
 976 de cette équation. La PPB calculée à partir de l'équation 3.1 montre une erreur stan-
 977 dard de 31 %, du même ordre de grandeur que celle de PPBsat (Figure 3.11-f) et les
 978 résidus se répartissent de façon relativement homogène et non biaisée (Figure 3.11-g).
 979 Cependant l'évaluation du modèle sur les données de tests montre une erreur stan-
 980 dard de l'estimation plus forte qui atteint 47% (Figure 3.11-h). Par ailleurs une forte
 981 incertitude est présente concernant l'estimation des paramètres qui ont tous une erreur
 982 standard importante, parfois plus importante que la valeur du paramètre, et une faible
 983 significativité (Tableau 3.1). Afin de prendre en compte la tendance linéaire entre les
 984 résidus et l'indice de végétation (IV) le modèle est adapté pour y intégré une fonction
 985 linéaire de la végétation :

$$PPBsat = (a * IV + d) * \exp\left(\frac{T - b}{c}\right)^2 \quad (3.3)$$

986 Cette nouvelle équation permet d'expliquer une part plus importante des varia-
 987 tions de PPBsat ($R^2 = 0,85$) et augmente la proximité entre les données mesurées et
 988 les données modélisées : l'erreur standard diminue à 21 %. (Figure 3.12-a). Les résidus
 989 de cette équation semblent répartis de façon moins homogène que précédemment. On
 990 observe notamment un resserrement des points autour de zéro à l'exception d'un point
 991 de valeur supérieur à 4. Le biais reste malgré tout léger au regard de l'amélioration ap-
 992 portée. Aucune tendance claire ne se dégage des résidus lorsqu'ils sont mis en relation
 993 avec des facteurs contrôlant tel que les recouvrements végétaux (sphaignes, herbacées),

3.3. Résultats




FIGURE 3.12 – PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.3

ou le niveau de la nappe (Figure 3.12-c,d,e). Comme précédemment, l'erreur standard de la PPB, de 19 %, est du même ordre de grandeur que celle de PPBsat. Pour PPBsat comme pour PPB l'erreur standard diminue avec l'ajout de l'indice de végétation lors de la calibration. En revanche, l'évaluation sur les données de test de ce dernier modèle montre une erreur importante (58 %), supérieure à celle du modèle ne prenant pas en compte la végétation. Cette évaluation montre également une tendance importante à sous-estimer les valeurs mesurées. Néanmoins ce modèle intégrant la végétation permet de diminuer de façon importante l'erreur standard associée à l'estimation des paramètres de l'équation. Dans la suite du texte le modèle permettant d'estimer la PPB à partir des équations 3.1 et 3.2 sera nommé PPB-1 et celui utilisant les équations 3.3 et 3.2 sera nommée PPB-2.

1005 La Respiration de l'Écosystème

L'estimation de la RE s'effectue avec l'équation :

$$RE = a * \exp(b * T) \quad (3.4)$$

La température de l'air utilisée dans un modèle exponentiel permet d'expliquer 90 % des variations de la respiration de l'écosystème avec une erreur standard de 18 % (Figure 3.13-a). Les résidus de cette équation semblent répartis de façon non-biaisée, pas de tendance dans le nuage de point (Figure 3.13-b). L'évaluation de ce modèle montre une erreur standard de 35 % avec une tendance à sous-estimer les valeurs mesurées. Une légère tendance, moins claire que pour la PPBsat, est visible entre les résidus et l'indice de végétation ainsi qu'avec le recouvrement de la strate herbacée. Très souvent utilisée, la température à -5 cm donne des résultats proche mais moins bons notamment avec une hétéroscédasticité des résidus (**Fig Annexe ? nope : M&M**). On adapte l'équation 3.4 pour intégrer le signal de végétation :

$$RE = (a * IV + c) * \exp(b * T) \quad (3.5)$$

3.3. Résultats




FIGURE 3.13 – RE modèles avec Tair

$$RE = (a * H + c) * \exp(b * T) \quad (3.6)$$

1017 Les calibrations de ces nouvelles équations sont présentées dans la figure 3.13-a,b et
 1018 3.13-d,e respectivement. Dans les deux cas, l'erreur diminue pour avoisiner 13 %, avec
 1019 des résidus qui se répartissent de façon non-biaisée. L'évaluation de ces deux équations
 1020 montre cependant des différences : D'un côté l'équation 3.5 ne permet pas de diminuer
 1021 l'erreur standard qui vaut 34 %, et est donc très proche des 35 % calculé pour l'évalua-
 1022 tion du modèle n'intégrant pas la végétation. De l'autre l'évaluation de l'équation 3.6
 1023 montre une erreur standard plus faible s'établissant à 23 %. Les paramètres des diffé-
 1024 rentes équations sont présentés dans le tableau 3.1, les modèles RE-1, RE-2, et RE-3
 1025 correspondent respectivement aux équations 3.4, 3.5 et 3.6. À l'inverse de la PPB les
 1026 paramètres des modèles de la RE ont, à l'exception du paramètre c du modèle RE-2,
 1027 une significativité importante et une erreur standard faible.




FIGURE 3.14 – RE modèles avec Tair

1028 Le flux de CH₄

1029 Les relations entre les facteurs contrôlant mesurés et le CH₄ sont moins claires que
 1030 celles concernant le CO₂. La corrélation la plus importante est liée à la végétation (R^2
 1031 = XX, Figure 3.10). le CH₄ est également corrélé avec les températures, faiblement avec
 1032 les températures de surface, mais de manière plus importante avec les températures du
 1033 sol à plus forte profondeur ($R^2 = XX$, Figure 3.10). Enfin il est anti-corrélé ($R=-0.51$)
 1034 avec le niveau de la nappe. Les relations CH₄ et végétation ont donc pu être modélisées
 1035 avec

$$F_{CH_4} = a * \exp(b * IV) \quad (3.7)$$

1036 Avec les données acquises, l'indice de végétation est le meilleur prédicteur (Fi-
 1037 gure 3.15), il explique 78 % de la variabilité du CH₄ avec une erreur standard de 32 %.
 1038 Aucune tendance ne semble se dégager entre les résidus de cette équation et les facteurs
 1039 contrôlant mesurés. L'évaluation de cette équation montre une tendance à sous-estimer

3.3. Résultats




FIGURE 3.15 – CH₄ modèle H

les flux de CH₄ et une erreur standard qui double par rapport à la phase de calibration en atteignant 68 %. Les détails de l'estimation des paramètres de l'équation 3.7 est visible dans le tableau 3.1 sous le nom FCH4.

Le COD

3.3.3 Le bilan de carbone de la tourbière de La Guette à l'échelle de l'écosystème

L'interpolation des flux de PPB montrent une variabilité saisonnière proche de celle mesurée sur le terrain (Figure 3.16). Les valeurs mesurées les plus grandes (partie supérieure de la barre rouge sur la figure 3.16) ne semblent pas atteinte par le modèle PPB-2 à l'inverse du modèle PPB-1 (courbes noires sur la figure 3.16). Dans les deux cas les modèles semblent sur-estimer la valeur de PPB mesurées fin 2014.

Pour la RE, l'interpolation suit également les variations saisonnières mesurées mensuellement (Figure 3.17). Les gammes de valeurs mesurées sont très proche des gammes

Tableau 3.1 – Valeur des paramètres des équations utilisées pour modéliser les flux et sensibilité relative (en %) des flux en réponse à une variation de $\pm 10\%$ de chacun des paramètres des modèles.

par	valeur	se	pval	-10 %	+10 %
PPB-1 – équations 3.1 et 3.2					
a	26.23	62.07	0.68	-9.7	+9.6
b	53.68	61.27	0.39	+43.7	-35.1
c	27.21	28.56	0.35	-22.5	+21.9
i	1.84	21.6	0.93	-0.4	+0.4
PPB-2 – équations 3.3 et 3.2					
a	39.44	18.89	0.05	-11.8	+11.5
b	40.27	19.11	0.05	+15.8	-17.2
c	25.23	14.35	0.1	-8.1	+6.7
d	-3.73	3.49	0.3	+2.8	-2.8
i	0.26	0.25	0.31	-1.3	+1.1
RE-1 – équation 3.4					
a	0.34	0.08	0	-10	+10
b	0.10	0.01	0	-22.6	+29.9
RE-2 – équation 3.5					
a	0.92	0.34	0.02	-7.3	+7.3
b	0.09	0.01	0.00	-19.5	24.7
c	0.14	0.09	0.14	+2.7	-2.7
RE-3 – équation 3.6					
a	0	0	0.01	-3.9	+3.9
b	0.08	0.01	0	-18.8	+23.6
c	0.33	0.06	0	-6.1	+6.1
FCH4 – équation 3.7					
a	0	0	0.48	-10	+10
b	13.01	2.82	0	-43.9	+79.2

3.3. Résultats






FIGURE 3.16 – Flux de CO₂ interpolé à partir de PPB-1 et PPB-2

1053 interpolées : les valeurs interpolées fluctuent dans les limites des barres d'erreurs. L'in-
 1054 terpolation des flux de la RE est très proche quel que soit le modèle utilisé (Figure 3.17).
 1055 L'intégration de la végétation dans les modèles RE-2 et RE-3 diminue la RE maximum
 1056 modélisée en 2013 par rapport au modèle RE-1.

1057 Les flux de CH₄ interpolés (Figure 3.18), suivent également une cyclicité saisonnière.
 1058 L'estimation du CH₄ semble rendre compte dans les grandes lignes de la différence de
 1059 flux mesurée entre 2013 et 2014.

1060 Les flux interpolés à l'heure puis sommés par années sont présentés dans le ta-
 1061 bleau 3.2 pour les différents modèles. Sur les deux années, selon le modèle utilisé, le
 1062 flux total entrant via la PPB est estimé à 1070 et 1290 gC m⁻² an⁻¹ pour PPB-2 et
 1063 PPB-1 respectivement. Dans le détail on observe une différence entre les deux modèles :
 1064 Celui utilisant uniquement la température de l'air (PPB-1) présente un stockage plus
 1065 important en 2013 qu'en 2014. Tandis que le modèle prenant en compte la végétation
 1066 (PPB-2) stocke moins de carbone en 2013 qu'en 2014. L'intégration de la végétation


 FIGURE 3.17 – Flux de CO₂ interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3

 FIGURE 3.18 – Flux de CO₂ interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3

3.3. Résultats

Tableau 3.2 – Bilan des flux en gCm²an⁻¹

ID	Flux	équation	2013	2014	moyen
PPB-1	PPB	3.1 et 3.2	1322 ± 410	1258 ± 390	1290 ± 400
PPB-2		3.3 et 3.2	957 ± 182	1184 ± 225	1070 ± 203
RE-1	RE	3.4	1337 ± 241	1235 ± 222	1286 ± 231
RE-2		3.5	1232 ± 160	1310 ± 170	1271 ± 165
RE-3		3.6	1240 ± 161	1281 ± 167	1261 ± 164
FCH4	CH4	3.7	10 ± 3	24 ± 8	17 ± 5

¹⁰⁶⁷ minimise également l'erreur standard de l'estimation, la divisant approximativement
¹⁰⁶⁸ par deux.

¹⁰⁶⁹ La différence de comportement, entre les années de mesures, liée à l'intégration de
¹⁰⁷⁰ la végétation est également visible sur l'estimation de la RE. La prise en compte de la
¹⁰⁷¹ végétation (modèles RE-2 et RE-3) conduit à une respiration plus forte en 2014 qu'en
¹⁰⁷² 2013 à l'inverse de RE-1. La différence entre l'estimation de la RE en 2013 et en 2014
¹⁰⁷³ diminue avec l'intégration de la végétation. Elle passe de 102 pour RE-1 à 78 puis
¹⁰⁷⁴ 41 pour RE-2 et RE-3. Malgré ces différences, on observe une grande proximité dans
¹⁰⁷⁵ les valeurs des flux interpolés sur les 2 années, quel que soit le modèle, avec un écart
¹⁰⁷⁶ maximum de 25 gC m⁻² an⁻¹.

¹⁰⁷⁷ Les flux de CH₄ estimés ont une erreur importante et sont beaucoup plus faible que
¹⁰⁷⁸ les flux de la PPB ou de la RE. Le flux de CH₄ est au moins deux fois plus important
¹⁰⁷⁹ en 2014 qu'en 2013.

¹⁰⁸⁰ Les bilans issus des différentes combinaisons de modèles (à l'exception de RE-3, non
¹⁰⁸¹ présenté car très proche de RE-2) varient de -233 gC m⁻² an⁻¹ à +12 gC m⁻² an⁻¹
¹⁰⁸² stocké dans la tourbière (tableau 3.3). L'intégration de la végétation dans la modélisa-
¹⁰⁸³ tion de PPB fait baisser les bilans de carbone dans le négatif (système source) au-delà
¹⁰⁸⁴ de -200 gC m⁻² an⁻¹, avec une différence entre les bilans de 220 gC m⁻² an⁻¹ environ.
¹⁰⁸⁵ La différence sur les bilans quand les modèles de RE utilisent ou non la végétation est
¹⁰⁸⁶ moindre : environ 26 gC m⁻² an⁻¹ (tableau 3.3).

Tableau 3.3 – Bilan des flux en gCm²an⁻¹

combinaison de modèles	2013	2014	moyen
PPB-1, RE-1, FCH4	-25	-2	-14
PPB-1, RE-3, FCH4	+72	-48	+12
PPB-2, RE-1, FCH4	-390	-75	-233
PPB-2, RE-3, FCH4	-293	-122	-208

 Tableau 3.4 – Sensibilité relative (en %) du bilan de CO₂ (ENE) en réponse à une variation de ±10 % de chacun des paramètres des modèles.

PPB	RE		CH ₄		-10 %	+10 %
	-10 %	+10 %	-10 %	+10 %		
PPB-1						
a	-3263	+3243	a	+3371	-3371	a
b	+14 788	-11 859	b	+7616	-10 078	b
c	-7597	+7398				
i	+119	-139				
PPB-2						
	RE-1		FCH4			
a	+59	-57	a	-60	+60	a
b	-78	+85	b	-135	+178	b
c	+40	-33				
d	-14	+14				
i	6,22	-5,40				
PPB-1						
	RE-3		FCH4			
a	-426	+423	a	+168	-168	a
b	+1931	-1548	b	+813	-1018	b
c	-992	+966	c	+263	-263	
i	-18	+15				
PPB-2						
	RE-3		FCH4			
a	+67	-65	a	-26	+26	a
b	-89	+97	b	-125	+157	b
c	+45	-38	c	-40	+40	
d	-16	+16				
i	+7,1	-6,1				

3.3. Résultats

1087 Évaluation du bilan

1088 L'analyse de sensibilité, consistant à faire varier chaque paramètre des modèles
1089 de $\pm 10\%$, les combinaisons de modèles PPB-1, PPB-2, RE-1 et RE-3 ont été testé
1090 (Tableau 3.4). Le modèle RE-2, très proche du modèle RE-3 n'a pas été testé. **Attente**
1091 **du COD, les valeurs du tableau sont fausse pour le moment**

1092 3.3.4 Variabilité spatiale du bilan

1093 Représentativité locale

1094 La classification hiérarchique a permis de distinguer 4 groupes de végétation (Fi-
1095 gure 3.21). Dans le premier groupe, la strate muscinale est majoritaire avec un recou-
1096 vrement moyen de 91 %, moins de 35 et 15 % de recouvrement pour les herbacées et les
1097 arbustes respectivement. Le deuxième groupe est le plus homogène avec un recouvre-
1098 ment moyen des strates muscinales et arbustives de 63 58 % chacune. C'est également
1099 le groupe où il y a de moins d'herbacées avec un recouvrement de 24 %. La strate her-
1100 bacée est majoritaire dans le troisième groupe avec un recouvrement moyen de 63 %, la
1101 strate arbustive y est peu présente (19 % en moyenne) et la strate muscinale y est pour
1102 ainsi dire absente (1 %). La strate muscinale est également absente, ou presque, dans
1103 le groupe quatre (1 %). Groupe dans lequel la strate arbustive est majoritaire avec de
1104 65 % de recouvrement moyen, et la strate herbacée avec 33 %.

1105 Les bilans de CO₂ calculés par groupe de végétations sont présentés dans le ta-
1106 bleau 3.5. On constate que du point de vue de l'ENE les groupes 1 et 2 sont relative-
1107 ment proche, et que le groupe 3 est du même ordre de grandeur bien qu'avec une ENE
1108 un peu moins négative. Le groupe 3 est le seul groupe présentant une ENE positive,
1109 du même ordre de grandeur que les précédentes en valeur absolue. Dans le détail, la
1110 RE est la plus forte, supérieure à 1200 gC m⁻² an⁻¹, dans les groupes 2 et 4. Elle est
1111 plus faible dans les groupes 1 et 3 (environ 1000 gC m⁻² an⁻¹). Pour la PPB, la va-
1112 leur la plus faible est dans le groupe 1 et la plus forte dans le groupe 3 avec plus de
1113 1300 gC m⁻² an⁻¹, soit une différence de plus de 600 gC m⁻² an⁻¹. Les groupes 2 et 4




FIGURE 3.19 – Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres des modèles RE-1 et RE-3

3.3. Résultats




FIGURE 3.20 – Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2




FIGURE 3.21 – Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2

Tableau 3.5 – Bilan des flux de CO₂ en gCm⁻²an⁻¹, en utilisant PPB-2 et RE-3

groupe	PPB-2	RE-3	ENE
1	714	1023	-308
2	1045	1385	-340
3	1323	1057	266
4	1002	1262	-260

¹¹¹⁴ sont relativement proches avec des valeurs intermédiaires avoisinant 1000 gC m⁻² an⁻¹.

¹¹¹⁵ Modélisation par placette

¹¹¹⁶ Corrélation avec facteurs contrôlant

¹¹¹⁷ 3.4 Discussion

¹¹¹⁸ 3.4.1 Estimations des flux

¹¹¹⁹ PPB

¹¹²⁰ L'estimation des flux de PPB, est comprise entre 957 et 1322 gC m⁻² an⁻¹ selon
¹¹²¹ l'année et le modèle utilisé. Ces valeurs sont très élevées comparées à des tourbières
¹¹²² boréales comme celles étudiées par ([Trudeau et al., 2014](#)) ou encore ([Peichl et al., 2014](#))
¹¹²³ dont les valeurs de PPB sont respectivement comprise entre 123 et 131 gC m⁻² an⁻¹
¹¹²⁴ et entre 203 et 503 gC m⁻² an⁻¹. Une première hypothèse permettant d'expliquer une
¹¹²⁵ telle différence, est la différence entre les températures moyennes sur les sites. -4,3 °C
¹¹²⁶ et 1,2 °C respectivement pour [Trudeau et al. \(2014\)](#) et [Peichl et al. \(2014\)](#). Ces tem-
¹¹²⁷ pératures sont bien plus faible pour les sites des études pré-citées que sur la tourbière
¹¹²⁸ de La Guette. Une seconde hypothèse, qui n'exclue pas la première, serait la com-
¹¹²⁹ position végétale de ces sites. La tourbière de La Guette envahie par une végétation
¹¹³⁰ vasculaire, notamment herbacée, est plus proche d'une prairie tourbeuse que d'une tour-
¹¹³¹ bière boréale. En effet les valeurs observées à La Guette sont comparables à ce type
¹¹³² d'écosystèmes. [Jacobs et al. \(2007\)](#) estiment des valeurs de PPB comprises entre 400 et

3.4. Discussion

1133 2000 gC m⁻² an⁻¹ avec une moyenne de 1300 gC m⁻² an⁻¹ dans des prairies tourbeuses
1134 hollandaises. Sur des écosystèmes similiaires, au Danemark, ([Görres et al., 2014](#)) trouve
1135 des valeurs de PPB plus importantes encore, entre 1555 et 2590 gC m⁻² an⁻¹. Il appa-
1136 rait cohérent que la tourbière de La Guette, par sa position géographique, et donc le
1137 climat qu'elle subit, mais également par sa problématique d'envasissement important
1138 par une végétation vasculaire notamment herbacée, s'approche en termes de flux de
1139 site tourbeux drainés pour les utiliser comme prairie.

1140 Le modèle PPB-1 a une incertitude importante sur l'estimation de ses paramètres.
1141 L'apport de l'indice de végétation dans l'estimation de la PPB est important lors de la
1142 phase de calibration. Il permet de diminuer l'incertitude sur les paramètres du modèles,
1143 d'augmenter leur significativité et d'améliorer la représentativité des données mesurées.
1144 L'intégration de la végétation aux modèles d'estimation de la PPB est rarement réalisé
1145 ([Bortoluzzi et al., 2006](#); [Görres et al., 2014](#)), probablement à cause de la difficulté à
1146 prendre en compte ce signal aux sources multiples. Malgré cette amélioration lors de la
1147 calibration, lorsqu'il est évalué sur un jeu de données indépendant, le modèle PPB-2 à
1148 une erreur standard plus importante que celle du modèle PPB-1. L'apport de cet indice
1149 dans l'estimation de la PPB n'est donc pas généralisable. Bien que rarement faite à
1150 cause de la rareté des données, l'évaluation des modèles est cependant d'un intérêt
1151 majeur afin de confirmer ou d'infirmer l'apport de l'ajout d'un prédicteur à un modèle,
1152 particulièrement si l'on souhaite l'extrapoler.

1153 Les différences observées selon la façon d'estimer la PPB peuvent paraître impor-
1154 tante, néanmoins elles sont du même ordre de grandeur que celle rencontré par [Worrall](#)
1155 *et al.* (2009) qui compare différentes façons de modéliser des flux de gaz avec des équa-
1156 tions différentes (et non pas juste des variations sur un type de modèle). Ces différences
1157 sont également liées à l'importance des flux qui font que, surtout dans le cas de mo-
1158 dèles exponentiels, de faibles variations peuvent avoir des effets importants comme en
1159 témoigne l'analyse de sensibilité des paramètres du modèle (Tableau 3.4).

1160 **Discussion 2013-2014 ?** Dans le détail l'intégration de l'indice de végétation à un
1161 effet beaucoup plus important en 2013, avec un flux qui diminue de 365 gC m⁻² an⁻¹,

1162 qu'en 2014 ou la baisse n'est que de $74 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$.

1163 **RE**

1164 De la même façon que pour la PPB, les flux de la RE sont importants si on les
1165 compare à des tourbières boréales et s'approchent davantage des flux mesurés dans
1166 les prairies sur sols tourbeux. La RE sur la tourbière de La Guette, comprise entre
1167 1232 et $1337 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ est plus importante que celle observée par ([Peichl et al., 2014](#);
1168 [Trudeau et al., 2014](#)) (pour reprendre les études citées précédemment) qui s'éta-
1169 blissent respectivement entre 137 et $443 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ et 206 et $234 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$. Elles
1170 sont en revanche plus faibles que celle mesurées par ([Jacobs et al., 2007](#)), entre 500 et
1171 2000 $\text{gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$, ou par ([Görres et al., 2014](#)) : entre 2070 et $3500 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$.

1172 À l'inverse de la PPB, l'intégration de la végétation pour modéliser la RE n'amé-
1173 liore que peu l'estimation de la RE lors de la phase de calibration : la différence entre
1174 les valeurs d'erreur standard est de 5 %. En revanche lors de la phase d'évaluation,
1175 l'utilisation du recouvrement des herbacées semble améliorer l'estimation de façon plus
1176 importante avec une différence de 11 % entre les valeurs d'erreur standard. Contraire-
1177 ment à la PPB la différence apportée par l'intégration de la végétation (RE-2 ou
1178 RE-3) est du même ordre de grandeur en 2013 et en 2014. Sur les 2 années, l'effet
1179 de l'intégration de la végétation est limité avec une différence de $25 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ au
1180 maximum (entre ER-1 et ER-3), soit moins de 2 % du flux. Encore une fois l'intérêt
1181 de l'évaluation est mis en avant puisqu'il permet de distinguer des modèles très proches
1182 lors de la calibration.

1183 Les incertitudes sur l'estimation des paramètres RE sont beaucoup moins impor-
1184 tantes que celle de la PPB. L'estimation des paramètres des modèles, à l'exception du
1185 paramètre c du modèles RE-2, ont une p-value inférieure à 0.05. L'erreur calculée lors
1186 de l'évaluation de ces modèles, si elle augmente par rapport à la calibration, reste
1187 faible particulièrement pour le modèle RE-3 où elle vaut moins de 25 %. La RE semble
1188 donc mieux contrainte que la PPB, avec une estimation des paramètres fiable et une
1189 différence entre les estimations issues des modèles limitée.

3.4. Discussion

1190 CH₄

1191 Les flux de CH₄ sont faibles comparés aux flux de CO₂. Les valeurs mesurées sont
1192 plus forte que celles mesurés entre 0 et 0,03 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ par [Bortoluzzi *et al.* \(2006\)](#).
1193 Pour 2013 les valeurs mesurées sont proches de celle mesurée par [Long *et al.* \(2010\)](#).
1194 L'absence d'étiage en 2014 explique peut-être le doublement des flux... (**Réf needed**)

1195 La faible relation observée entre le niveau de la nappe et les flux de méthane va dans
1196 le même sens que les observations faites par [Trudeau *et al.* \(2012\)](#) et (à développer, de
1197 ref ds trudeau2012)

1198 COD

1199 3.4.2 Estimations des bilans

1200 D'une manière générale, les bilans sont principalement contraints par les flux de
1201 CO₂, le CH₄ ne jouant qu'un rôle marginal en termes de quantité de carbone. Ces ob-
1202 servations sont cohérentes avec d'autres études comme [Bortoluzzi *et al.* \(2006\); Worrall](#)
1203 [et al. \(2009\)](#). La forte variabilité entre les différents bilans est à attribuer en grande
1204 majorité à l'erreur sur l'estimation du flux de PPB.

1205 Selon le bilan considéré, la tourbière de La Guette stocke de faible quantité de C
1206 de l'ordre d'une dizaine de grammes par mètre carré, ou émet du carbone dans l'at-
1207 mosphère de l'ordre de XX à plus de 200 gC $\text{m}^{-2} \text{ an}^{-1}$. Les estimations sont cohérentes
1208 avec le fait que la tourbière de La Guette a subie un drainage à l'aval (fossé de la
1209 départementale 926) induisant un envahissement par une végétation vasculaire.

1210 3.4.3 Sensibilité et limitations du bilan

1211 Les incertitudes les plus fortes du bilan sont sur les flux de CH₄ avec une erreur
1212 standard de 32 % lors de la calibration et de 68 % lors de la validation. Cette différence
1213 importante montre que l'estimation des flux de CH₄ à l'aide de l'indice de végétation
1214 a permis l'estimation de sa contribution au bilan de carbone de l'écosystème pour les
1215 années 2013 et 2014, mais que sont utilisés dans d'autre conditions (année sèche,

1216 haute MAT) est fortement limité. L'importance faible du CH₄ dans le bilan de carbone
1217 de la tourbière rend ces erreurs moins critiques que celles faite sur l'estimation de la
1218 PPB. Les incertitudes importantes sur la PPB, sont mises en évidence par les fortes
1219 variations des flux interpolés selon l'équation utilisée. Elles sont la source des variations
1220 observées en termes de bilan. L'ajout d'un indice de végétation diminue d'incertitude
1221 des paramètres du modèle, mais cet apport semble spécifique à l'étude, n'étant pas
1222 reflété par l'évaluation dont la végétation est relativement similaire à celle de l'étude
1223 spatiale. À l'inverse la RE est bien contrainte. Sur les 2 années la différence entre les
1224 différentes équations utilisées ne dépassent pas 25 gC m⁻² an⁻¹.

1225 **sensibilité du bilan au variation des paramètres**

1226 **limitations** Outre ces aspects ce bilan de carbone est aussi limité par sa repré-
1227 sentativité. Ainsi la strate arborée fortement présente dans certaines zones n'est pas
1228 directement prise en compte. De la même manière une partie restreinte de la tourbière
1229 mais néanmoins présente est constitué de touradons dont l'effet n'a pas été pris en
1230 compte.(Réf needed)(biblio effet microtype).

- 1231 — pas de cartographie (pas grave si p7 maj bien représentée par mdl ecos)
1232 — extrapolation sur d'autres site difficile (cf validation)

1233 **3.4.4 Représentativité locale du modèle**

1234 Distribution des paramètres

1235 Pourquoi certaines placette mieux que d'autres

1236 Concernant la respiration la représentativité locale des modèles calibrés à l'échelle
1237 de l'écosystème semble plus homogène pour le modèle RE-3 que pour le modèle RE-1.

1238 Une telle comparaison entre PPB-1 et PPB-2 n'a pas été possible car vu le faible
1239 nombre de données et la qualité relative des modèles PPB par rapport aux modèles
1240 RE, peu de modèles sont parvenus à converger pour PPB-1 (11 sur 20 placettes) et
1241 pour PPB-2 (17 sur 20 placettes).

3.4.5 Variation du bilan avec la végétation

Le calcul des bilans avec les groupes de végétation permet de mettre en évidence des comportements différents des flux selon la végétation majoritaire. Ainsi le groupe 3 dans lequel la strate herbacée est la plus importante est celui où la PPB est la plus forte. Ce point semble en cohérence avec la croissance annuelle importante des herbacées. À l'inverse le groupe 1 dans lequel la strate muscinale est la plus importante est également le groupe pour lequel la PPB est la plus faible. (**Réf needed**)

Pour la RE, ce sont les groupes 3 et 4 qui ont les flux estimés les plus importants avec une différence d'environ $200 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ avec les deux autres groupes. Malgré leurs différences, le groupe 2 possède une strate muscinale importante alors qu'elle est absente dans le groupe 3, ils ont en commun d'avoir une strate arbustive importante.

3.4.6 perspectives

cartographie ?

1255 4 Effets de l'hydrologie sur les flux de GES

1256

<small>1257</small>	4.1 Introduction	<small>82</small>
<small>1258</small>	4.2 Procédure expérimentale	<small>83</small>
<small>1259</small>	4.2.1 Expérimentation A	<small>84</small>
<small>1260</small>	4.2.2 Expérimentation B	<small>84</small>
<small>1261</small>	4.2.3 traitement	<small>85</small>
<small>1262</small>	4.3 Résultats	<small>86</small>
<small>1263</small>	4.3.1 Expérimentation A	<small>86</small>
<small>1264</small>	4.3.2 Expérimentation B	<small>89</small>
<small>1265</small>	4.3.3 tendances générales	<small>92</small>
<small>1266</small>	4.4 Discussion	<small>92</small>
<small>1267</small>	4.4.1 Comparaison aux mesures <i>in-situ</i>	<small>92</small>
<small>1268</small>	4.4.2 Effet des variations du niveau de la nappe sur les flux de gaz	<small>94</small>
<small>1269</small>	4.4.3 Effet cycles multiples	<small>95</small>
<small>1270</small>		
<small>1271</small>		
<small>1272</small>		

1273 4.1 Introduction

1274 Au cours des deux années qu'ont duré les suivis des émissions de flux de CO₂ et
1275 de CH₄ sur la tourbière de La Guette, le niveau de la nappe n'a que très faiblement
1276 varié comparé aux années précédentes bien plus sèches. En conséquence de cette faible
1277 variation peu de variations des flux ont pu y être relié. Malgré tout il est connu que
1278 l'hydrologie est un facteur contrôlant important des flux.

1279 Ainsi de nombreuses études on reliées les émissions de CO₂ au niveau de la nappe
1280 avec, cependant, des résultats et des conclusions variables. La majorité des études
1281 montrent qu'une tourbière dont le niveau de la nappe est abaissé, soit par un drainage,
1282 soit par une sécheresse, aura tendance à avoir un ENE plus faible : Ainsi [Strack et](#)
1283 [Zuback \(2013\)](#) expliquent des valeurs d'ENE plus faibles qu'escompté, par des mesures
1284 faites pendant une période relativement sèche. Une observation similaire est faite par
1285 [Aurela et al. \(2007\)](#) qui mesure un ENE plus faible lors d'une année sèche, sur une
1286 tourbière à Carex du sud de la Finlande. Ils attribuent la variation de l'ENE à une
1287 augmentation de la RE et à une baisse de la PPB, dans des conditions plus chaudes
1288 et plus sèches. [Peichl et al. \(2014\)](#) observent également une baisse de l'ENE lors d'une
1289 année où le niveau de la nappe baisse de façon importante, au delà de -30 cm. Ils
1290 expliquent cette baisse par une baisse de la PPB. Cette observation va dans le même
1291 sens que [Lund et al. \(2012\)](#) qui, lors de l'étude d'une tourbière située au sud de la suède,
1292 observent en 2008 une baisse de l'ENE. Les mesures de RE faites cette année là étant
1293 similaires à celles effectuées les autres années, ils lient cette baisse à une diminution
1294 de la PPB. En 2006, sur la même tourbière, [Lund et al. \(2012\)](#) observent une autre
1295 baisse de l'ENE. Mais cette fois, les mesures de PPB à leur tour similaires à celle
1296 des autres années n'expliquent pas cette baisse. À l'inverse de 2008, cette baisse est
1297 expliqué par une augmentation de la RE Ce paradoxe apparent est interprété grâce
1298 au type de sécheresse : courte et intense pendant la saison de végétation de 2006 et
1299 d'intensité plus faible mais d'une durée plus longue en 2008. Enfin et à l'inverse des

1300 résultats précédemment cités, [Ballantyne et al. \(2014\)](#) dans une étude des effets à long
 1301 terme d'une baisse du niveau de la nappe, n'observe que peu d'effet sur l'ENE tandis
 1302 que les flux de RE et de PPB augmentent tous deux. Toutes ces études montrent que
 1303 si le niveau de la nappe est incontestablement reconnu comme un facteur de contrôle
 1304 des flux de CO₂, il est difficile d'en dégager, avec certitude, un comportement valable
 1305 de façon générale.

1306 Concernant le méthane, une baisse du niveau de la nappe est généralement liée à
 1307 une baisse des émissions de CH₄, et inversement ([Strack et al., 2006; Pelletier et al.,](#)
 1308 [2007; Turetsky et al., 2008](#)). Cependant d'autres études, principalement dans des sites
 1309 où le niveau de la nappe est proche de la surface du sol, montrent une absence de
 1310 relation entre le niveau de la nappe et les émissions de méthane, voire une relation
 1311 inverse, avec des flux plus faibles liés à des niveaux de nappe plus élevés ([Kettunen](#)
 1312 [et al., 1996; Bellisario et al., 1999; Treat et al., 2007](#)). Là encore selon les conditions
 1313 environnementales, la relation entre les flux de CH₄ et le niveau de la nappe n'est pas
 1314 aisément généralisable.

1315 L'objectif de ce chapitre est donc d'explorer plus en avant l'effet du niveau de la
 1316 nappe sur les émissions de GES, effet peu ou pas visible *in-situ*. Plus précisément il
 1317 s'agit de déterminer l'effet de cycles de dessication/ré-humectation sur les émissions de
 1318 CO₂ et de CH₄.

1319 4.2 Procédure expérimentale

1320 L'étude des cycles de dessication/ré-humectation s'est effectué sur des mésocosmes,
 1321 prélevés sur la tourbière de La Guette. L'expérimentation a été testé durant l'été 2013
 1322 avec un seul cycle relativement long, on s'y référera par la suite comme l'expérimenta-
 1323 tion A. Cette expérimentation a été renouvelée l'été 2014 afin d'augmenter à trois le
 1324 nombre de cycles, ceux-ci étant plus court. On appellera cette seconde expérimentation,
 1325 l'expérimentation B (Tableau 4.1).

1326 4.2.1 Expérimentation A

1327 Le 12 avril 2013, ont été prélevés, sur la tourbière de La Guette 6 mésocosmes. Le
1328 prélèvement de mésocosmes s'effectue à l'aide de cylindres de PVC qui, dans un premier
1329 temps, posé sur le sol, permettent de faire un pré-découpage au couteau, puis dans un
1330 second temps sont insérés, délicatement, dans la tourbe. Les mésocosmes sont finale-
1331 ment dégagés en creusant de chaque côté (Figure 4.1). Les mésocosmes sont transportés
1332 au laboratoire où ils sont enterrés en extérieur et saturé en eau (eau prélevée dans la
1333 tourbière), afin que leur conditions hydrologique de départ soient les plus proche pos-
1334 sible (Figure 4.2). Trois mésocosmes sont choisi pour servir de contrôle, et trois vont
1335 subir un cycle de dessication/ré-humectation. À partir du 31 mars 2013 les précipita-
1336 tions ont été interceptées à l'aide d'abri bâchés installable rapidement en cas de pluie
1337 et la nuit. Ces interceptions ont été faites jusqu'au 17 juillet dans les 3 mésocosmes
1338 traités pour simuler une sécheresse. À cette date de l'eau est ajouté aux mésocosmes,
1339 que ce soit les contrôles ou les traitements, pour simuler de fortes précipitations.

1340 4.2.2 Expérimentation B

1341 Le 17 avril 2014, 6 nouveaux mésocosmes ont été prélevés sur la tourbières de La
1342 Guette et installé près du laboratoire, en suivant le même protocole que pour l'expéri-
1343 mentation A. Une station météo a été installée à côté des mésocosmes afin de mesurer
1344 la température de l'air, l'humidité relative, l'irradiation solaire, la vitesse et la direction
1345 du vent et les précipitations toutes les 15 minutes. Cette station permettait également
1346 l'enregistrement des températures mesurées par des sondes (T107) installées à -5, -10,
1347 et -20 cm. Les conditions météorologiques moins ensoleillée qu'en 2013 et l'objectif de
1348 suivre plusieurs cycles de dessication/réhumectation ont nécessité la mise en place
1349 d'un abaissement manuel du niveau de la nappe. Pendant les phases d'assèchement les
1350 niveaux de nappes des placettes traitées étaient donc abaissés en moyenne de 2,5 cm
1351 par jour. Le premier cycle de dessication/réhumectation dura du 30 juin au 6 juillet
1352 pour la phase de dessication est du 7 au 16 juillet pour la phase de réhumectation.



FIGURE 4.1 – Prélèvement des mésocosmes

Tableau 4.1 – Récapitulatif des mesures pour les deux expérimentations

expérimentation	A	B
année	2013	2014
réplicats	6	6
cycles	1	3
station météo	non	oui

¹³⁵³ Le deuxième cycle dura du 17 au 28 juillet et du 29 juillet au 3 aout, Enfin le dernier
¹³⁵⁴ cycle fut mesuré du 4 au 11 aout pour la dessication et du 12 au 14 aout pour la
¹³⁵⁵ réhumectation.

¹³⁵⁶ 4.2.3 traitement

¹³⁵⁷ Les flux sont moyennés par jour de mesure.




FIGURE 4.2 – Schéma d'un mésocosme

¹³⁵⁸ 4.3 Résultats

¹³⁵⁹ 4.3.1 Expérimentation A

¹³⁶⁰ Pendant la phase de dessication de l'expérimentation A, on observe une baisse du
¹³⁶¹ niveau de la nappe pour les placettes contrôles comme pour les placettes traitements
¹³⁶² (Figure 4.3–A). Malgré tout leur comportement est différent : les placettes contrôles ont
¹³⁶³ un niveau de nappe relativement élevé jusqu'au 24 juin puis ce niveau baisse fortement
¹³⁶⁴ alors que les placettes du groupe traité ont un niveau de nappe qui diminue de façon
¹³⁶⁵ plus continue sur l'ensemble de la phase. La remontée du niveau de la nappe s'effectue
¹³⁶⁶ de façon similaire pour les deux groupes. Enfin après la phase de ré-humectation, le
¹³⁶⁷ niveau de la nappe baisse à nouveau, plus rapidement pour le groupe traitement que
¹³⁶⁸ pour le groupe contrôle.

¹³⁶⁹ Les émissions de CH_4 , s'étendant de 0 et $0,3 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, sont relativement si-
¹³⁷⁰ milaires entre les deux groupes jusqu'au 24 juin 2013, date à partir de laquelle ils
¹³⁷¹ commencent à diverger (Figure 4.3–B). À cette date les émissions du groupe contrôle
¹³⁷² augmentent rapidement pour atteindre $0,55 \pm 0,31 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ tandis que celles du
¹³⁷³ groupe traité restent stable. Finalement mi-juillet, à la fin de la phase de dessicca-
¹³⁷⁴ tion les deux groupes retrouvent des niveaux d'émission similaires compris entre 0,1 et




FIGURE 4.3 – Expérimentation A : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux, CH_4 , RE, PPB, ENE en $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent à la phase de dessiccation (D) en rouge et à la phase de réhuméction (R) en bleu.

4.3. Résultats

1375 0,2 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Ces niveaux restent constant pendant toute la phase de réhumecta-
1376 tion, avant d'augmenter légèrement par la suite ; ils ne dépassent pas 0,25 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$
1377 mais franchissent la barre des 0,2 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$.

1378 Pendant la phase de dessication, les valeurs de la RE tendent à augmenter quel
1379 que soit le groupe de placettes considéré (Figure 4.3–C). Ces valeurs inférieures à
1380 2,5 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ début juin, atteignent environ 7 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ pour les deux groupes
1381 mi-juillet, avant la réhumectation. Dans le détail cependant les deux groupes ne se
1382 comportent pas de la même façon : la RE du groupe traité augmente régulièrement
1383 pendant l'ensemble de cette phase, tandis que les valeurs du groupe de contrôle res-
1384 tent, dans un premier temps, stable jusqu'à fin juin. La RE de ce groupe vaut alors
1385 $2,45 \pm 0,75 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ contre $3,26 \pm 0,46 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ pour le groupe traité. Cet
1386 écart, pouvant varier dans le temps, étant installé depuis le 9 juin. À partir de dé-
1387 but juillet, les valeurs de RE du groupe de contrôle augmentent fortement dépas-
1388 sant les valeurs du groupe traité. La RE de ce groupe atteint alors un maximum à
1389 $7,93 \pm 1,52 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ le 8 juillet avant de retrouver des valeurs proche de celles ob-
1390 servées dans le groupe traité. Cette augmentation brusque correspond temporellement
1391 à celle observée, pour le même groupe, dans les flux de CH₄. Lors de la phase de réhu-
1392 mectation, les flux de RE diminuent de façon très similaire pour les deux groupes ou
1393 ils atteignent un minimum proche de 2,75 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Ce minimum reste cependant
1394 plus élevé que les valeurs mesurées initialement. Après la phase de réhumectation, les
1395 flux des deux groupes restent relativement proches pendant le reste des mesures, où ils
1396 remontent à mesure que le niveau de la nappe diminue à nouveau.

1397 Pour les deux groupes, les flux de PPB restent relativement stables pendant la
1398 phase de dessiccation (Figure 4.3–D). Jusqu'au 24 juin, les flux des deux groupes sont
1399 très proches et sont compris entre 5 et 6 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ($5,29 \pm 0,76 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ de
1400 moyenne pour les deux groupes). Après cette date, et comme pour le CH₄ et la RE,
1401 les valeurs de la PPB du groupe de contrôle augmentent et s'écartent de celles me-
1402 surées dans le groupe traité, en attendant de les rejoindre avant la fin de cette phase
1403 de dessiccation. Par ailleurs, à la fin de cette phase, les flux diminuent légèrement at-

teignant un minimum proche de $3 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Pendant la phase de réhumectation, la PPB augmente très légèrement pour les deux groupes, le groupe de contrôle ayant des valeurs systématiquement supérieures à celles du groupe traité. Après la réhumectation, la PPB augmente un peu pour le groupe traité, atteignant un maximum de $5,83 \pm 1,61 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, et plus fortement pour le groupe de contrôle où le maximum atteint, de $10,17 \pm 3,30 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, est quasiment le double du précédent.

L'ENE mesuré sur les deux groupes est systématiquement supérieure pour le groupe contrôle, avec une évolution parallèle des flux pour les deux groupes (Figure 4.3–E). Pendant la phase de dessiccation l'ENE reste relativement constante jusque fin juin avec une valeur moyenne pour les deux groupes de $1,18 \pm 0,58 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. L'écart entre le groupe contrôle et le groupe traitement tend à augmenter du 10 au 30 juin environ, avant que les valeurs du groupe de contrôle ne rejoignent celles du groupe traité. Au delà du 24 juin, l'ENE baisse fortement pour les deux groupes pour atteindre un minimum proche de $-4,5 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Pendant la phase de réhumectation l'ENE monte rapidement pour atteindre $1,52 \pm 0,36$ et $2,15 \pm 1,47 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ pour le groupe de contrôle et de groupe traité respectivement. Après la réhumectation, l'ENE du groupe contrôle varie en suivant généralement les variations du niveau de nappe. Pour le groupe traité, l'ENE baisse par rapport au maximum atteint lors de la réhumectation puis se stabilise autour de 0.

Les variations du niveau de la nappe sont principalement liée à la RE (Figure 4.5–C) et, à travers elle, à l'ENE (Figure 4.5–G). L'effet des variations du niveau de la nappe sur la PPB est quasiment nul (Figure 4.5–E), même si la PPB semble diminuer aux plus fortes profondeurs. Pour le CH₄ il est également difficile de distinguer des tendances générales entre les flux et les niveaux de nappe (Figure 4.5–A).

4.3.2 Expérimentation B

Contrairement à l'expérimentation A, le niveau de nappe du groupe de contrôle de l'expérimentation B reste relativement constant pendant l'ensemble de la période de mesure. Le drainage artificiel du groupe traité permet d'abaisser le niveau de la nappe

4.3. Résultats




FIGURE 4.4 – Expérimentation B : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux, CH_4 , RE, PPB, ENE en $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent aux phases de dessiccation (D) en rouge et aux phases de réhumectation (R) en bleu.

1432 d'une quinzaine de centimètres en moyenne pour chaque cycle (Figure 4.4–A).

1433 Les flux de CH₄ moyen s'étendent de 0,07 à 0,34 µmol m⁻² s⁻¹. Les flux du groupe
1434 de contrôle, à l'exception de la première mesure, sont supérieurs aux flux du groupe
1435 traité, leurs moyennes respectives sur l'ensemble des mesures étant de 0,20 ± 0,06 et
1436 0,11 ± 0,05 µmol m⁻² s⁻¹ respectivement. Les émissions du groupe de contrôle tendent
1437 à augmenter sur la période de mesure. Une tendance similaire, quoique moins mar-
1438 quée, est également visible pour le groupe traité. Concernant les cycles de dessicca-
1439 tion/réhumectation, il est difficile de dégager des comportements communs, même s'il
1440 semble que l'assèchement conduit à une baisse des émissions (Figure 4.4–B) Cette re-
1441 lation, mise en exergue pas un nombre de points très faible, n'apparaît cependant pas
1442 sur l'ensemble des données (Figure 4.5–B) Un pic d'émission de CH₄ est également à
1443 noter pour chaque cycle pendant la phase de dessiccation.

1444 La RE varie pour les deux groupes entre 0,42 et 5,12 µmol m⁻² s⁻¹ (Figure 4.4–C)).
1445 Avant le démarrage des manipulations du niveau de la nappe, les valeurs des deux
1446 groupes sont très proches et augmentent tandis que le niveau de nappe diminue. Pen-
1447 dant les phases de dessiccation, les valeurs du groupe traité sont systématiquement supé-
1448 rieures, de 1,5 à 1,8 µmol m⁻² s⁻¹ en moyenne par phase, par rapport à celle du groupe
1449 de contrôle. À l'inverse pendant les phases de réhumectation les flux entre les deux
1450 groupes sont beaucoup plus proches avec une tendance de la RE du groupe de contrôle
1451 à être au dessus de celle du groupe traité. La RE du groupe traité est systématiquement
1452 plus faible pendant les phases de réhumectations que pendant les phases de dessicca-
1453 tions. En moyenne la RE vaut respectivement 2,28 ± 1,00 et 3,86 ± 0,80 µmol m⁻² s⁻¹
1454 pour les groupes de contrôle et traité pendant les phases de dessiccation et 1,70 ± 0,62
1455 et 1,51 ± 0,98 µmol m⁻² s⁻¹ pendant les phases de réhumectation.

1456 Sur l'ensemble de la période de mesure la PPB est comprise entre 2,78 et 7,96 µmol m⁻² s⁻¹.

1457 Avant le début des traitements les flux des deux groupes sont similaires (Figure 4.4–D).
1458 La première phase de dessiccation fait passer la PPB du groupe de contrôle au dessus
1459 du groupe traité. Pour les deux groupes, la PPB est plus importante lors des phases
1460 de dessiccation comparée aux phase de réhumectation, avec des moyennes respectives

4.4. Discussion

¹⁴⁶¹ de $6,35 \pm 2,19$ contre $5,80 \pm 2,20$ pour le groupe de contrôle et de $5,95 \pm 1,46$ contre
¹⁴⁶² $4,05 \pm 1,60 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ pour le groupe traité.

¹⁴⁶³ Les valeurs d'ENE mesurées sont comprises entre $0,11$ et $5,42 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, elles
¹⁴⁶⁴ ont tendance à augmenter au cours du temps. Passé la période pré-traitements pendant
¹⁴⁶⁵ laquelle les flux de l'ENE sont similaires pour les deux groupes l'ENE du groupe de
¹⁴⁶⁶ contrôle est systématiquement supérieure à celle du groupe de traitement (Figure 4.4–
¹⁴⁶⁷ E). L'évolution des deux groupes reste cependant relativement conjointe pendant la
¹⁴⁶⁸ période de mesure avec pour le groupe traité une diminution récurrente de l'ENE au
¹⁴⁶⁹ début de chaque phase de dessiccation.

4.3.3 tendances générales

¹⁴⁷¹ Pour les deux expérimentations une relation nette est visible entre le niveau de la
¹⁴⁷² nappe et l'ENE qui diminue lorsque le niveau de nappe augmente (Figure 4.5–G,H).
¹⁴⁷³ La relation inverse est visible, pour les deux expérimentations, entre la RE et le niveau
¹⁴⁷⁴ de la nappe (Figure 4.5–C,D). La PPB par contre ne montre aucune tendance claire
¹⁴⁷⁵ quelle que soit l'expérimentation. On peut malgré tout noter que les valeurs de PPB les
¹⁴⁷⁶ plus faibles correspondent aux niveaux de nappe les plus élevés(Figure 4.5–E,F). Pour
¹⁴⁷⁷ le méthane, que ce soit pour l'expérimentation A ou B, aucune tendance ne semble se
¹⁴⁷⁸ dégager vis à vis du niveau de la nappe (Figure 4.5–A,B).

4.4 Discussion

4.4.1 Comparaison aux mesures *in-situ*

¹⁴⁸¹ Les flux moyen de CH_4 mesurés dans les mésocosmes des deux expérimentations
¹⁴⁸² font partie des valeurs hautes mesurées sur le terrain. Certaines campagnes dépassent
¹⁴⁸³ nettement, en faisant plus que doubler, le maximum de $0,2 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ mesuré en
¹⁴⁸⁴ 2014 sur la tourbière de La Guette.




FIGURE 4.5 – Relations entre les flux de GES et le niveau de la nappe

4.4. Discussion

1485 Pour le CO₂ les flux sont généralement dans la gamme des valeurs mesurée sur la
1486 tourbière de La Guette. Pour l'expérimentation A, l'ENE moyen est plus faible que
1487 celui mesuré sur le terrain la même année : 0,81 contre 2,85 µmol m⁻² s⁻¹. Pour l'expé-
1488 rimentation B en revanche l'ENE moyen vaut 0,71 µmol m⁻² s⁻¹ ce qui est relativement
1489 proche de celui mesuré sur le terrain : 2,93 µmol m⁻² s⁻¹. Les flux de RE et de PPB
1490 sont moins fort que les flux mesurés sur le terrain mais restent dans leur gamme de
1491 valeurs. Ces comparaisons sont par ailleurs à relativiser puisque les mesures de flux
1492 n'ont pas nécessairement lieu aux mêmes moment de la journée.

1493 Comme pour la RE, les flux de PPB sont du même ordre de grandeur que ceux me-
1494 surés sur le terrain, mais légèrement plus faible : les maxima moyens mesurés dans les
1495 mésocosmes sont d'environ 7,5 pour des valeurs de 13 µmol m⁻² s⁻¹ mesuré directement
1496 sur la tourbière.

1497 4.4.2 Effet des variations du niveau de la nappe sur les flux de 1498 gaz

1499 Les résultats de ces deux expérimentations montrent clairement une augmentation
1500 de la RE quand le niveau de la nappe diminue. Ceci est en accord avec les résultats
1501 d'autres études que ce soit in-situ (Ballantyne *et al.*, 2014) ou en mésocosmes (Blodau
1502 *et al.*, 2004; Dinsmore *et al.*, 2009). Dans ces deux dernières publications, la baisse
1503 du niveau de la nappe diminue la PPB. Pas de variations claires de la PPB n'est vi-
1504 sible dans les données présentées, même si une légère tendance semble émergée aux
1505 plus fortes profondeur de nappe pour l'expérimentation A, ces observations restent à
1506 confirmer. Cette absence d'effet du niveau de la nappe sur la PPB peut, peut être,
1507 être liée à la profondeur des mésocosmes (30 cm). En effet dans Blodau *et al.* (2004)
1508 et Dinsmore *et al.* (2009), les mésocosmes utilisés sont plus grands, 75 et 41 cm res-
1509 pectivement, ont permis d'abaisser le niveau de l'eau au delà de -30 cm. Cette limite
1510 a été rapportée plusieurs fois comme étant un seuil au delà duquel son observés des
1511 changements importants (Blodau *et al.*, 2004; Peichl *et al.*, 2014). Ce seuil est expliqué
1512 comme étant la limite au delà de laquelle les forces de capillarités ne permettent plus

1513 d'alimenter en eau les sphaignes (Rydin et Jeglum, 2013a; Ketcheson et Price, 2014).
1514 Il résulte des constats précédents qu'une baisse du niveau de nappe, faisant augmenter
1515 la RE et ne changeant pas ou peu la PPB, conduit à une baisse de l'ENE. Cette di-
1516 minution de l'ENE est cohérente avec la littérature, que ce soit des expérimentations
1517 en mésocosmes (Aerts et Ludwig, 1997; Blodau *et al.*, 2004), ou in-situ (Bubier *et al.*,
1518 2003; Sonnentag *et al.*, 2010). Malgré tout l'extrapolation de ses résultats à d'autres
1519 situations n'est pas évidente car fortement fonction du contexte. D'autre études n'ont,
1520 par exemple, pas observé d'influence du niveau de la nappe sur la RE (Updegraff *et al.*,
1521 2001). Par ailleurs Laiho (2006) a montré l'importance du contexte et notamment celui
1522 de l'échelle de temps considéré qui peut impliquer des phénomènes différents et donc
1523 avoir des conséquences différentes.

1524 La dépendance entre les flux de CH₄ et le niveau de la nappe, devant conduire à une
1525 baisse des émissions quand le niveau de la nappe diminue, comme décrite dans Aerts et
1526 Ludwig (1997), Pelletier *et al.* (2007) ou Turetsky *et al.* (2008), n'a pas été clairement
1527 observée. Ce constat rejoins d'autres études dans lesquelles une relation inverse ou un
1528 absence de relation a été trouvé entre le CH₄ et le niveau de la nappe Kettunen *et al.*
1529 (1996); Bellisario *et al.* (1999); Treat *et al.* (2007). L'observation d'un pic de méthane
1530 suivant de quelques jours une phase de hausse du niveau de la nappe, est également
1531 rapportée par Kettunen *et al.* (1996). (**And so what ?**)

1532 4.4.3 Effet cycles multiples

₁₅₃₃ 5 Variation journalière de la respiration de
₁₅₃₄ l'écosystème (article)

₁₅₃₅

₁₅₃₆	5.1 Introduction	99
₁₅₃₇		
₁₅₃₈	5.2 Procédure expérimentale et analytique	101
₁₅₃₉	5.2.1 Sites étudiés	101
₁₅₄₀	5.2.2 Acquisition des données	101
₁₅₄₁	5.2.3 Synchronisation des données	102
₁₅₄₂	5.2.4 Sensibilité de RE à la température	102
₁₅₄₃	5.2.5 Différence entre mesures de jour et mesures de nuit	103
₁₅₄₄	5.2.6 Caractérisation physico-chimique	104
₁₅₄₅	5.3 Résultats	104
₁₅₄₆	5.3.1 Température de l'air et variabilité de RE	104
₁₅₄₇	5.3.2 Synchronisation RE et température du sol	105
₁₅₄₈	5.3.3 Équations utilisées	107
₁₅₄₉	5.3.4 Relation entre RE et la température	108
₁₅₅₀	5.3.5 Évolution du Q ₁₀	109
₁₅₅₁	5.3.6 Différence entre mesures de jour et de nuit	112
₁₅₅₂	5.3.7 Caractérisation de la tourbe	112
₁₅₅₃	5.4 Discussion	112
₁₅₅₄	5.4.1 Différence de RE entre les différents sites	112
₁₅₅₅	5.4.2 Temps de latence entre température et RE	115
₁₅₅₆	5.4.3 La synchronisation entre RE et la température améliore la représentation de la sensibilité de RE à la température	116

1558	5.4.4 Différence entre mesure de RE faite le jour et la nuit	116
1559	5.4.5 La sensibilité du Q10 à la profondeur de la température et à	
1560	la synchronisation	117
1562	5.5 Conclusions	117
1563		

5.1 Introduction

At a global scale, Ecosystem Respiration (ER) and photosynthesis are the most important fluxes between the atmosphere and the biosphere, accounting for 98 and 123 PgC yr⁻¹, respectively (Bond-Lamberty et Thomson, 2010; Beer *et al.*, 2010). By contrast the fossil fuel and cement production flux is one order of magnitude lower, at 7.8 PgC yr⁻¹ (Ciais *et al.*, 2014). Consequently, even small variations in the ecosystem fluxes may result in substantial changes in carbon (C) storage dynamics. This can have a significant effect on the global C budget, in particular on atmospheric C concentration. The C stock in natural ecosystems is divided into two pools : vegetation, which contains 450 to 650 Pg C, and the soil which contains 1500 to 2400 Pg C (Prentice *et al.*, 2001; Eswaran *et al.*, 1993; Batjes, 1996). Across the world, the soil organic C (SOC) pool is spatially heterogeneous in terms of source and physical conditions, leading to variable storage rates between ecosystem types. Peatlands are efficient C storage ecosystems. They cover only 3 % of the global terrestrial area, but contain from 270 to 455 Pg C as SOC, i.e. from 10 to 30 % of the world's soil C (Gorham, 1991; Turunen *et al.*, 2002). Thus, peatlands are considered as a "hot spots" for SOC storage, and their evolution under current environmental changes deserves attention.

As in many other terrestrial ecosystems, many factors affect ER variability in peatlands : temperature, soil water content, vegetation, and substrate supply (Luo et Zhou, 2006a). All these factors are thought to be affected by global change, with unknown consequences on the C balance (Limpens *et al.*, 2008). ER is often related to temperature : either to air temperature (e.g., Bortoluzzi *et al.*, 2006), or soil temperature. The most commonly used soil temperatures are those at -5 cm (Ballantyne *et al.*, 2014; Görres *et al.*, 2014) and -10 cm (Kim et Verma, 1992; Zhu *et al.*, 2015). In some studies, different depths are used and the selected one depends on the goodness-of-fit (Günther *et al.*, 2014; Zhu *et al.*, 2015). All these studies use the chamber method to measure gas fluxes. Even though most studies use -5 cm soil temperature, no clear consensus

5.1. Introduction

exists. In addition Pavelka *et al.* (2007) and Graf *et al.* (2008) showed that the relationship between ER and temperature is depth dependent since heat transfer in the soil profile is not instantaneous and leads to a time-delay between the temperature and the ER signals. The relationship between ER and temperature is often described using the Q_{10} indicator, which represents the proportional increase of a reaction rate due to a 10°C rise in temperature. However, even if the Q_{10} seems coherent at a global scale (Mahecha *et al.*, 2010), reported values show a significant variability at the ecosystem level (Graf *et al.*, 2008). Because the measured Q_{10} are not linked to a single reaction but to multiple processes, numerous issues arise (Davidson *et al.*, 2006). Among them are the time-scale considered (Curiel Yuste *et al.*, 2004), the depth (Graf *et al.*, 2008) and the time-delays between ER and soil temperatures (Phillips *et al.*, 2011). One way to deal with the time-delays might be data synchronisation according to Pavelka *et al.* (2007). Another issue is the difference between the daytime and nighttime ER relationship with temperature. Juszczak *et al.* (2012), for example, showed that there are significant differences between ER modelled with daytime and nighttime data. Assessing these differences may be important when working at a daily timescale and when treating data from eddy-covariance measurements.

Based on these previous studies, we expected that time-delays in *Sphagnum*-dominated peatlands would be significant, even in the first 10 centimetres depth and that they would lead to a better description of observed data once taken into account, especially through data synchronisation. To our knowledge no studies have explored the time-delay between ER and soil temperature in peatlands yet. Differences in the ER-temperature relationship between daytime and nighttime datasets were also expected. To test these predictions, ER fluxes, during the growing season in 4 *Sphagnum*-dominated peatlands were measured in 2013. Continuous measurements over 72 hours were carried out in each site using static dark chambers. Air and soil temperature were also monitored. Specifically, the relationship between ER and temperature, measured at different depths in peat was studied and the difference between daytime and nighttime measurements was assessed.

1620 The aim of this study was (i) to highlight any time-delay at the daily timescale
1621 between ER and soil temperature at different depths in peatlands (ii) to assess the
1622 effect of synchronisation between ER and temperature in the representation of the diel
1623 ER variations (iii) to use the improved model to assess whether there is a difference
1624 between nighttime and daytime ER.

1625 5.2 Procédure expérimentale et analytique

1626 5.2.1 Sites étudiés

1627 L'étude a été réalisée sur les quatres tourbières à sphaigne du SNO : Bernadouze
1628 (BDZ, Ariège ; 3.75 ha, N 42°48'09", E 1°25'24", 1400 m), Frasne (FRN, Doubs ; 98 ha,
1629 N 46°49'35", E 6°10'20", 836 m), Landemarais (LDM, Ille-et-vilaine ; 23 ha, N 48°26'30",
1630 E 1°10'54", 154 m), et La Guette (LGT, Cher ; 26 ha, N 47°19'44", E 2°17'04", 145 m).
1631 Les températures moyennes annuelles et les précipitations annuelle sont de 6, 7.5, 11,
1632 11°C, et 1700, 1400, 870, 880 mm pour BDZ, FRN, LDM and LGT respectivement.
1633 Pendant les mesures le niveau de la nappe est resté constant a -12, -7, -35 et -9 cm
1634 pour BDZ, FRN, LDM and LGT.

1635 5.2.2 Acquisition des données

1636 Les campagnes de terrain se sont déroulée entre juillet et octobre 2013. Dans chaque
1637 site, quatre réplicats ayant une végétation similaire ont été choisi. Quatre embases (cf
1638 chapitre 2, partie 2.3.2) ont été installées sur le terrain le jour précédent des mesures.
1639 Pendant 72 heures, les flux de CO₂ ont été mesurés dans les quatre embases une fois
1640 par heure dans un ordre aléatoire. Ces mesures ont été réalisées suivant le protocole
1641 décrit dans la partie 2.3.2. Dans chaque site, une station météo munie d'une centrale
1642 d'acquisition de données a été installée à côté des embases. Cette station fournissant des
1643 données environnementales et météorologiques acquise à la seconde : la température

5.2. Procédure expérimentale et analytique

1644 de surface (la température de l'air le plus proche de la surface possible : 5 cm), la
1645 température de la tourbe à -5, -10, -20, -30 cm de profondeur, l'humidité relative
1646 de l'air et le rayonnement solaire.

1647 Après les 72 heures de mesure, quatre carottes de tourbe (30 cm de hauteur, 15 cm
1648 de diamètre), une pour chaque réplicat, ont été extraite sur chaque site pour en faire
1649 une caractérisation physico-chimique.

1650 5.2.3 Synchronisation des données

1651 La synchronisation entre la RE et les températures ont été calculés pour chaque
1652 profondeur et temps de latence : La fréquence d'acquisition entre les température et
1653 la RE est différente. En conséquence, une moyenne des températures acquise pendant
1654 les mesures RE a été calculée pour chaque profondeur pendant le temps correspond
1655 à la durée de chacune des mesures de CO₂. Cette procédure a ensuite été répétée en
1656 décalant les séries de données de 10 min, jusqu'à un décalage de 24 heures. Le pas
1657 de 10 minutes est un compromis entre la précision et le temps de calcul nécessaire.
1658 Ensuite un coefficient de corrélation a été calculé pour chaque pas de temps et pour
1659 chaque température aux différentes profondeurs. Finalement la synchronisation a été
1660 déterminée pour chaque profondeur en choisissant le temps de latence correspondant
1661 au coefficient de corrélation le plus élevé. Les corrélations négatives causée par une
1662 inversion de phases n'ont pas été considérées.

1663 5.2.4 Sensibilité de RE à la température

1664 Trois modèles largement utilisés Fang et Moncrieff (2001) ont été testé pour étudier
1665 la relation entre RE et la température : un modèle linéaire (5.1), un modèle exponentiel :
1666 Q₁₀ (5.2) un modèles d'Arrhenius (5.3)

$$RE = \alpha + \beta T \quad (5.1)$$

$$RE = \alpha e^{\beta T}; Q_{10} = e^{10*\beta} \quad (5.2)$$

$$RE = \alpha e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (5.3)$$

1667 RE a été estimé en utilisant les températures de l'air à la surface et les tempé-
1668 ratures du sol à -5, -10, -20, -30 cm avec le jeu de données synchronisées et non-
1669 synchronisées. Les calculs ont été fait à l'aide du logiciel R, les données modélisées ont
1670 été ajustée aux données mesurées en utilisant la méthode des moindres carrés (*Ordinary*
1671 *Least Squares, OLS*). La qualité de l'ajustement a été estimé en calculant les coeffi-
1672 cients de régression (R^2) et l'**erreur standard** normalisée par la moyenne (Normalized
1673 root mean square error, NRMSE)

1674 5.2.5 Différence entre mesures de jour et mesures de nuit

1675 Pour tester si la relation entre RE et la température diffère entre le jour et la nuit,
1676 le jeu de données a été divisé en deux groupes. Les données acquises entre 10 heures
1677 et 17 heure sont considérées représentative du jour et les données acquises entre 23
1678 heures et 6 heure comme représentative de la nuit. Seules la température de l'air à
1679 la surface et la température du sol à -5 cm (avec les données synchronisées et non-
1680 synchronisées) ont été testés comme elle donnait la meilleure représentation de RE.
1681 Les données ont été centrées pour prendre en compte la différence naturelle entre jour
1682 et nuit. Les températures et les flux étant plus élevés pendant la journée. Enfin un
1683 test de student apparié a été appliqué sur la moyenne des réplicats pour chaque site et
1684 chaque température pour déterminer la significativité des différences éventuelles entre
1685 les mesures faite le jour et celles faite la nuit.

1686 5.2.6 Caractérisation physico-chimique

1687 Au laboratoire, deux carottes de chaque site ont été immergée dans l'eau pendant
1688 24 heures pour saturer leur porosité. Les carottes ont ensuite été égouttée pendant une
1689 nuit afin de retirer l'eau remplissant la porosité efficace. Avec un pas de 5 cm un morceau
1690 de tourbe de volume connu (V , cm^3) a été coupé et pesé (W_1 , g). Les échantillons ont
1691 ensuite été séchés à 50 °C pendant 48 heures et pesés (W_2 , g). La porosité totale (Φ_T ,
1692 sans dimension), la porosité de rétention (Φ_R , sans dimension), la porosité effective
1693 (Φ_E , sans dimension) et la densité moyenne (Bd , g cm^{-3}) ont été calculées comme
1694 suit :

$$\Phi_T = 1 - \left[\frac{\left(\frac{W_2}{\rho_{peat}} \right)}{V} \right] \quad (5.4)$$

$$\Phi_R = 1 - \left[\frac{\left(\frac{(W_1 - W_2)}{\rho_{peat}} \right)}{V} \right] \quad (5.5)$$

$$\Phi_E = \Phi_T - \Phi_R \quad (5.6)$$

$$Bd = \frac{W_2}{V} \quad (5.7)$$

1695 La densité de la tourbe (ρ_{peat}) a été fixée à 1,45 d'après [Kennedy et Price \(2005\)](#).
1696 La tourbe a ensuite été broyée et les concentration en C, H, N, S ont été mesurées avec
1697 un analyseur élémentaire (Thermo Flash Analyser).

1698 5.3 Résultats**1699 5.3.1 Température de l'air et variabilité de RE**

1700 Mean surface air temperatures were about 14-15 °C for all sites, except for LGT
1701 which was 20.8 ± 7.4 °C, (Figure 5.1 – H). The lowest mean temperature and amplitude
1702 were found at BDZ : 14.4 ± 3.3 °C (Figure 5.1 – E). In LDM and FRN, the mean surface

1703 air temperatures were respectively $14.9 \pm 8.7^\circ\text{C}$ and $15.0 \pm 10.3^\circ\text{C}$ (Figure 5.1 – F,
1704 G) Surface air temperature was the highest in FRN.

1705 At -5 cm depth, BDZ and LGT had lower mean temperatures than at the surface :
1706 $14.1 \pm 1.5^\circ\text{C}$ and $20.3 \pm 1.7^\circ\text{C}$ respectively, whereas the opposite was observed in FRN
1707 and LDM with $16.3 \pm 2.4^\circ\text{C}$ and $15.9 \pm 1.0^\circ\text{C}$ respectively. Mean soil temperatures
1708 were still higher at -10 cm for both sites, but only in LDM at -20 cm. At -30 cm
1709 the soil temperature amplitude ranged from 0.2 in LDM to 0.6 in LGT and FRN.
1710 Overall conditions were warmer in LGT than in the other sites and LDM, despite a
1711 large amplitude of surface air temperature, had a particularly low soil temperature
1712 amplitude.

1713 In terms of ER, mean and variability were the lowest in FRN among all sites (1.75
1714 $\pm 0.83 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, Figure 5.1 – B). The highest variability and mean ER ($6.13 \pm$
1715 $2.81 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, Figure 5.1 – C) were observed in LDM. On this site replicates had
1716 different behaviours even though they were close to each other and in a similar environ-
1717 ment. In BDZ and LGT, ER mean values were 3.12 ± 0.92 and $4.10 \pm 1.15 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$
1718 respectively (Figure 5.1 – A, B)

1719 5.3.2 Synchronisation RE et température du sol

1720 Figure 5.1 shows that the deeper the temperature was measured, the greater the
1721 shift with respect to ER. Taking this shift into account by synchronising soil tempera-
1722 tures with ER led to a significant positive linear correlation between the temperature
1723 measurement depth and the synchronisation time-delay (all sites pooled, $R^2=0.94$,
1724 $p<0.001$; Figure 5.2). The range of estimated time-delays decreased with depth up to
1725 -20 cm. At this depth the time-delay was 12 hours, i.e. a phase inversion on a daily
1726 timescale. For the three sites other than LDM, the slopes of the time-delay and mea-
1727 surement depth relationship were in a close range : 0.56, 0.54, 0.52 for FRN, BDZ and
1728 LGT respectively. The relationship for LDM was higher at -30 cm, leading to a steeper
1729 slope (0.66) than in the other sites (Figure 5.2). At the other depths, this site always
1730 had the highest time-delay, though the values were close to those of the other sites.

5.3. Résultats




FIGURE 5.1 – Ecosystem Respiration (ER), air and peat temperature, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT).

₁₇₃₁ BDZ always had the lowest time-delay, but like LDM, the values were close to those of
₁₇₃₂ the other sites, although slightly lower at -5 cm depth.




FIGURE 5.2 – Time delay between temperature at different depths and ER, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT)

₁₇₃₃ 5.3.3 Équations utilisées

₁₇₃₄ For both types of model (using non-synchronised and synchronised data), the dif-
₁₇₃₅ ferences between the 3 tested models were very small. The greatest differences, in R^2
₁₇₃₆ values, were 0.07 and 0.05 for non-synchronised and synchronised data respectively,
₁₇₃₇ whereas differences in NRMSE maximum values were 1.28 and 1.14 (Table 5.1). In
₁₇₃₈ most cases the linear model led to a slightly better R^2 than the others. As the diffe-
₁₇₃₉ rences between equations were small, however, we will describe the exponential model
₁₇₄₀ in the following sections, because (i) it is the most widely used model to describe the
₁₇₄₁ ER-temperature relationship and (ii) the Q_{10} value can be derived from this equation.
₁₇₄₂ This will allow the comparison of the results of our study to others.

5.3. Résultats

Tableau 5.1 – R^2 and NRMSE profile with depth for models using non-synchronised and synchronised data and for the three equations (linear : lin, exponential : exp, arrhenius : arr).

depth	Non-synchronised						Synchronised					
	lin R^2	NRMSE	exp R^2	NRMSE	arr R^2	NRMSE	lin R^2	NRMSE	exp R^2	NRMSE	arr R^2	NRMSE
Bernadouze												
0	0.22	25.88	0.19	26.09	0.19	26.09	0.22	25.88	0.19	26.09	0.19	26.09
-5	0.23	25.66	0.20	25.89	0.20	25.89	0.27	25.18	0.24	25.40	0.24	25.40
-10	0.02	28.92	0.03	29.26	0.03	29.26	0.23	25.72	0.22	25.90	0.22	25.90
-20	0.04	28.64	0.03	28.98	0.03	28.98	0.13	27.79	0.13	28.16	0.13	28.16
-30	0.02	28.93	0.02	29.28	0.02	29.28	0.05	29.54	0.05	29.92	0.05	29.92
Frasne												
0	0.66	27.58	0.63	26.74	0.63	26.96	0.66	27.58	0.63	26.74	0.63	26.74
-5	0.19	42.34	0.21	43.00	0.21	43.01	0.68	26.34	0.68	25.02	0.68	25.02
-10	0.01	46.73	0.00	48.01	0.00	48.01	0.59	29.98	0.60	29.20	0.60	29.20
-20	0.34	38.29	0.27	38.78	0.27	38.77	0.34	38.05	0.36	39.17	0.36	39.17
-30	0.03	46.30	0.03	47.47	0.03	47.47	0.18	43.66	0.19	44.75	0.19	44.75
Landemarais												
0	0.29	38.55	0.32	39.31	0.32	39.24	0.29	38.55	0.32	39.31	0.32	39.31
-5	0.03	45.18	0.04	46.06	0.04	46.07	0.21	40.63	0.25	41.58	0.25	41.58
-10	0.05	44.53	0.04	45.45	0.04	45.45	0.13	42.65	0.16	43.71	0.16	43.71
-20	0.09	43.75	0.08	44.55	0.08	44.55	0.09	43.83	0.12	44.97	0.12	44.97
-30	0.03	45.09	0.02	46.07	0.02	46.07	0.13	44.94	0.12	46.02	0.12	46.02
La Guette												
0	0.61	17.44	0.56	17.30	0.56	17.34	0.61	17.44	0.56	17.30	0.56	17.30
-5	0.31	23.27	0.29	23.24	0.28	23.26	0.63	16.83	0.59	16.49	0.58	16.49
-10	0.08	26.89	0.07	27.09	0.07	27.10	0.61	17.21	0.57	16.84	0.57	16.84
-20	0.30	23.41	0.27	23.30	0.27	23.30	0.54	18.93	0.51	19.01	0.51	19.01
-30	0.12	26.25	0.11	26.37	0.11	26.37	0.39	22.18	0.36	22.26	0.36	22.26

5.3.4 Relation entre RE et la température

The relationship between air temperature and ER, using the exponential model, was better in LGT and FRN ($R^2 > 0.55$) than in LDM and LDM ($R^2 < 0.35$) (Table 5.1). Nevertheless in all sites and with both linear and exponential models, using synchronised soil temperatures gave a better account of the ER variability than their non-synchronised counterparts (Figure 5.3). The goodness of fit (R^2) increased on average by 0.26 to 0.35 at -5 cm and -10 cm depth respectively. The degree of improvement varied however between sites. For instance, at -5 cm depth R^2 between synchronised and non-synchronised models increased by only 0.04 in BDZ while it increased by 0.47 in FRN. The improvement gained by using synchronised data was higher at -5 cm and -10 cm than at deeper layers, with 0.12, 0.11 on average for -20 and -30 cm depth (Figure 5.3).

A similar observation can be made for NRMSE. Regardless of some exceptions at

1756 deeper layers especially at -20 cm depth, the NRMSE values show that using syn-
1757 chronised data rather than non-synchronised ones improved the representation of ER
1758 variability at a daily timescale, indicating that depth measurements dependence is
1759 smaller for models using synchronised data than for models using non-synchronised
1760 data. However with increasing depth R^2 values still decreased and NRMSE values still
1761 increased. For FRN, LDM and LGT, synchronised data at -5 cm depth gave a better
1762 account of the ER variability than surface air temperature (Figure 5.3). This was not
1763 the case in LDM, where temperature at the surface was the best descriptor of ER. For
1764 both R^2 and NRMSE the values at -20 cm depth were better than those observed at
1765 -10 or -30 cm depth. This pattern was observed with different magnitudes among sites,
1766 and was particularly visible in FRN and LGT. For the most part, the synchronisation
1767 of data led to higher R^2 and NRMSE values for models using one soil temperature, at
1768 a daily scale on *sphagnum*-dominated peatlands.

1769 5.3.5 Évolution du Q₁₀

1770 The Q₁₀ stood between 0 and 2.5 for non-synchronised data with a maximum at
1771 -5 cm depth. Average values were 1.4, 2.4 and 1.3, at the surface, -5 and -10 cm depth
1772 respectively (Figure 5.4). Average Q₁₀ values at the surface and -10 cm depth were
1773 very similar. However there was much more variability at -10 cm depth, where the
1774 values ranged from 0.1 to 2.1, than at the surface where the values stood between 1.3
1775 and 1.5. Beyond -10 cm depth Q₁₀ values fell almost to 0, while for non-synchronised
1776 data Q₁₀ values greatly increased with depth, reaching meaningless values. Q₁₀ values
1777 estimated with surface temperature were very similar between sites with an average of
1778 1.4 (Figure 5.4). It increased to about 2.5 at -5 cm depth, with both synchronised and
1779 non-synchronised data. Below this depth, Q₁₀ estimated with both methods either de-
1780 creased downwards (non-synchronised) or increased (synchronised data) to unrealistic
1781 values (Figure 5.4).




FIGURE 5.3 – Profile of R^2 and NRMSE, (RMSE, normalized by the mean), with depth, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT) using the exponential model.




FIGURE 5.4 – Profile of Q_{10} with depth for synchronised (white) and non synchronised (black) data and exponential model in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT).

¹⁷⁸² **5.3.6 Différence entre mesures de jour et de nuit**

¹⁷⁸³ For BDZ and LDM sites no significant differences were found between daytime and
¹⁷⁸⁴ nighttime data no matter which model was used, whereas differences were found for
¹⁷⁸⁵ FRN and LGT (Figure 5.5). In FRN, synchronisation increased the significance of the
¹⁷⁸⁶ differences : $p < 0.001$ with and $p < 0.01$ without synchronisation respectively. The
¹⁷⁸⁷ same pattern was found in LGT but with lower significance. Hence models using -5
¹⁷⁸⁸ cm depth with non-synchronised data are not significantly different but those using
¹⁷⁸⁹ synchronised data are. Note that, for LGT, the model using air temperature had a
¹⁷⁹⁰ daytime slope that was higher than the nighttime one, which was the opposite of all
¹⁷⁹¹ the other cases.

¹⁷⁹² **5.3.7 Caractérisation de la tourbe**

¹⁷⁹³ Elemental compositions were similar in all sites : 1–3%, 4–6% and <1% for N, H
¹⁷⁹⁴ and S respectively (Table 5.2). C content was mainly between 40 and 50 %, except at
¹⁷⁹⁵ the deeper levels in LDM and LGT where values were lower (< 32%).

¹⁷⁹⁶ **5.4 Discussion**

¹⁷⁹⁷ **5.4.1 Différence de RE entre les différents sites**

¹⁷⁹⁸ The ER fluxes calculated in the 4 sites were in the same order of magnitude as those
¹⁷⁹⁹ of peatlands found in the literature. [Bortoluzzi *et al.* \(2006\)](#), for instance, found ER
¹⁸⁰⁰ values ranging from 2 to 5 during the same period as this study, i.e. July to October
¹⁸⁰¹ 2004. In the present study, the models performed poorly in 2 sites, BDZ and LDM. For
¹⁸⁰² BDZ, amplitudes of both ER and temperatures were low (Figure 5.1 – A, E) making
¹⁸⁰³ the representation of ER possible only on a short temperature span. With such low
¹⁸⁰⁴ ranges of both ER and temperature, it can be assumed that ER variability was due
¹⁸⁰⁵ to the variability between plots. For LDM, the ER fluxes were measured in plots that




FIGURE 5.5 – Differences between daytime and nighttime measurements using 3 models : non-synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – NS), synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – S), and non-synchronised data at air temperature (Tair).

Tableau 5.2 – Peat chemical properties as a function of depth in cm : content (%) N, C, H, S, the total, retention and effective porosity, Φ_T , Φ_R , Φ_E respectively in $m^3.m^{-3}$, solid peat volumic fraction in $m^3.m^{-3}$ and the bulk density (Bd) in $g.cm^{-3}$.

level	N	C	H	S	Φ_T	Φ_R	Φ_E	solid	Bd
<i>Bernadouze</i>									
0–5	1.76	41.84	6.05	0.05	0.99	0.47	0.52	0.01	0.03
5–10	1.99	43.99	6.18	0.07	0.97	0.78	0.19	0.03	0.06
10–15	2.28	45.38	6.35	0.1	0.96	0.92	0.04	0.04	0.10
15–20	2.92	44.95	6.23	0.23	0.95	0.82	0.13	0.05	0.11
20–25	3.14	39.01	5.31	0.23	0.93	0.90	0.04	0.07	0.16
25–30	2.50	31.15	4.28	0.13	0.89	0.86	0.03	0.11	0.24
<i>Frasne</i>									
0–5	1.73	43.67	6.24	0.00	0.99	0.40	0.58	0.01	0.03
5–10	1.55	43.35	5.97	0.00	0.98	0.59	0.40	0.02	0.03
10–15	1.69	43.49	6.17	0.00	0.98	0.89	0.09	0.02	0.05
15–20	1.63	43.06	5.97	0.00	0.98	0.89	0.09	0.02	0.05
20–25	1.30	43.68	6.29	0.05	0.98	0.93	0.04	0.02	0.05
25–30	1.48	43.44	6.21	0.03	0.98	0.87	0.11	0.02	0.05
<i>Landemarais</i>									
0–5	1.36	45.63	5.69	0.25	0.97	0.62	0.35	0.03	0.07
5–10	3.08	47.37	5.37	0.09	0.95	0.74	0.21	0.05	0.11
10–15	2.73	48.34	5.63	0.10	0.94	0.94	0.00	0.06	0.13
15–20	2.54	48.67	5.64	0.30	0.96	0.81	0.15	0.04	0.10
20–25	2.08	46.99	5.80	0.23	0.97	0.89	0.08	0.03	0.07
25–30	1.57	45.65	6.23	0.21	0.97	0.89	0.08	0.03	0.07
<i>La Guette</i>									
0–5	1.55	38.33	5.23	0.05	0.97	0.61	0.36	0.03	0.05
5–10	2.35	41.31	4.66	0.20	0.93	0.83	0.10	0.07	0.08
10–15	2.34	43.81	5.72	0.18	0.91	0.89	0.02	0.09	0.10
15–20	1.99	43.17	5.45	0.10	0.89	0.87	0.01	0.11	0.13
20–25	1.90	37.91	4.83	0.05	0.88	0.83	0.05	0.12	0.15
25–30	1.32	18.95	2.32	0.01	0.79	0.76	0.03	0.21	0.28

were more heterogeneous than expected, resulting in strong variability (Figure 5.1 – C). This observation is consistent with the high NRMSE value calculated for this site (39.3 % for BDZ against 26.1 % for LDM) whereas the R^2 values for these two sites were close, 0.19 and 0.32 for BDZ and LDM respectively, using surface air temperature and an exponential relationship. It is noteworthy that in FRN the NRMSE values were high with respect to R^2 values. This result can be explained by the fact that the mean ER flux was low ($1.75 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) and thus had a strong influence on NRMSE as we used mean normalization. Finally at -20 cm depth, models using non-synchronised data showed, an increase in R^2 and a decrease in NRMSE which was more or less observable in the different sites : clearly in FRN, LGT and to a lesser extent in LDM, but barely perceptible in BDZ. At this depth the temperature and the ER signal phases are opposed making the non-synchronised models better at representing ER than at -10 or -30 centimetres but with a reverse relationship. The ER fluxes thus show different behaviours either in their amplitude or in their homogeneity

5.4.2 Temps de latence entre température et RE

Time-delays between soil temperatures and ER occur in *Sphagnum*-dominated peatlands. They occur even close to the soil surface and increase with depth. The relationship between time-delays and depth was similar in all the studied sites although LDM had slightly higher time-delays. The overall delay observed in peat soils, 0.57 hours per centimetre, was higher than those found by Pavelka *et al.* (2007) in a forest and in a grassland ecosystem and by Parkin et Kaspar (2003) on two agricultural soils (0.4 and 0.5 hours per centimetre respectively). This is coherent with the fact that peat soil has a lower thermal diffusivity than mineral soils (Farouki, 1981; Arya, 2001). LDM was the only site with a slightly higher slope especially at -30 cm. This was expected as soil diffusivity increases with wetness (Hillel, 2003) and LDM was the site with the lowest water table level. This was confirmed by thermal conductivity measurements conducted on the peat cores (data not shown). Overall, it should be noted that the time-delays were similar in all the studied sites despite their variability in terms of ER

5.4. Discussion

1834 fluxes.

1835 5.4.3 La synchronisation entre RE et la température améliore 1836 la représentation de la sensibilité de RE à la température

1837 In spite of the importance of lags between physical phenomena and biological
1838 activities ([Vargas *et al.*, 2010](#)), few studies have addressed the effect of time-delays bet-
1839 ween soil temperature and global biological activity (ER) at the daily timescale. At this
1840 scale, we showed in peatlands that using synchronised data improved the representation
1841 of the temperature sensitivity of ER. The improvement provided by synchronisation
1842 was evidenced at shallow depth. The best goodness-of-fit obtained with synchronised
1843 data and models using one temperature, was found at -5 cm depth. These observations
1844 are in agreement with those of [Pavelka *et al.* \(2007\)](#) who also found a decreasing ef-
1845 fect of synchronisation with depth. Such a lesser depth effect could be explained by
1846 a simultaneous decrease in temperature amplitude. Because the goodness-of-fit of the
1847 non-synchronised data increases at -20 cm, the synchronisation effect strongly decreases
1848 at this depth. This pattern is visible, with various amplitudes, in the different sites.
1849 It is explained by the 12 h time-delay (Figure 5.2) corresponding to a phase inversion
1850 that occurs at this depth between the ER and the daily temperature courses. Such a
1851 phase inversion was found deeper, at -30 cm by [Pavelka *et al.* \(2007\)](#), due to a higher
1852 temperature diffusivity in mineral soils. Finally in our study these models, using syn-
1853 chronised -5 cm depth temperature, show slightly higher R^2 and lower NRMSE values
1854 than those using surface air temperature.

1855 5.4.4 Différence entre mesure de RE faite le jour et la nuit

1856 The significant differences observed between daytime and nighttime measurements
1857 corroborate other studies in which these differences were found using chamber tech-
1858 niques ([Juszczak *et al.*, 2012](#); [Darenova *et al.*, 2014](#)). The fact that some sites show
1859 significant differences (FRN and LGT) and not others (BDZ and LDM) seems to be

linked to the variability between plots and temperature amplitude. When temperature amplitude was low, most of the variability originated from spatial variability between plots. This was also corroborated by a test done on LGT where we calculated the day and night differences only on the last two days when temperature amplitude was the greatest. As a result the significance increased from $p < 0.05$ to $p < 0.01$ for the synchronised model using -5 cm depth temperature and the differences observed in the model using air temperature were no longer significant any more ($p > 0.05$).

5.4.5 La sensibilité du Q₁₀ à la profondeur de la température et à la synchronisation

In shallow layers (≤ 10 cm), the Q₁₀ values calculated with non-synchronised data in the ranges that are usually reported, i.e. between 1.3 to 3.3 (Raich et Schlesinger, 1992). At deeper levels in the peat profile (≥ 10 cm), they reach 0 as the relationship between ER and the temperature weakens, and is not compensated by a long term evolution. A similar behaviour was found by Pavelka et al. (2007) even if this Q₁₀ decrease with depth is not usually seen and most studies show the opposite, namely an increase in Q₁₀ values with depth (Graf et al., 2008). This apparent contradiction may be explained by the length of the study. Because of its short duration, the effect of the time-delays on ER were preponderant over the temperature effect. Synchronisation also led to meaningless high Q₁₀ values because synchronisation can explain a higher proportion of ER flux with a smaller temperature variation. Temperature amplitude decreases with depth because of soil dampening.

5.5 Conclusions

We showed that the time-delays between ER and soil temperatures at different depths are significant on a daily timescale as the signals are shifted 30 minutes every centimetre. At this scale the use of synchronised soil temperature, to take into account

5.5. Conclusions

these time-delays, can improve the representation of ER particularly in the first 10 centimetres. Only one of the studied sites showed highly significant differences between daytime and nighttime measurements. However it is possible that such differences exist in the other sites, depending on the environmental conditions (e.g. temperature amplitude) and spatial variability in the ER fluxes. Addressing questions of bio-physical coupling in determining ER at different timescales requires high frequency observations ([Vargas *et al.*, 2011](#)). Even if the automated chamber technique is increasingly used, it cannot be easily deployed in some sites due to tall vegetation, power supply difficulties, or harsh environmental conditions. In contrast, temperature measurements at different depths are easy to conduct, robust to harsh conditions and can be powered by a small solar panel. A calibration campaign with human manipulated closed chambers could be carried out to assess ER variability at different timescales. Coupling temperature profile and punctual ER measurements and then using synchronised data in models may be a good alternative in sites where automated chambers are not easily implantable.

¹⁸⁹⁹ Conclusions et perspectives

₁₉₀₀ 5.6 Bilan du bilan (de C) ?

- ₁₉₀₁ Flux fort
- ₁₉₀₂ sensibilité param forte
- ₁₉₀₃ Modèles multi annuel et prise en compte de la végétation
- ₁₉₀₄ Quid des variations journalières dans un bilan annuel ?
- ₁₉₀₅ Les prendre en compte améliorerait-il les modèles
- ₁₉₀₆ modèles globaux ? **limitations des équations** : Plus généralement, la majorité des
- ₁₉₀₇ tourbières sont sous la neige une partie de l'année, ce qui n'arrive que rarement sur
- ₁₉₀₈ la tourbière de La Guette et une partie possède également des zones d'eau libre, qui
- ₁₉₀₉ n'existent pas sur ce site.
- ₁₉₁₀ modèles globaux et profondeur de tourbe

₁₉₁₁ 5.7 Résilience de la tourbe par rapport aux

- ₁₉₁₂ 2 années sèches qui précèdent le BdC

₁₉₁₃ (lien chap 3 et 4)

₁₉₁₄ 5.8 Ouverture vers d'autre méthodes de me-

₁₉₁₅ sures

- ₁₉₁₆ — chambre automatique (lien chap 5, et chap 3?)
- ₁₉₁₇ — tour eddy covariance (lien chap 5 et chap 3?)

₁₉₁₈ Bibliographie

- ₁₉₁₉ AERTS, R. et LUDWIG, F. (1997). Water-table changes and nutritional status affect trace gas emissions from laboratory columns of peatland soils. *Soil Biology and Biochemistry*, 29(11–12):1691–1698.
- ₁₉₂₂ ALM, J., SAARNIO, S., NYKÄNEN, H., SILVOLA, J. et MARTIKAINEN, P. (1999). Winter CO₂, CH₄ and N₂O fluxes on some natural and drained boreal peatlands. *Biogeochemistry*, 44(2):163–186.
- ₁₉₂₅ ALM, J., TALANOV, A., SAARNIO, S., SILVOLA, J., IKKONEN, E., AALTONEN, H., NYKÄNEN, H. et MARTIKAINEN, P. J. (1997). Reconstruction of the carbon balance for microsites in a boreal oligotrophic pine fen, Finland. *Oecologia*, 110:423–431.
- ₁₉₂₈ ANDREJKO, M. J., FIENE, F. et COHEN, A. D. (1983). Comparison of ashing techniques for determination of the inorganic content of peats. In *Testing of Peats and Organic Soils : A Symposium*, volume 820, pages 5–10. ASTM International.
- ₁₉₃₁ ARCHER, D., EBY, M., BROVKIN, V., RIDGWELL, A., CAO, L., MIKOŁAJEWICZ, U., CALDEIRA, K., MATSUMOTO, K., MUNHOVEN, G., MONTENEGRO, A. et OTHERS (2009). Atmospheric lifetime of fossil fuel carbon dioxide. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 37(1):117.
- ₁₉₃₅ ARYA, S. P. (2001). *Introduction to Micrometeorology*, volume 79 de *International Geophysics Series*. Academic Press.
- ₁₉₃₇ AURELA, M., RIUTTA, T., LAURILA, T., TUOVINEN, J.-P., VESALA, T., TUITILA, E.-S., RINNE, J., HAAPANALA, S. et LAINE, J. (2007). CO₂ exchange of a sedge fen in southern Finland—the impact of a drought period. *Tellus B*, 59(5):826–837.
- ₁₉₄₀ BALLANTYNE, D. M., HRIBLJAN, J. A., PYPKER, T. G. et CHIMNER, R. A. (2014). Long-term water table manipulations alter peatland gaseous carbon fluxes in northern Michigan. *Wetlands Ecol. Manage.*, 22(1):35–47.
- ₁₉₄₃ BATJES, N. H. (1996). Total carbon and nitrogen in the soils of the world. *Eur. J. Soil Sci.*, 47(2):151–163.
- ₁₉₄₅ BEER, C., REICHSTEIN, M., TOMEILLERI, E., CIAIS, P., JUNG, M., CARVALHAIS, N., RÖDENBECK, C., ARAIN, M. A., BALDOCCHI, D., BONAN, G. B., BONDEAU, A., CESCATTI, A., LASSLOP, G., LINDROTH, A., LOMAS, M., LUSSAERT, S., MARGOLIS, H., OLESON, K. W., ROUPSARD, O., VEENENDAAL, E., VIOVY, N., WILLIAMS, C., WOODWARD, F. I. et PAPALE, D. (2010). Terrestrial Gross Carbon Dioxide Uptake : Global Distribution and Covariation with Climate. *Science*, 329(5993):834–838.
- ₁₉₅₁ BELLISARIO, L. M., BUBIER, J. L., MOORE, T. R. et CHANTON, J. P. (1999). Controls on CH₄ emissions from a northern peatland. *Global Biogeochemical Cycles*, 13(1):81–91.

- 1954 BLODAU, C. (2002). Carbon cycling in peatlands. A review of processes and controls.
 1955 *Environmental Reviews*, 10(2):111–134.
- 1956 BLODAU, C., BASILIKO, N. et MOORE, T. R. (2004). Carbon turnover in peatland
 1957 mesocosms exposed to different water table levels. *Biogeochemistry*, 67(3):331–351.
- 1958 BOND-LAMBERTY, B. et THOMSON, A. (2010). Temperature-associated increases in
 1959 the global soil respiration record. *Nature*, 464(7288):579–582.
- 1960 BORTOLUZZI, E., EPRON, D., SIEGENTHALER, A., GILBERT, D. et BUTTLER, A.
 1961 (2006). Carbon balance of a European mountain bog at contrasting stages of re-
 1962 generation. *New Phytol.*, 172(4):708–718.
- 1963 BUBIER, J., COSTELLO, A., MOORE, T. R., ROULET, N. T. et SAVAGE, K. (1993).
 1964 Microtopography and methane flux in boreal peatlands, northern Ontario, Canada.
 1965 *Canadian Journal of Botany*, 71(8):1056–1063.
- 1966 BUBIER, J. L., BHATIA, G., MOORE, T. R., ROULET, N. T. et LAFLEUR, P. M. (2003).
 1967 Spatial and Temporal Variability in Growing-Season Net Ecosystem Carbon Dioxide
 1968 Exchange at a Large Peatland in Ontario, Canada. *Ecosystems*, 6:353–367.
- 1969 BUBIER, J. L., CRILL, P. M., MOORE, T. R., SAVAGE, K. et VARNER, R. K. (1998).
 1970 Seasonal patterns and controls on net ecosystem CO₂ exchange in a boreal peatland
 1971 complex. *Global Biogeochemical Cycles*, 12(4):703–714.
- 1972 BUBIER, J. L., MOORE, T. R., BELLISARIO, L., COMER, N. T. et CRILL, P. M. (1995).
 1973 Ecological controls on methane emissions from a Northern Peatland Complex in the
 1974 zone of discontinuous permafrost, Manitoba, Canada. *Global Biogeochemical Cycles*,
 1975 9(4):455–470.
- 1976 BUCKLAND, P. C. (1993). Peatland archaeology : a conservation resource on the edge
 1977 of extinction. *Biodivers. Conserv.*, 2(5):513–527.
- 1978 CAI, T., FLANAGAN, L. B. et SYED, K. H. (2010). Warmer and drier conditions
 1979 stimulate respiration more than photosynthesis in a boreal peatland ecosystem :
 1980 Analysis of automatic chambers and eddy covariance measurements. *Plant Cell
 1981 Environ.*, 33(3):394–407.
- 1982 CHAPMAN, S., BUTTLER, A., FRANCEZ, A.-J., LAGGOUN-DÉFARGE, F., VASANDER,
 1983 H., SCHLOTER, M., COMBE, J., GROSVERNIER, P., HARMS, H., EPRON, D. et
 1984 OTHERS (2003). Exploitation of northern peatlands and biodiversity maintenance :
 1985 a conflict between economy and ecology. *Front. Ecol. Environ.*, 1(10):525–532.
- 1986 CHRISTENSEN, J. H., HEWITSON, B., BUSUIOC, A., CHEN, A., GAO, X., HELD, R.,
 1987 JONES, R., KOLLI, R. K., KWON, W. K., LAPRISE, R. et OTHERS (2007). Regional
 1988 climate projections. *Clim. Change 2007 Phys. Sci. Basis Contrib. Work. Group
 1989 Fourth Assess. Rep. Intergov. Panel Clim. Change Univ. Press Camb. Chapter 11*,
 1990 pages 847–940.
- 1991 CHRISTENSEN, J. H., KANIKICHLARLA, K. K., MARSHALL, G. et TURNER, J. (2013).
 1992 Climate phenomena and their relevance for future regional climate change.

- 1993 CIAIS, P., SABINE, C., BALA, G., BOPP, L., BROVKIN, V., CANADELL, J., CHHABRA,
 1994 A., DEFRIES, R., GALLOWAY, J., HEIMANN, M. et OTHERS (2014). Carbon and
 1995 other biogeochemical cycles. In *Climate Change 2013 : The Physical Science Basis.*
 1996 *Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovern-*
 1997 *mental Panel on Climate Change*, pages 465–570. Cambridge University Press.
- 1998 CLYMO, R. S., TURUNEN, J. et TOLONEN, K. (1998). Carbon accumulation in peat-
 1999 land. *Oikos*, pages 368–388.
- 2000 COLMER, T. D. (2003). Long-distance transport of gases in plants : a perspective on
 2001 internal aeration and radial oxygen loss from roots. *Plant Cell Environ.*, 26(1):17–36.
- 2002 CROW, S. E. et WIEDER, R. K. (2005). Sources of CO₂ emission from a northern
 2003 peatland : root respiration, exudation, and decomposition. *Ecology*, 86(7):1825–1834.
- 2004 CURIEL YUSTE, J., JANSSENS, I. A., CARRARA, A. et CEULEMANS, R. (2004). Annual
 2005 Q₁₀ of soil respiration reflects plant phenological patterns as well as temperature
 2006 sensitivity. *Global Change Biol.*, 10(2):161–169.
- 2007 DARENOVA, E., PAVELKA, M. et ACOSTA, M. (2014). Diurnal deviations in the rela-
 2008 tionship between CO₂ efflux and temperature : A case study. *CATENA*, 123:263–269.
- 2009 DAVIDSON, E. A., JANSSENS, I. A. et LUO, Y. (2006). On the variability of respiration
 2010 in terrestrial ecosystems : moving beyond Q₁₀. *Global Change Biol.*, 12(2):154–164.
- 2011 DINSMORE, K. J., SKIBA, U. M., BILLETT, M. F. et REES, R. M. (2009). Effect
 2012 of water table on greenhouse gas emissions from peatland mesocosms. *Plant Soil*,
 2013 318(1-2):229–242.
- 2014 ESWARAN, H., VAN DEN BERG, E. et REICH, P. (1993). Organic carbon in soils of
 2015 the world. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 57(1):192–194.
- 2016 FANG, C. et MONCRIEFF, J. (2001). The dependence of soil CO₂ efflux on temperature.
 2017 *Soil Biol. Biochem.*, 33(2):155–165.
- 2018 FAROUKI, O. (1981). *Thermal properties of soils*. Series on rock and soil mechanics.
 2019 Trans Tech Pub., Rockport, MA.
- 2020 FARQUHAR, G. D., VON CAEMMERER, S. et BERRY, J. A. (1980). A biochemical model
 2021 of photosynthetic CO₂ assimilation in leaves of C₃ species. *Planta*, 149(1):78–90.
- 2022 FRANCEZ, A.-J. (2000). La dynamique du carbone dans les tourbières à Sphagnum,
 2023 de la sphaine à l'effet de serre. *L'Année Biologique*, 39:205–270.
- 2024 FROLKING, S., TALBOT, J., JONES, M. C., TREAT, C. C., KAUFFMAN, J. B., TUIT-
 2025 TILA, E.-S. et ROULET, N. (2011). Peatlands in the Earth's 21st century climate
 2026 system. *Environ. Rev.*, 19(NA):371–396.
- 2027 GIRARD, M. C., WALTER, C., REMY, J. C., BERTHELIN, J. et MOREL, J. L. (2011).
 2028 *Sols et Environnement*, (2e édn), volume 28 de *Sciences Sup.* Editions Dunod : Paris,
 2029 Vottem, Belgique, 2nd édition édition.

- 2030 GOGO, S., GUIMBAUD, C., LAGGOUN-DÉFARGE, F., CATOIRE, V. et ROBERT, C.
2031 (2011). In situ quantification of CH₄ bubbling events from a peat soil using a new
2032 infrared laser spectrometer. *Journal of Soils and Sediments*, 11:545–551.
- 2033 GORHAM, E. (1991). Northern Peatlands : Role in the Carbon Cycle and Probable
2034 Responses to Climatic Warming. *Ecol. Appl.*, 1(2):182–195.
- 2035 GÖRRES, C. M., KUTZBACH, L. et ELSGAARD, L. (2014). Comparative modeling of
2036 annual CO₂ flux of temperate peat soils under permanent grassland management.
2037 *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 186:64–76.
- 2038 GRAF, A., WEIHERMÜLLER, L., HUISMAN, J. A., HERBST, M., BAUER, J. et VEREE-
2039 CKEN, H. (2008). Measurement depth effects on the apparent temperature sensitivity
2040 of soil respiration in field studies. *Biogeosciences*, 5(3):1867–1898.
- 2041 GUIMBAUD, C., CATOIRE, V., GOGO, S., ROBERT, C., CHARTIER, M., LAGGOUN-
2042 DÉFARGE, F., GROSSEL, A., ALBÉRIC, P., POMATHIOD, L., NICOUILLAUD, B. et
2043 RICHARD, G. (2011). A portable infrared laser spectrometer for flux measurements
2044 of trace gases at the geosphere-atmosphere interface. *Measurement Science & Tech-*
2045 *nology*, 22(7):1–17.
- 2046 GUNNARSSON, U. (2005). Global patterns of Sphagnum productivity. *Journal of*
2047 *Bryology*, 27(3):269–279.
- 2048 GÜNTHER, A., HUTH, V., JURASINSKI, G. et GLATZEL, S. (2014). The effect of bio-
2049 mass harvesting on greenhouse gas emissions from a rewetted temperate fen. *GCB*
2050 *Bioenergy*, pages n/a–n/a.
- 2051 HARRIS, D. C. (2010). Charles David Keeling and the Story of Atmospheric CO₂
2052 Measurements†. *Anal. Chem.*, 82(19):7865–7870.
- 2053 HILLEL, D. (2003). Soil temperature and heat flow. In *Introduction to Environmental*
2054 *Soil Physics*. Academic Press. {DOI :10.1016/B978-012348655-4/50013-7}.
- 2055 ISE, T., DUNN, A. L., WOFSY, S. C. et MOORCROFT, P. R. (2008). High sensitivity of
2056 peat decomposition to climate change through water-table feedback. *Nat. Geosci.*,
2057 1(11):763–766.
- 2058 JACOBS, C. M. J., JACOBS, A. F. G., BOSVELD, F. C., HENDRIKS, D. M. D., HENSEN,
2059 A., KROON, P. S., MOORS, E. J., NOL, L., SCHRIER-UIJL, A. et VEENENDAAL, E. M.
2060 (2007). Variability of annual CO₂ exchange from Dutch grasslands. *Biogeosciences*,
2061 4(5):803–816.
- 2062 JOABSSON, A., CHRISTENSEN, T. R. et WALLÉN, B. (1999). Vascular plant controls
2063 on methane emissions from northern peatforming wetlands. *Trends in Ecology &*
2064 *Evolution*, 14(10):385–388.
- 2065 JONES, M. C. et YU, Z. (2010). Rapid deglacial and early Holocene expansion of
2066 peatlands in Alaska. *PNAS*, 107(16):7347–7352.

- 2067 JOOS, F., ROTH, R., FUGLESTVEDT, J. S., PETERS, G. P., ENTING, I. G., VON BLOH,
2068 W., BROVKIN, V., BURKE, E. J., EBY, M., EDWARDS, N. R., FRIEDRICH, T., FRÖ-
2069 LICHER, T. L., HALLORAN, P. R., HOLDEN, P. B., JONES, C., KLEINEN, T., MAC-
2070 KENZIE, F. T., MATSUMOTO, K., MEINSHAUSEN, M., PLATTNER, G.-K., REISIN-
2071 GER, A., SEGGSCHNEIDER, J., SHAFFER, G., STEINACHER, M., STRASSMANN, K.,
2072 TANAKA, K., TIMMERMANN, A. et WEAVER, A. J. (2013). Carbon dioxide and
2073 climate impulse response functions for the computation of greenhouse gas metrics :
2074 a multi-model analysis. *Atmos. Chem. Phys.*, 13(5):2793–2825.
- 2075 JOOSTEN, H. et CLARKE, D. (2002). *Wise use of mires and peatlands*. International
2076 mire conservation group.
- 2077 JUNE, T., EVANS, J. R. et FARQUHAR, G. D. (2004). A simple new equation for the
2078 reversible temperature dependence of photosynthetic electron transport : a study on
2079 soybean leaf. *Funct. Plant Biol.*, 31(3):275–283. WOS :000220831200008.
- 2080 JUSZCZAK, R., ACOSTA, M. et OLEJNIK, J. (2012). Comparison of daytime and night-
2081 time ecosystem respiration measured by the closed chamber technique on temperate
2082 mire in Poland. *Pol. J. Environ. Stud.*, 21(3):643–658.
- 2083 KAUFMAN, D. S., AGER, T. A., ANDERSON, N. J., ANDERSON, P. M., ANDREWS,
2084 J. T., BARTLEIN, P. J., BRUBAKER, L. B., COATS, L. L., CWYNAR, L. C., DUVALL,
2085 M. L., DYKE, A. S., EDWARDS, M. E., EISNER, W. R., GAJEWSKI, K., GEIRSDÓT-
2086 TIR, A., HU, F. S., JENNINGS, A. E., KAPLAN, M. R., KERWIN, M. W., LOZHKNIN,
2087 A. V., MACDONALD, G. M., MILLER, G. H., MOCK, C. J., OSWALD, W. W., OTTO-
2088 BLIESNER, B. L., PORINCHU, D. F., RÜHLAND, K., SMOL, J. P., STEIG, E. J. et
2089 WOLFE, B. B. (2004). Holocene thermal maximum in the western Arctic (0–180°W).
2090 *Quaternary Science Reviews*, 23(5–6):529–560.
- 2091 KENNEDY, G. W. et PRICE, J. S. (2005). A conceptual model of volume-change controls
2092 on the hydrology of cutover peats. *J. Hydrol.*, 302(1–4):13–27.
- 2093 KETCHESON, S. J. et PRICE, J. S. (2014). Characterization of the fluxes and stores of
2094 water within newly formed Sphagnum moss cushions and their environment. *Ecohy-
2095 drology*, 7(2):771–782.
- 2096 KETTUNEN, A., KAITALA, V., ALM, J., SILVOLA, J., NYKÄNEN, H. et MARTIKAINEN,
2097 P. J. (1996). Cross-correlation analysis of the dynamics of methane emissions from
2098 a boreal peatland. *Glob. Biogeochem. Cycles*, 10(3):457–471.
- 2099 KIM, J. et VERMA, S. B. (1992). Soil surface CO₂ flux in a Minnesota peatland.
2100 *Biogeochemistry*, 18(1):37–51.
- 2101 LAI, D. (2009). Methane Dynamics in Northern Peatlands : A Review. *Pedosphere*,
2102 19(4):409–421.
- 2103 LAIHO, R. (2006). Decomposition in peatlands : Reconciling seemingly contrasting
2104 results on the impacts of lowered water levels. *Soil Biology and Biochemistry*, 38(8):
2105 2011–2024.

- 2106 LANDVA, A. O., KORPIJAAKKO, E. O. et PHEENEY, P. E. (1983). Geotechnical clas-
2107 sification of peats and organic soils. In *Testing of peats and organic soils*, volume
2108 820, pages 37–51.
- 2109 LAPPALAINEN, E. (1996). *Global peat resources*, volume 4. International Peat Society
2110 Jyskä.
- 2111 LELIEVELD, J. O. S., CRUTZEN, P. J. et DENTENER, F. J. (1998). Changing concentra-
2112 tion, lifetime and climate forcing of atmospheric methane. *Tellus B*, 50(2):128–150.
- 2113 LIMPENS, J., BERENDSE, F., BLODAU, C., CANADELL, J. G., FREEMAN, C., HOLDEN,
2114 J., ROULET, N., RYDIN, H. et SCHAEPMAN-STRUB, G. (2008). Peatlands and the
2115 carbon cycle : from local processes to global implications – a synthesis. *Biogeos-
2116 ciences*, 5(2):1475–1491.
- 2117 LIVINGSTON, G. P. et HUTCHINSON, G. L. (1995). Enclosure-based measurement of
2118 trace gas exchange : applications and sources of error. *Biog. Trace Gases Meas.
2119 Emiss. Soil Water*, pages 14–51.
- 2120 LONG, K. D., FLANAGAN, L. B. et CAI, T. (2010). Diurnal and seasonal variation in
2121 methane emissions in a northern Canadian peatland measured by eddy covariance.
2122 *Global Change Biology*, 16(9):2420–2435.
- 2123 LUND, M., CHRISTENSEN, T. R., LINDROTH, A. et SCHUBERT, P. (2012). Effects
2124 of drought conditions on the carbon dioxide dynamics in a temperate peatland.
2125 *Environ. Res. Lett.*, 7(4):045704.
- 2126 LUO, Y. et ZHOU, X. (2006a). Chapter 5 - Controlling factors. In LUO, Y. et ZHOU,
2127 X., éditeurs : *Soil Respiration and the Environment*, pages 79 – 105. Academic Press,
2128 Burlington.
- 2129 LUO, Y. et ZHOU, X. (2006b). Chapter 8 - Methods of measurements and estimations.
2130 In LUO, Y. et ZHOU, X., éditeurs : *Soil Respiration and the Environment*, pages 161
2131 – 185. Academic Press, Burlington.
- 2132 MACDONALD, G. M., BEILMAN, D. W., KREMENETSKI, K. V., SHENG, Y., SMITH,
2133 L. C. et VELICHKO, A. A. (2006). Rapid early development of circumarctic peatlands
2134 and atmospheric CH₄ and CO₂ variations. *Science*, 314(5797):285–288.
- 2135 MAHECHA, M. D., REICHSTEIN, M., CARVALHAIS, N., LASSLOP, G., LANGE, H., SE-
2136 NEVIRATNE, S. I., VARGAS, R., AMMANN, C., ARAIN, M. A., CESCATTI, A., JANS-
2137 SENS, I. A., MIGLIAVACCA, M., MONTAGNANI, L. et RICHARDSON, A. D. (2010).
2138 Global Convergence in the Temperature Sensitivity of Respiration at Ecosystem Le-
2139 vel. *Science*, 329(5993):838–840.
- 2140 MANNEVILLE, O. (1999). *Le monde des tourbières et des marais : France, Suisse,
2141 Belgique et Luxembourg*. Delachaux & Niestle.
- 2142 MOORE, T. R., BUBIER, J. L., FROLKING, S. E., LAFLEUR, P. M. et ROULET, N. T.
2143 (2002). Plant biomass and production and CO₂ exchange in an ombrotrophic bog.
2144 *Journal of Ecology*, 90(1):25–36.

- 2145 MUNIR, T. M., PERKINS, M., KAING, E. et STRACK, M. (2015). Carbon dioxide
 2146 flux and net primary production of a boreal treed bog : Responses to warming and
 2147 water-table-lowering simulations of climate change. *Biogeosciences*, 12(4):1091–1111.
- 2148 NATIONAL WETLANDS WORKING GROUP (1997). *The Canadian wetland classifica-*
 2149 *tion system*. University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 2nd edition édition.
- 2150 ORLOWSKY, B. et SENEVIRATNE, S. I. (2012). Global changes in extreme events :
 2151 regional and seasonal dimension. *Clim. Change*, 110(3-4):669–696.
- 2152 PARKIN, T. B. et KASPAR, T. C. (2003). Temperature Controls on Diurnal Carbon
 2153 Dioxide Flux. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 67(6):1763–1772.
- 2154 PAVELKA, M., ACOSTA, M., MAREK, M. V., KUTSCH, W. et JANOUS, D. (2007).
 2155 Dependence of the Q_{10} values on the depth of the soil temperature measuring point.
 2156 *Plant Soil*, 292(1-2):171–179.
- 2157 PEICHL, M., ÖQUIST, M., LÖFVENIUS, M. O., ILSTEDT, U., SAGERFORS, J., GRELLE,
 2158 A., LINDROTH, A. et NILSSON, M. B. (2014). A 12-year record reveals pre-growing
 2159 season temperature and water table level threshold effects on the net carbon dioxide
 2160 exchange in a boreal fen. *Environ. Res. Lett.*, 9(5):055006.
- 2161 PELLETIER, L., MOORE, T. R., ROULET, N. T., GARNEAU, M. et BEAULIEU-AUDY,
 2162 V. (2007). Methane fluxes from three peatlands in the La Grande Riviere watershed,
 2163 James Bay lowland, Canada. *J. Geophys. Res. Biogeosciences 2005–2012*, 112(G1).
- 2164 PHILLIPS, C. L., NICKERSON, N., RISK, D. et BOND, B. J. (2011). Interpreting diel
 2165 hysteresis between soil respiration and temperature. *Global Change Biol.*, 17(1):515–
 2166 527.
- 2167 POST, W. M., EMANUEL, W. R., ZINKE, P. J. et STANGENBERGER, A. G. (1982). Soil
 2168 carbon pools and world life zones. *Nature*, 298:156–159.
- 2169 PRATHER, M. J., HOLMES, C. D. et HSU, J. (2012). Reactive greenhouse gas scenar-
 2170 ios : Systematic exploration of uncertainties and the role of atmospheric chemistry.
 2171 *Geophys. Res. Lett.*, 39(9):L09803.
- 2172 PRENTICE, I. C., FARQUHAR, G. D., FASHAM, M. J. R., GOULDEN, M. L., HEIMANN,
 2173 M., JARAMILLO, V. J., KHESHGI, H. S., LEQUÉRÉ, C., SCHOLES, R. J. et WALLACE,
 2174 D. W. R. (2001). The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide. In HOUGH-
 2175 TON, J. T., DING, Y., GRIGGS, D. J., NOGUER, M., VAN DER LINDEN, P. J., DAI,
 2176 X., MASKELL, K. et JOHNSON, C. A., éditeurs : *Climate Change 2001 : the Scienti-
 2177 fic Basis. Contributions of Working Group I to the Third Assessment Report of the
 2178 Intergovernmental Panel on Climate Change*, pages 185–237. Cambridge University
 2179 Press, Cambridge, UK.
- 2180 PUMPANEN, J., KOLARI, P., ILVESNIEMI, H., MINKKINEN, K., VESALA, T., NIINISTÖ,
 2181 S., LOHILA, A., LARMOLA, T., MORENO, M., PIHLATIE, M., JANSSENS, I., YUSTE,
 2182 J. C., GRÜNZWEIG, J. M., RETH, S., SUBKE, J.-A., SAVAGE, K., KUTSCH, W., ØS-
 2183 TRENG, G., ZIEGLER, W., ANTHONI, P., LINDROTH, A. et HARI, P. (2004). Com-
 2184 parison of different chamber techniques for measuring soil CO₂ efflux. *Agric. For.
 2185 Meteorol.*, 123(3–4):159–176.

- 2186 RAICH, J. W. et SCHLESINGER, W. H. (1992). The global carbon dioxide flux in soil
2187 respiration and its relationship to vegetation and climate. *Tellus B*, 44(2):81–99.
- 2188 RAMEAU, J.-C., MANSION, D. et DUMÉ, G. (2008). *Flore forestière française : Plaines*
2189 *et collines*. Forêt privée française.
- 2190 RAMSAR, C. (1987). *Convention relative aux zones humides d'importance internatio-*
2191 *nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, (Ramsar, Iran, 1971) telle*
2192 *qu'amendée en 1982 et 1987.*
- 2193 ROBERT, C. (2007). Simple, stable, and compact multiple-reflection optical cell for
2194 very long optical paths. *Appl. Opt.*, 46(22):5408.
- 2195 ROBERT, M. et SAUGIER, B. (2003). Contribution des écosystèmes continentaux à la
2196 séquestration du carbone. *Comptes Rendus Geoscience*, 335(6–7):577–595.
- 2197 RYDIN, H. et JEGLUM, J. (2013a). Peat and organic soil. In *The biology of Peatlands*,
2198 pages 85–107. Oxford University Press.
- 2199 RYDIN, H. et JEGLUM, J. (2013b). Productivity and peat accumulation. In *The biology*
2200 *of Peatlands*, pages 254–273. Oxford University Press.
- 2201 SIEGENTHALER, U. et OESCHGER, H. (1987). Biospheric CO₂ emissions during the
2202 past 200 years reconstructed by deconvolution of ice core data. *Tellus B*, 39B(1–
2203 2):140–154.
- 2204 SILVOLA, J., ALM, J., AHLHOLM, U., NYKÄNEN, H. et MARTIKAINEN, P. J. (1996).
2205 The contribution of plant roots to CO₂ fluxes from organic soils. *Biol Fertil Soils*,
2206 23(2):126–131.
- 2207 SMITH, L. C., MACDONALD, G. M., VELICHKO, A. A., BEILMAN, D. W., BORISOVA,
2208 O. K., FREY, K. E., KREMENETSKI, K. V. et SHENG, Y. (2004). Siberian Peatlands
2209 a Net Carbon Sink and Global Methane Source Since the Early Holocene. *Science*,
2210 303(5656):353–356.
- 2211 SONNENTAG, O., VAN DER KAMP, G., BARR, A. G. et CHEN, J. M. (2010). On the
2212 relationship between water table depth and water vapor and carbon dioxide fluxes
2213 in a minerotrophic fen. *Glob. Change Biol.*, 16(6):1762–1776.
- 2214 STRACK, M. (2008). *Peatlands and climate change*. IPS, International Peat Society,
2215 Jyväskylä, Finland.
- 2216 STRACK, M., WALLER, M. F. et WADDINGTON, J. M. (2006). Sedge succession and
2217 peatland methane dynamics : A potential feedback to climate change. *Ecosystems*,
2218 9(2):278–287.
- 2219 STRACK, M. et ZUBACK, Y. C. A. (2013). Annual carbon balance of a peatland 10 yr
2220 following restoration. *Biogeosciences*, 10(5):2885–2896.
- 2221 TREAT, C. C., BUBIER, J. L., VARNER, R. K. et CRILL, P. M. (2007). Timescale
2222 dependence of environmental and plant-mediated controls on CH₄ flux in a temperate
2223 fen. *J. Geophys. Res. Biogeosciences 2005–2012*, 112(G1).

- 2224 TRUDEAU, N. C., GARNEAU, M. et PELLETIER, L. (2012). Methane fluxes from a
2225 patterned fen of the northeastern part of the La Grande river watershed, James Bay,
2226 Canada. *Biogeochemistry*, 113(1-3):409–422.
- 2227 TRUDEAU, N. C., GARNEAU, M. et PELLETIER, L. (2014). Interannual variability in
2228 the CO₂ balance of a boreal patterned fen, James Bay, Canada. *Biogeochemistry*,
2229 118(1-3):371–387.
- 2230 TURETSKY, M. R., TREAT, C. C., WALDROP, M. P., WADDINGTON, J. M., HAR-
2231 DEN, J. W. et MC GUIRE, A. D. (2008). Short-term response of methane fluxes and
2232 methanogen activity to water table and soil warming manipulations in an Alaskan
2233 peatland. *J. Geophys. Res. Biogeosciences 2005–2012*, 113(G3).
- 2234 TURUNEN, J., TOMPOPO, E., TOLONEN, K. et REINIKAINEN, A. (2002). Estimating
2235 carbon accumulation rates of undrained mires in Finland—application to boreal and
2236 subarctic regions. *The Holocene*, 12(1):69–80.
- 2237 UPDEGRAFF, K., BRIDGHAM, S. D., PASTOR, J., WEISHAMPEL, P. et HARTH, C.
2238 (2001). Response of CO₂ and CH₄ emissions from peatlands to warming and water
2239 table manipulation. *Ecol. Appl.*, 11(2):311–326.
- 2240 VARGAS, R., BALDOCCHI, D. D., ALLEN, M. F., BAHN, M., BLACK, T. A., COLLINS,
2241 S. L., YUSTE, J. C., HIRANO, T., JASSAL, R. S., PUMPANEN, J. et TANG, J. (2010).
2242 Looking deeper into the soil : biophysical controls and seasonal lags of soil CO₂
2243 production and efflux. *Ecol. Appl.*, 20(6):1569–1582.
- 2244 VARGAS, R., CARBONE, M. S., REICHSTEIN, M. et BALDOCCHI, D. D. (2011). Frontiers
2245 and challenges in soil respiration research : from measurements to model-data
2246 integration. *Biogeochemistry*, 102(1-3):1–13.
- 2247 VIEL, E., BINET, S., GOGO, S. et LAGGOUN-DÉFARGE, F. (2015). Tree invasion
2248 controls the drainage pattern in La Guette peatland (France) : impact on the water
2249 storage capacity of the peat. *Journal of Hydrology (submitted)*.
- 2250 WADDINGTON, J. M. et ROULET, N. T. (2000). Carbon balance of a boreal patterned
2251 peatland. *Global Change Biology*, 6(1):87–97.
- 2252 WELTZIN, J. F., PASTOR, J., HARTH, C., BRIDGHAM, S. D., UPDEGRAFF, K. et CHA-
2253 PIN, C. T. (2000). Response of bog and fen plant communities to warming and
2254 water-table manipulations. *Ecology*, 81(12):3464–3478.
- 2255 WHALEN, S. (2005). Biogeochemistry of Methane Exchange between Natural Wetlands
2256 and the Atmosphere. *Environmental Engineering Science*, 22(1):73–94.
- 2257 WORRALL, F., BURT, T., ROWSON, J., WARBURTON, J. et ADAMSON, J. (2009).
2258 The multi-annual carbon budget of a peat-covered catchment. *Science of The Total
2259 Environment*, 407(13):4084–4094.
- 2260 WUEBBLES, D. J. et HAYHOE, K. (2002). Atmospheric methane and global change.
2261 *Earth-Sci. Rev.*, 57(3):177–210.

- 2262 YU, Z., BEILMAN, D. W. et JONES, M. C. (2009). Sensitivity of northern peatland car-
2263 bon dynamics to Holocene climate change. In *Carbon cycling in northern peatlands*,
2264 volume 184, pages 55–69. American Geophysical Union, Geophysical Monograph Se-
2265 ries Washington, DC.
- 2266 YU, Z., LOISEL, J., BROSSEAU, D. P., BEILMAN, D. W. et HUNT, S. J. (2010). Global
2267 peatland dynamics since the Last Glacial Maximum. *Geophys. Res. Lett.*, 37(13).
- 2268 ZHU, X., SONG, C., SWARZENSKI, C. M., GUO, Y., ZHANG, X. et WANG, J. (2015).
2269 Ecosystem-atmosphere exchange of CO₂ in a temperate herbaceous peatland in the
2270 Sanjiang plain of northeast China. *Ecol. Eng.*, 75:16–23.

Index

2271	A	
2272	atterrissement	11
2273	C	
2274	carbone	
2275	stock	12
2276	changements globaux	2, 14
2277	E	
2278	échange net de l'écosystème	
2279	contrôle	21
2280	P	
2281	paludification	11
2282	photosynthèse	17
2283	production primaire brute	
2284	contrôle	21
2285	R	
2286	respiration	18
2287	de l'écosystème	18
2288	contrôle	20
2289	du sol	18
2290	S	
2291	services écologiques	3
2292	T	
2293	tourbières	8–16
2294	distribution	11
2295	formation	11
2296	surface	10
2297	utilisation	14
2298	turbification	10
2299	Z	
2300	zone humide	8

₂₃₀₁ Annexes

²³⁰² A Photos supplémentaires



(a) droséra

FIGURE 6 – Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure.

²³⁰³ B protocole végétation

²³⁰⁴ Le suivi non-destructif d'une végétation n'est pas triviale et nécessite la mise en
²³⁰⁵ place de protocoles particuliers en fonction du type de végétation. L'objectif est de
²³⁰⁶ pouvoir estimer une biomasse produite en impactant au minimum la végétation en
²³⁰⁷ place. Pour l'ensemble des espèces végétales présentes dans les embases servant à la
²³⁰⁸ mesure des flux un recouvrement à été estimé, à l'œil.

²³⁰⁹ La strate arbustive

²³¹⁰ Pour la strate arbustive des mesures de hauteur moyenne ont été effectuées, en
²³¹¹ mesurant depuis le niveau du sol, ou le toit des sphaignes, si elles étaient présentes,
²³¹² jusqu'au sommet de l'individu.

²³¹³ La strate herbacée

²³¹⁴ Pour la strate herbacée, en 2013, 5 individus des deux espèces majoritaires (*Eriophorum vaginatum* ? *augustifolium* ?, *Molinia Caerulea*) ont été marqués afin de pourvoir
²³¹⁵ les mesurer plusieurs fois au cours de la saison. Cependant les difficultés à retrouver
²³¹⁶ les individus marqués couplés à la mort d'un nombre important d'entre eux n'ont pas
²³¹⁷ permis d'acquérir de résultats significatifs. En conséquence en 2014 ces deux espèces
²³¹⁸ ont fait l'objet de comptage exhaustif et de mesure de hauteur moyenne.




FIGURE 7 – Calibration de la biomasse en fonction de la hauteur







FIGURE 8 – Scanne des feuilles




(a) *Molinia caerulea* – biomasse



(b) *Eriophorum* – biomasse



(c) *Molinia caerulea* – surface



(d) *Eriophorum* – surface

FIGURE 9 – Calibration de la biomasse herbacées pour *molinia Caerulea* (a), pour *eriophorum* (b) et de la surface de feuille pour *molinia Caerulea* (c), pour *eriophorum* (d) en fonction de la hauteur

₂₃₂₀ C CARBIODIV

₂₃₂₁ D package m70r

[Prénom NOM]
[Titre de la thèse (en français)]

Résumé : (1700 caractères max.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin volutpat ipsum id purus ultrices lobortis. Maecenas ornare enim quis eros. Nunc eget mauris ut quam malesuada mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer vel tellus. Nam rutrum, purus non sodales rhoncus, quam magna imperdiet eros, sit amet euismod justo metus at orci. Suspendisse neque turpis, feugiat interdum, faucibus vel, aliquet quis, risus. Etiam est elit, eleifend a, consequat sit amet, scelerisque nec, odio. Quisque id odio quis libero iaculis tincidunt. Sed non mi. Morbi aliquam commodo nibh. Integer justo purus, pulvinar a, suscipit vel, iaculis a, justo. Morbi ut orci. Maecenas fringilla orci. Phasellus auctor, enim vitae tempus egestas, justo mi cursus sem, vel blandit leo turpis vitae quam. Etiam sit amet felis vitae eros ornare porttitor.

Curabitur felis velit, aliquam at, aliquet in, iaculis vitae, velit. Nunc lobortis magna id ligula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer congue ultrices mi. Isdem diebus Apollinaris Domitianus gener, paulo ante agens palatii Caesaris curam, ad Mesopotamiam missus a socero per militares numeros immode dicte scrutabatur, an quaedam altiora meditantis iam Galli secreta suscepit scripta, qui conpertis Antiochiae gestis per minorem Armeniam lapsus Constantinopolim petit.

Mots clés : mot 1, mot 2, ...

[Titre de la thèse (en anglais)]

Résumé : (1700 caractères max.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin volutpat ipsum id purus ultrices lobortis. Maecenas ornare enim quis eros. Nunc eget mauris ut quam malesuada mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer vel tellus. Nam rutrum, purus non sodales rhoncus, quam magna imperdiet eros, sit amet euismod justo metus at orci. Suspendisse neque turpis, feugiat interdum, faucibus vel, aliquet quis, risus. Etiam est elit, eleifend a, consequat sit amet, scelerisque nec, odio. Quisque id odio quis libero iaculis tincidunt. Sed non mi. Morbi aliquam commodo nibh. Integer justo purus, pulvinar a, suscipit vel, iaculis a, justo. Morbi ut orci. Maecenas fringilla orci. Phasellus auctor, enim vitae tempus egestas, justo mi cursus sem, vel blandit leo turpis vitae quam. Etiam sit amet felis vitae eros ornare porttitor.

Curabitur felis velit, aliquam at, aliquet in, iaculis vitae, velit. Nunc lobortis magna id ligula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer congue ultrices mi. Isdem diebus Apollinaris Domitianus gener, paulo ante agens palatii Caesaris curam, ad Mesopotamiam missus a socero per militares numeros immode dicte scrutabatur, an quaedam altiora meditantis iam Galli secreta suscepit scripta, qui conpertis Antiochiae gestis per minorem Armeniam lapsus Constantinopolim petit.

Mots clés : mot 1, mot 2, ...