

# **ÉCOLE DOCTORALE ÉNERGIE, MATÉRIAUX, SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS**

Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace

# THÈSE présentée par : Benoît D'ANGELO

soutenue le : [XX mois en lettres 2015]

pour obtenir le grade de : **Docteur de l'université d'Orléans**

## **Discipline : Sciences de la Terre et de l'Univers**

# [Titre de la thèse]

## [Sous titre éventuel]

## **THÈSE dirigée par :**

**Christophe GUIMBAUD** Co-directeur de recherche, LPC2E, Orléans  
**Fatima LAGGOUN** Co-directeur de recherche, ISTO, Orléans

## RAPPORTEURS :

**Prénom Nom** Titre, établissement  
**Prénom Nom** Titre, établissement

**JURY:**



# Table des matières

<b>Table des matières</b>	iii
<b>Liste des figures</b>	vii
<b>Liste des tableaux</b>	ix
<b>Remerciements</b>	xi
<b>Introduction</b>	1
<b>1 Synthèse Bibliographique</b>	7
1.1 Les tourbières et le cycle du carbone . . . . .	8
1.1.1 Zones humides et tourbières : définitions et terminologies . . . . .	8
1.1.2 Tourbières et fonctions environnementales . . . . .	13
1.1.3 Les tourbières et les changements globaux . . . . .	15
1.2 Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants . . . . .	19
1.2.1 GES et Tourbières . . . . .	19
1.2.2 Les flux entre l'atmosphère et les tourbières . . . . .	20
1.2.3 Les facteurs majeurs contrôlant les flux . . . . .	23
1.2.4 Bilans de carbone . . . . .	28
<b>2 Sites d'études et méthodologies employées</b>	31
2.1 Présentation de la tourbière de La Guette . . . . .	32
2.2 Autres sites du service national d'observation . . . . .	37
2.3 Mesures de flux . . . . .	38
2.3.1 Présentation des méthodologies possibles . . . . .	38
2.3.2 Les mesures de CO <sub>2</sub> . . . . .	39
2.3.3 Les mesures de CH <sub>4</sub> . . . . .	42
2.3.4 Le calcul des flux . . . . .	43
2.4 Facteurs contrôlants . . . . .	43
2.4.1 acquisitions automatisées . . . . .	43
<b>3 Bilan de C de la tourbière de La Guette</b>	45
3.1 Introduction . . . . .	46
3.2 Procédure expérimentale et analytique . . . . .	47
3.2.1 Méthodes de mesures . . . . .	47
3.2.2 Modélisation du bilan de C . . . . .	49
3.3 Résultats . . . . .	54
3.3.1 Cinétique des facteurs contrôlant et des flux sur la tourbière de La Guette . . . . .	54
3.3.2 Sélection des modèles . . . . .	59

3.3.3	Le bilan de carbone de la tourbière de La Guette à l'échelle de l'écosystème . . . . .	67
3.3.4	Variabilité spatiale du bilan . . . . .	74
3.4	Discussion . . . . .	76
3.4.1	Estimations des flux . . . . .	76
3.4.2	Estimations des bilans . . . . .	79
3.4.3	Sensibilité et limitations du bilan . . . . .	79
3.4.4	Représentativité locale du modèle . . . . .	80
3.4.5	Variation du bilan avec la végétation . . . . .	80
3.4.6	perspectives . . . . .	81
<b>4</b>	<b>Effets de l'hydrologie sur les flux de GES</b>	<b>83</b>
4.1	Introduction . . . . .	84
4.2	Procédure expérimentale . . . . .	85
4.2.1	Expérimentation A . . . . .	86
4.2.2	Expérimentation B . . . . .	86
4.2.3	traitement . . . . .	87
4.3	Résultats . . . . .	88
4.3.1	Expérimentation A . . . . .	88
4.3.2	Expérimentation B . . . . .	91
4.3.3	tendances générales . . . . .	94
4.4	Discussion . . . . .	94
4.4.1	Comparaison aux mesures <i>in-situ</i> . . . . .	94
4.4.2	Effet des variations du niveau de la nappe sur les flux de gaz . . . . .	96
4.4.3	Effet cycles multiples . . . . .	97
<b>5</b>	<b>Variation journalière de la respiration de l'écosystème (article)</b>	<b>99</b>
5.1	Introduction . . . . .	101
5.1.1	Study sites . . . . .	103
5.1.2	Data acquisition . . . . .	103
5.1.3	Data synchronisation . . . . .	104
5.1.4	Sensitivity of ER to temperature . . . . .	104
5.1.5	Testing difference between daytime and nighttime ER sensitivity to temperature . . . . .	105
5.1.6	Physico-chemical characterisation of the peat . . . . .	105
5.2	Résultats . . . . .	106
5.2.1	Température de l'air et variabilité de RE . . . . .	106
5.2.2	Synchronisation RE et température du sol . . . . .	107
5.2.3	Équations utilisées . . . . .	108
5.2.4	Relation entre RE et la température . . . . .	109
5.2.5	Évolution du Q10 . . . . .	110
5.2.6	Différence entre mesures de jour et de nuit . . . . .	112
5.2.7	Caractérisation de la tourbe . . . . .	112
5.3	Discussion . . . . .	112
5.3.1	Différence de RE entre les différents sites . . . . .	112
5.3.2	Temps de latence entre température et RE . . . . .	116
5.3.3	La synchronisation entre RE et la température améliore la représentation de la sensibilité de RE à la température . . . . .	117

5.3.4	Différence entre mesure de RE faite le jour et la nuit . . . . .	118
5.3.5	La sensibilité du Q10 à la profondeur de la température et à la synchronisation . . . . .	118
5.4	Conclusions . . . . .	119
<b>Conclusions et perspectives</b>		<b>121</b>
5.5	Bilan du bilan (de C) ? . . . . .	122
5.6	Résilience de la tourbe par rapport aux 2 années sèches qui précèdent le BdC . . . . .	122
5.7	Ouverture vers d'autre méthodes de mesures . . . . .	122
<b>Références bibliographiques</b>		<b>132</b>
<b>Index</b>		<b>133</b>
<b>Annexes</b>		<b>135</b>
A	Photos supplémentaires . . . . .	136
B	protocole végétation . . . . .	136
C	CARBODIV . . . . .	139
D	package m70r . . . . .	139



# Liste des figures

1.1	Micro-topographie dans les tourbières. Modifié d'après Rydin et Jeglum (2013a) . . . . .	11
1.2	Global distribution of peatlands . . . . .	12
1.3	Nombre de tourbières nouvellement formées pendant l'holocène. Modifié d'après (MacDonald <i>et al.</i> , 2006) . . . . .	17
1.4	Projection des changements à l'horizon 2100, des moyennes et extrêmes annuels (sur terre) des températures de l'air et des précipitations : (a) température de surface moyenne par °C de changement global moyen, (b) 90 <sup>e</sup> percentile des températures journalières maximum par °C de changement de température moyenne maximale, (c) précipitations moyenne (en % par °C de changement de température moyenne) et (d) fraction de jours ayant des précipitations dépassant le 95 <sup>e</sup> percentile. Sources : (a) et (c) simulations CMIP5, scénario RCP4.5, (b) et (d) adaptation d'après Orlowsky et Seneviratne (2012)(IPCC2013). . . . .	18
1.5	Décroissance de la proportion de CO <sub>2</sub> de l'atmosphère suite à une émission idéalisée de 100 PgC. les graphes (a) et (b) est une moyenne de modèles (Joos <i>et al.</i> , 2013), le graphe (c) est une moyenne d'autres modèles (Archer <i>et al.</i> , 2009). Modifié d'après (Ciais <i>et al.</i> , 2014). . . . .	20
1.6	schéma des flux de carbone entre une tourbière et l'atmosphère . . . . .	21
1.7	Productivités moyennes des espèces de sphaignes en g m <sup>-2</sup> an <sup>-1</sup> . Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard. Le nombre d'observation est indiqué par les nombres à l'intérieur des barres. Les espèces en orange sont celles rencontrées sur le site d'étude. modifié d'après Gunnarsson (2005) . . . . .	25
2.1	Site d'études SNO . . . . .	32
2.2	Carte de la tourbière de La Guette . . . . .	33
2.3	Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure. . . . .	35
2.4	Évolution du niveau de la pluviométrie, en mm, des années 2011 à 2014 . . . . .	36
2.5	Évolution du niveau de la nappe, en cm par rapport à la surface, des années 2011 à 2014 . . . . .	36
2.6	Évolution de la température de l'air (en °C) des années 2011 à 2014 . . . . .	37
2.7	Mesures de CO <sub>2</sub> . . . . .	40
2.8	SPIRIT . . . . .	41
3.1	Répartition des 20 placettes de mesures suivant un échantillonnage aléatoire stratifié. . . . .	47
3.2	Cas idéaux de distribution des résidus (source ?) . . . . .	52
3.3	Partitionnement des placettes en fonction de leur similarité en termes de composition végétale (pourcentage des strates muscinales, herbacées et arbustives) . . . . .	53

3.4	Évolution du niveau de la nappe moyen des 20 embases mesuré pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015) . . . . .	54
3.5	Évolution des températures de l'air (Tair) et du sol à -5, -30, -50 et -100 cm (T5, T30, T50 et T100 respectivement) moyenne mesurée lors des campagnes de terrain de mars 2013 à février 2015 . . . . .	55
3.6	Évolution de la conductivité pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015) . . . . .	55
3.7	Évolution du pH pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015) . . . . .	56
3.8	Évolution de la concentration en carbone organique dissous dans l'eau du sol pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015) . . . . .	56
3.9	Évolution du niveau de PPB, RE et ENE pendant la période de mesure. Moyenne des 20 embases de mars 2013 à février 2015. . . . .	57
3.10	Évolution des flux de méthane moyen (N ?) pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015) . . . . .	59
3.11	Relations entre les flux de gaz et une sélection de facteurs contrôlant . . . . .	60
3.12	PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.1 . . . . .	61
3.13	PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.3 . . . . .	63
3.14	RE modèles avec Tair . . . . .	65
3.15	RE modèles avec Tair . . . . .	66
3.16	CH <sub>4</sub> modèle H . . . . .	66
3.17	Flux de CO <sub>2</sub> interpolé à partir de PPB-1 et PPB-2 . . . . .	69
3.18	Flux de CO <sub>2</sub> interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3 . . . . .	70
3.19	Flux de CO <sub>2</sub> interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3 . . . . .	70
3.20	Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres des modèles RE-1 et RE-3 . . . . .	73
3.21	Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2 . . . . .	74
3.22	Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2 . . . . .	75
4.1	Prélèvement des mésocosmes . . . . .	87
4.2	Schéma d'un mésocosme . . . . .	88
4.3	Expérimentation A : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux, CH <sub>4</sub> , RE, PPB, ENE en $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ , B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent à la phase de dessiccation (D) en rouge et à la phase de réhumectation (R) en bleu. . . . .	89
4.4	Expérimentation B : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux, CH <sub>4</sub> , RE, PPB, ENE en $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ , B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent aux phases de dessiccation (D) en rouge et aux phases de réhumectation (R) en bleu. . . . .	92
4.5	Relations entre les flux de GES et le niveau de la nappe . . . . .	95
5.1	Ecosystem Respiration (ER), air and peat temperature, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT). . . . .	107
5.2	Time delay between temperature at different depths and ER, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT) . . . . .	108

5.3	Profile of R <sup>2</sup> and NRMSE, (RMSE, normalized by the mean), with depth, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT) using the exponential model. . . . .	111
5.4	Profile of Q <sub>10</sub> with depth for synchronised (white) and non synchronised (black) data and exponential model in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT). . . . .	113
5.5	Differences between daytime and nighttime measurements using 3 models : non-synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – NS), synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – S), and non-synchronised data at air temperature (Tair). . . . .	114
6	Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure. . . . .	136
7	Calibration de la biomasse en fonction de la hauteur . . . . .	137
8	Scanne des feuilles . . . . .	137
9	Calibration de la biomasse herbacées pour <i>molinia Caerulea</i> (a), pour <i>eriophorum</i> (b) et de la surface de feuille pour <i>molinia Caerulea</i> (c), pour <i>eriophorum</i> (d) en fonction de la hauteur . . . . .	138



# Liste des tableaux

1.1	Estimations des stocks de C pour différents environnements . . . . .	14
1.2	Surface de tourbe utilisée selon les usages considérés (tourbières non-tropicale). Modifié d'après Joosten et Clarke (2002). . . . .	16
1.3	Vitesse apparente d'accumulation du carbon à long terme en $\text{gC m}^{-2} \text{s}^{-1}$	29
3.1	Valeur des paramètres des équations utilisées pour modéliser les flux et sensibilité relative (en %) des flux en réponse à une variation de $\pm 10\%$ de chacun des paramètres des modèles. . . . .	68
3.2	Bilan des flux en gCm2an1 . . . . .	71
3.3	Bilan des flux en gCm2an1 . . . . .	71
3.4	Sensibilité relative (en %) du bilan de CO <sub>2</sub> (ENE) en réponse à une variation de $\pm 10\%$ de chacun des paramètres des modèles. . . . .	72
3.5	Bilan des flux de CO <sub>2</sub> en gCm2an1, en utilisant PPB-2 et RE-3 . . . . .	75
4.1	Récapitulatif des mesures pour les deux expérimentations . . . . .	87
5.1	R <sup>2</sup> and NRMSE profile with depth for models using non-synchronised and synchronised data and for the three equations (linear : lin, exponential : exp, arrhenius : arr). . . . .	109
5.2	Peat chemical properties as a function of depth in cm : content (%) N, C, H, S, the total, retention and effective porosity, $\Phi_T$ , $\Phi_R$ , $\Phi_E$ respectively in $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$ , solid peat volumic fraction in $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$ and the bulk density (Bd) in $\text{g.cm}^{-3}$ . . . . .	115



# Remerciements

Fatima, Christophe, Sébastien Franck, Fabien Marielle Emélie, Étienne, Zi, Tianyi, Sarah, Paul, Xiaole, Guillaume Frédéric Stéphane Gilles Catherine, Catherine, Marie-Noëlle, Olivier



# <sup>1</sup> Introduction

---

## <sup>2</sup> Contexte général

<sup>3</sup> En 1957, Charles David Keeling, scientifique américain, met au point et utilise  
<sup>4</sup> pour la première fois, un analyseur de gaz infra-rouge pour mesurer la concentration  
<sup>5</sup> de CO<sub>2</sub> de l'atmosphère sur l'île d'Hawaii, à Mauna Loa. La précision et la fréquence  
<sup>6</sup> importante de ses mesures lui permirent de voir pour la première fois les variations  
<sup>7</sup> journalière et saisonnière des concentrations en CO<sub>2</sub> atmosphérique, mais également à  
<sup>8</sup> plus long terme leur tendance haussière [Harris \(2010\)](#). Le CO<sub>2</sub> est un gaz à effet de serre  
<sup>9</sup> (GES) et son accumulation dans l'atmosphère... **force ? comparaison ? explication**  
<sup>10</sup> **effet de serre ?** Ce constat a probablement joué un rôle considérable dans la prise de  
<sup>11</sup> conscience, par la communauté scientifique, de l'importance et de l'intérêt de l'étude du  
<sup>12</sup> changement climatique et plus largement des changements globaux. Car si à l'époque  
<sup>13</sup> les concentration en CO<sub>2</sub> était inférieure à 320 ppm (partie par millions) elles ont  
<sup>14</sup> dépassées, au printemps 2014, la barre symbolique des 400 ppm selon un communiqué  
<sup>15</sup> de l'Organisation Météorologique Mondiale. Les concentrations pré-industrielles (avant  
<sup>16</sup> 1800) sont quand à elles généralement estimée à 280 ppm [Siegenthaler et Oeschger](#)  
<sup>17</sup> ([1987](#)).

<sup>18</sup> Aujourd'hui, que ce soit pour le comprendre, le caractériser ou bien le prédire,  
<sup>19</sup> de nombreux **Combien ? cf fact sheet IPCC** scientifiques dans un grand nombre  
<sup>20</sup> de disciplines, travaillent directement ou indirectement sur les changements globaux.  
<sup>21</sup> Ils sont nombreux également à collaborer au sein du Groupe d'experts Intergouver-  
<sup>22</sup> nemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), qui rassemble, évalue et synthétise les  
<sup>23</sup> connaissances internationales liée au sujet.

<sup>24</sup> De manière générale, parmi les flux de C mesurés entre la biosphère et l'atmosphère,  
<sup>25</sup> la respiration et la photosynthèse sont les plus important, 98 et 123 PgC/yr pour le flux  
<sup>26</sup> de respiration globale (+ les feux) et la photosynthèse respectivement [Bond-Lamberty](#)  
<sup>27</sup> et [Thomson \(2010\)](#); [Beer et al. \(2010\)](#). Pour comparaison les flux liés à la production  
<sup>28</sup> de ciment et aux ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz) représentent 7.8 PgC/yr

29 Ciais *et al.* (2014).

30 Étroitement lié aux changements globaux, le cycle du carbone est particulièrement étudié, quels sont les réservoirs, quels sont les flux et comment vont-ils évoluer ?

32 **schéma ?**

33 Zones humides tourbières

34 historique des tourbières, généralités sur l'histoire des tourbières vis à vis des  
35 hommes Sujets principaux qui ont menés à l'étude des tourbières jusqu'à nos jours  
36 (Exploitation, effet de serre)

37 Pourquoi étudier les tourbières aujourd'hui ?

38 L'étude des tourbières se poursuit car, en plus de rendre de nombreux services éco-  
39 logiques (épuration du sol, régulation des flux hydriques, biodiversité), elles constituent  
40 un stock de carbone relativement important au regard de la surface qu'elle occupent.

41 Ainsi il est généralement admis que les tourbières contiennent un quart à un tiers  
42 du carbone présent Chiffres (**surfaces...**) dans l'ensemble des terres émergées tandis  
43 qu'elle ne constituent que 3 % des surfaces continentales (**Réf needed**). Ce ratio rela-  
44 tivement important, correspond à un stock d'environ 455 Gt Gorham (1991); Turunen  
45 *et al.* (2002) est à mettre perspective avec les autres stock du cycle du carbone. On  
46 observe que ce stock est du même ordre de grandeur que celui de la végétation

47 En conséquence dans un contexte \*\*d'augmentation des GES dans l'atm et de  
48 réchauffement\*\*, l'évolution de ce stock, sa pérennité ou sa remobilisation est un sujet  
49 d'étude important. De plus cette importance n'est à ce jour pas prise en compte de  
50 façon spécifique dans les modèles climatiques globaux.

51 En France les tourbières s'étendent sur environ 60 000 Ha ((**Réf needed**)).

52 Transition modèles

53 En octobre 2013 le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat  
54 (GIEC) a publié le rapport du groupe de travail I qui travaille sur les aspects scientifique  
55 physique du système et du changement climatique. S'il note que les connaissances ont  
56 avancées, il note également que de nombreux processus ayant trait à la décomposition  
57 du carbone sont toujours absents des modèles notamment en ce qui concerne le carbone

---

58 des zones humides boréales et tropicales et des tourbières. (Réf needed)

## 59 Objectif de la thèse et approche mise en oeuvre

60 L'objectif de ces travaux est donc de mieux comprendre la dynamique du carbone  
61 au sein des tourbières. Tout d'abord en caractérisant la variabilité spatiale et temporelle  
62 des flux de carbone à travers l'établissement de bilan de carbone. De déterminer quels  
63 facteurs environnementaux contrôlent le fonctionnement comme puits ou source de  
64 carbone de ces écosystèmes. Enfin construire, dans un esprit de synthèse et d'ouverture  
65 et à l'aide des connaissances acquise, un modèle intégrateur permettant un lien avec  
66 les modèles globaux et notamment ORCHIDE, afin que ces écosystèmes puissent être  
67 pris en compte à cette échelle.

68 Pour atteindre ces objectifs, nos travaux ont été articulés autour de trois volets  
69 **volet... t'as pas mieux ? Branche ? -\_-**" principaux : Dans un premier temps,  
70 l'**observation** régulière des flux de gaz ( $\text{CO}_2$  et  $\text{CH}_4$ ) ainsi que d'un certain nombre de  
71 paramètres environnementaux servant à la caractérisation des variabilités spatiales et  
72 temporelles, ainsi qu'à l'étude des facteurs contrôlant. Certains facteurs contrôlant qui  
73 sont, dans un second temps, étudiés plus spécifiquement à travers un volet **expérimenta-**  
74 **tion**. Ce dernier doit permettre une meilleure compréhension de processus clé avec  
75 notamment l'impact de l'hydrologie. Enfin un troisième volet axé sur la **modélisation**,  
76 avec le développement d'un modèle le plus mécaniste possible.

77 Cette thèse est structurée de la façon suivante : Le chapitre 1 est une synthèse  
78 bibliographique, un état de l'art des connaissances liées au sujet. Les chapitres 2 et  
79 3 rassemblent les travaux du volet observation, ils concernent respectivement le suivi  
80 XX et le suivi YY Les chapitres 4 et 5 développent la partie expérimentale à travers  
81 l'impact d'un assèchement et celui d'un rehaussement du niveau de l'eau. Le chapitre 6  
82 concerne plus spécifiquement la modélisation, même si ce volet interviendra par ailleurs  
83 de façon transverse dans les autres chapitres. Enfin une conclusions et des perspectives

<sup>84</sup> seront exposées.



<sup>85</sup> 1 Synthèse Bibliographique

<sup>86</sup>

<sup>87</sup>	<b>1.1 Les tourbières et le cycle du carbone . . . . .</b>	<b>8</b>
<sup>88</sup>	1.1.1 Zones humides et tourbières : définitions et terminologies . . . . .	8
<sup>89</sup>	1.1.2 Tourbières et fonctions environnementales . . . . .	13
<sup>90</sup>	1.1.3 Les tourbières et les changements globaux . . . . .	15
<sup>91</sup>	<b>1.2 Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants . . . . .</b>	<b>19</b>
<sup>92</sup>	1.2.1 GES et Tourbières . . . . .	19
<sup>93</sup>	1.2.2 Les flux entre l'atmosphère et les tourbières . . . . .	20
<sup>94</sup>	1.2.3 Les facteurs majeurs contrôlant les flux . . . . .	23
<sup>95</sup>	1.2.4 Bilans de carbone . . . . .	28
<sup>96</sup>		
<sup>97</sup>		
<sup>98</sup>		

## **1.1. Les tourbières et le cycle du carbone**

---

99 La première partie de ce chapitre traite des tourbières de façon générale : Que  
100 sont ces écosystèmes ? Quelle terminologie y est associée ? Comment se forment-ils ?  
101 Quelle est leur situation dans le monde d'aujourd'hui ? La seconde partie traite plus  
102 spécifiquement des tourbières à travers le prisme des flux de carbone, principalement  
103 gazeux. Quels sont les facteurs qui contrôlent ces flux ? Quels bilans de carbone pour  
104 ces écosystèmes ?

### **105 1.1 Les tourbières et le cycle du carbone**

106 Que se soit dans leurs définitions, leurs modes de formation, les tourbières sont  
107 indissociables du cycle du carbone.

#### **108 1.1.1 Zones humides et tourbières : définitions et terminologies**

##### **109 Définitions**

110 Les tourbières font partie d'un ensemble d'écosystèmes plus large que l'on appelle les  
111 zones humides. Ces zones humides ne sont ni des écosystèmes terrestres au sens strict,  
112 ni des écosystèmes aquatiques. Elles sont à la frontière entre ces deux mondes et sont  
113 caractérisées par un niveau de nappe élevé, proche de la surface du sol, voire au dessus.  
114 Cette omniprésence de l'eau joue fortement sur l'aération du milieu et constraint, de  
115 façon plus ou moins importante, l'accès à l'oxygène. Les zones humides ont été définie  
116 en 1971, lors de la convention dite de RAMSAR<sup>1</sup> de la façon suivante :

---

1. La convention de RAMSAR est un traité international visant à la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides.

**ZONES HUMIDES :**

«les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes<sup>2</sup>, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.»

(Ramsar, 1987)

Les zones humides regroupent donc des écosystèmes très variés parmi lesquels les marais, les mangroves, les plaines d'inondations et les tourbières. Ces dernières ont comme particularité d'avoir, comme toutes les zones humides, un niveau de nappe élevé et donc une zone anaérobiose importante. Ceci induit le développement de communautés microbienne et végétales spécifiques, adaptées aux milieux fortement humides ou inondés.

Les tourbières représentent 50 à 70 % des zones humides Joosten et Clarke (2002). Leur définition est variable selon les régions ((Réf needed), exple). Deux définitions sont régulièrement utilisées :

**TOURBIÈRE :**

Écosystèmes, avec ou sans végétation, possédant au moins 30 cm de tourbe naturellement accumulée.

Définition traduite d'après Joosten et Clarke (2002)

Cette première définition correspond au *peatland* anglo-saxon. L'épaisseur de tourbe accolée à cette définition peut varier selon le pays, elle est par exemple établie à 40 cm au Canada (National Wetlands Working Group, 1997).

**TOURBIÈRE ACTIVE :**

Écosystèmes dans lesquels un processus de tourbification est actif.

Définition traduite d'après Joosten et Clarke (2002)

2. Marais tourbeux situé sur une hauteur

## 1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

---

132 Cette seconde définition correspond au *mire* anglo-saxon et peut être traduite en fran-  
133 çais par le terme de tourbière active. Les concepts derrières ces deux définitions se  
134 chevauchent mais ne sont pas complètement similaires : une tourbière drainée peut  
135 avoir plus de 30 cm de tourbe et ne plus former de tourbe, ne plus être active. À l'in-  
136 verse il peut exister des zones où l'épaisseur de tourbe est inférieure à 30 cm malgré  
137 un processus de tourbification actif. Un même écosystème tourbeux pouvant d'ailleurs  
138 avoir à la fois des zones correspondant à la première définition et d'autres à la seconde.  
139 Les tourbières sont donc, selon la définition utilisée, des écosystèmes contenant ou des  
140 écosystèmes formant de la tourbe. Mais qu'est ce que la tourbe ?

### TOURBE :

141 «Accumulation sédentaire de matériel composé d'au moins 30 % (matière  
sèche), de matières organiques mortes.»

Définition traduite d'après [Joosten et Clarke \(2002\)](#)

142 Le seuil de 30 %, souvent utilisé pour rapprocher sa définition de celle d'un sol orga-  
143 nique (histosol) au sens large, dans lesquels sont classés la majorité des sols tourbeux.  
144 D'autres définitions existent, faisant la distinction entre sols organiques et tourbes avec  
145 un seuil à 75 % ([Andrejko et al., 1983](#)) ou 80 % ([Landva et al., 1983](#)). Il est également  
146 nécessaire de préciser que, au delà de la classification utilisée, ce que les écologues  
147 considèrent comme de la tourbe contient généralement 80 % de matières organiques au  
148 minimum ([Rydin et Jeglum, 2013b](#)). Ce processus de formation est appelé la tourbifica-  
149 tion ou turfogénèse et les matières organiques accumulées proviennent majoritairement  
150 de la végétation. On définit les matières organiques de la façon suivante :

### MATIÈRES ORGANIQUES :

151 Matières constituées d'un assemblage de composés ayant une ou plusieurs  
liaisons C–H. Ces matières sont composées de nombreux éléments dont  
des carbohydrates (sucres, cellulose ...), des composés azotés (protéines,  
acides aminés ...) et phénoliques (lignine ...), des lipides (cires, résines,  
...) et d'autres<sup>3</sup>.




FIGURE 1.1 – Micro-topographie dans les tourbières. Modifié d’après [Rydin et Jeglum \(2013a\)](#)

## <sup>152</sup> Distribution des tourbières à l'échelle mondiale

<sup>153</sup> Ces variations de définitions ajoutées aux limites floues qui peuvent exister entre  
<sup>154</sup> certain écosystèmes tourbeux et non-tourbeux rendent la cartographie de ces écosys-  
<sup>155</sup> tèmes délicate. Les estimations généralement citées évaluent la surface occupée par  
<sup>156</sup> les tourbières à environ 4 000 000 km<sup>2</sup> ([Lappalainen, 1996](#)). Cette surface correspond  
<sup>157</sup> à 2 à 3 % de l’ensemble des terres émergées du globe. Plus de 85 % d’entre elles sont  
<sup>158</sup> situés dans l’hémisphère nord, majoritairement dans les zones boréales et sub-boréales  
<sup>159</sup> ([Strack, 2008](#)) (Figure 1.2). Ce sont sur ces écosystèmes que sera focalisé ce travail, lais-  
<sup>160</sup> sant de côté les tourbières tropicales dont le fonctionnement est distinct et spécifique  
<sup>161</sup> (**Réf needed**).

## <sup>162</sup> La formation des tourbières

<sup>163</sup> L’atterrissement et la paludification sont les deux processus principaux permettant  
<sup>164</sup> la formation des tourbières. Il s’agit pour le premier du comblement progressif d’une

3. Cette définition, utile pour définir simplement les matières organiques, est cependant limitée car elle inclue des composés traditionnellement considérés comme minéraux (le graphite) et exclue certains autres considérés comme organiques (acide oxalique) (Liste de diffusion ResMO).

## 1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

---




FIGURE 1.2 – Global distribution of peatlands

165 zone d'eau stagnante. La paludification est la formation de tourbe directement sur un  
166 sol minéral, grâce à des conditions d'humidité importante. Ces modes de formation ne  
167 sont pas exclusif, une tourbière pouvant se développer, selon les endroits considérés ou  
168 le temps, via des processus différents.

### 169 Classifications

170 Différentes classifications sont utilisées pour différencier ces écosystèmes. La plus  
171 générale et la plus utilisée dans la littérature distingue les tourbières dite haute, ou de  
172 haut marais, correspondant au *bog* anglais, et les tourbières basse, ou de bas marais,  
173 correspondant au *fen* anglais.

174 Les tourbières de haut-marais ont généralement une épaisseur de tourbe supérieure  
175 à 30 cm et sont alimentées principalement par les précipitations : elles sont dites ombro-  
176 trophes. Leur surface parfois bombée (tourbières élevées ou bombées) peut également  
177 être plate ou en pente. Cette géométrie situe une partie au moins de l'écosystème au  
178 dessus du niveau de la nappe. Elles ont une concentration en nutriments relativement  
179 faible : elles sont oligotrophes et sont fortement acide avec des eaux de surface dont le  
180 pH est autour de 4 voire moins.

181 Les tourbière de bas-marais ont une épaisseur généralement supérieure à 30 cm avec  
182 un niveau de nappe très proche de la surface du sol. De forme concave ou en pente elles  
183 sont généralement alimentée en eaux par des sources ou par ruissellement et sont donc  
184 dites minerotrophes. Le pH de leur eaux de surface varient de 4 à 8. Les végétations  
185 dominantes de ces écosystèmes peuvent être des bryophytes, des graminées ou des  
186 arbustes bas.

### 187 1.1.2 Tourbières et fonctions environnementales

#### 188 Biodiversité dans les tourbières

189 Les tourbières sont le siège d'une biodiversité importante et spécifique. Ainsi les  
190 Sphaignes, qui sont des bryophytes, (des mousses) sont caractéristiques des écosystèmes  
191 tourbeux. Ce sont des espèces dites ingénierues, capables de modifier l'environnement  
192 dans lequel elles vivent afin de l'adapter à leurs besoins. Les sphaignes sont ainsi capable  
193 d'abaisser le pH, de capter des nutriments et de les séquestrer et ce même quand  
194 elles n'en ont pas besoin afin d'empêcher d'autres espèces notamment vasculaire d'en  
195 profiter. Plus précisément, le fait que les sphaignes captent les nutriments via leur  
196 capitulum leur permet de les intercepter avant qu'ils ne soient captés par d'éventuelles  
197 racines positionnées plus bas ([Malmer et al., 1994](#); [Svensson, 1995](#)). Les sphaignes,  
198 comme de nombreuse mousses ont des litières relativement récalcitrantes<sup>4</sup> ([Hobbie,](#)  
199 [1996](#); [Liu et al., 2000](#)). La vitesse de décomposition relative entre les différentes espèces  
200 de sphaignes est mal connue ([Cornelissen et al., 2007](#)). Des différences ont été observées  
201 entre espèces pour les parties jeunes de la plante, mais la différence est moindre pour  
202 les parties plus anciennes ([Limpens et Berendse, 2003](#)).

---

4. il est d'usage de parler de litières récalcitrantes sans plus de précision. Il s'agit en fait de litières difficilement dégradables

## 1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

---

Tableau 1.1 – Estimations des stocks de C pour différents environnements

Compartiment	Stock (en Gt de C)	référence
Tourbières	270 – 455	<a href="#">Gorham (1991); Turunen <i>et al.</i> (2002)</a>
Végétation	450 – 650	<a href="#">Robert et Saugier (2003)</a>
Sols	1500 – 2000	<a href="#">Robert et Saugier (2003); Post <i>et al.</i> (1982); Eswaran <i>et al.</i> (1993)</a>
CO <sub>2</sub> atmosphérique	750 – 800	<a href="#">Robert et Saugier (2003)</a>
Permafrost	1700	

203 **Qualité des eaux**

204 **Puits de carbone**

205 Par définition les tourbières stockent ou ont stocké du carbone. C'est cette fonction  
206 de puits de carbone qui rend l'importance de ces écosystèmes non négligeable malgré  
207 la faible surface qu'ils représentent. Les estimations du stock de carbone présent dans  
208 les tourbières tempérées/boréales sont comprises entre 270 et 455 Gt C ([Gorham, 1991](#);  
209 [Turunen \*et al.\*, 2002](#)). Les différences entre les estimations sont liées aux incertitudes  
210 de cartographie citées précédemment auxquelles s'ajoutent des incertitudes concernant  
211 l'épaisseur et la densité moyenne de la tourbe. Le carbone stocké dans les tourbières  
212 représente 10 à 25 % du carbone présent dans les sols et entre 30 et 60 % du stock de  
213 carbone atmosphérique.

214 Ce stock est un héritage datant des 10 derniers milliers d'années, l'holocène, période  
215 pendant laquelle se sont formés la majorité des tourbières (**Réf needed**) ([Yu \*et al.\*,  
216 2010](#)). Le fonctionnement naturel de ces écosystèmes permet le stockage du C. C'est un  
217 des services écologiques que rendent les tourbières et que l'on appelle la fonction puits  
218 de carbone. Cette fonction est liée au niveau élevé de la nappe d'eau, qui rend l'accès à  
219 l'oxygène plus difficile diminuant d'autant l'activité aérobie, dont la respiration des  
220 micro-organismes et des plantes. Cela se traduit par une dégradation relativement faible  
221 des matières organiques. Elle est également liée à la production de litière récalcitrante  
222 par les bryophytes.

223 En comparaison avec un sol forestier, l'accumulation de matières organiques n'est  
224 donc pas lié à une production primaire plus forte, mais bien à une dégradation des

225 matières produites plus faible.

226 Ces perturbations peuvent induire des modifications de fonctionnement, notamment  
227 l'envahissement de ces écosystèmes par une végétation vasculaire, et changer cette  
228 fonction puits.

### 229 **1.1.3 Les tourbières et les changements globaux**

230 On définit les changements globaux comme l'ensemble des modifications environne-  
231 mentales plus ou moins rapides, ayant lieu à l'échelle mondiale, quelle que soit leur ori-  
232 gine. Les deux contraintes développées dans cette partie sont la pressions de l'homme :  
233 contrainte anthropique, et celle du climat : contrainte climatique.

#### 234 **Contrainte anthropique**

235 L'interaction entre les Hommes et les zones humides au sens large et les tourbières  
236 en particulier remonte probablement à l'aube de l'humanité. De grandes découvertes  
237 archéologiques ont été faites dans ces écosystèmes témoins d'époques révolues. Des  
238 chemins de rondins néolithique aux crannogs de l'époque romaine ([Buckland, 1993](#)).

239 L'utilisation de la tourbe et des tourbières a du commencer relativement tôt, mais c'est  
240 à partir du 17<sup>e</sup> siècle que le drainage de ces écosystèmes, pour les convertir en terres  
241 agricoles, s'est intensifié. Au 19<sup>e</sup> siècle, l'apparition de machines permettant une ré-  
242 colte industrialisée de la tourbe, a développé son utilisation comme combustible. Enfin  
243 depuis le milieu du 20<sup>e</sup> une part importante de ces écosystèmes ont été drainé pour  
244 développer la sylviculture. Aujourd'hui l'exploitation principale de la tourbe est liée à  
245 son utilisation comme substrat horticole ([Lappalainen, 1996; Chapman \*et al.\*, 2003](#)).

246 Suite à ces perturbations, la surface de tourbières altérée est estimée à 500 000 km<sup>2</sup> en-  
247viron, principalement du fait de leur reconversion pour l'agriculture et la sylviculture  
248 ([Tableau 1.2](#)). En France, suite à leur utilisation, principalement agricole, la surface  
249 des tourbières a été par deux entre 1945 et 1998, passant de 1200 km<sup>2</sup> à 600 km<sup>2</sup> ([Lap-](#)  
250 [palainen, 1996; Manneville, 1999](#)).

251 Ces écosystèmes ont donc été et sont encore perturbés par différentes activités

## 1.1. Les tourbières et le cycle du carbone

---

Tableau 1.2 – Surface de tourbe utilisée selon les usages considérés (tourbières non-tropicale). Modifié d'après [Joosten et Clarke \(2002\)](#).

Utilisation	Surface (km <sup>2</sup> )	proportion (%)
Agriculture	250 000	50
Sylviculture	150 000	30
Extraction de tourbe	50 000	10
Urbanisation	20 000	5
Submersion	15 000	3
Pertes indirectes (érosion, ...)	5000	1
Total	490 000	100

<sup>252</sup> humaines.

## <sup>253</sup> Contrainte climatique

<sup>254</sup> Comme nous l'avons dit, le stock de C accumulé par les tourbières s'est majoritairement constitué pendant l'Holocène. À cette époque déjà ces écosystèmes étaient influencés par le climat, et leur développement n'a pas été linéaire sur ces douze derniers milliers d'années. Il est reconnu que le développement des tourbières est très important au début de cette période entre il y a 12 000 et 8000 ans ([Smith et al., 2004](#); [MacDonald et al., 2006](#); [Yu et al., 2009](#)). Cette période coïncide avec le maximum thermique holocène (HTM), période pendant laquelle le climat était plus chaud que aujourd'hui ([Kaufman et al., 2004](#)). Ce constat peu sembler paradoxal si l'on considère que dans la littérature concernant les tourbières et le réchauffement actuel, la crainte de voir ces écosystèmes se transformer en source de C est majoritaire. Cependant ces mêmes auteurs qui ont montré cette relation, entre le HTM et le développement important des tourbières, ne préjugent pas de l'effet du réchauffement actuel. Notamment [Jones et Yu \(2010\)](#) expliquent que pendant cette période de maximum thermique, existe également une saisonnalité très importante, avec des été chauds et des hivers froid, qui a dû en minimisant la respiration hivernale de ces écosystèmes, jouer un rôle important dans leur développement.

<sup>270</sup> Cette forte saisonnalité n'est pas attendue lors du réchauffement actuel. L'effet estimé dans les hautes latitudes, semble plus important pendant l'hiver et l'automne,




FIGURE 1.3 – Nombre de tourbières nouvellement formées pendant l'holocène. Modifié d'après ([MacDonald \*et al.\*, 2006](#))

272 et tendrait donc à la minimiser ([Christensen \*et al.\*, 2007](#)). Les effets directs attendus  
 273 du réchauffement dans les hautes latitudes sont une augmentation des températures de  
 274 2 à 8 °C dans les zones boréales, et de 2 à 6 °C dans les zones tempérées, ainsi qu'une  
 275 augmentation probable des précipitations ([Christensen \*et al.\*, 2013; Frolking \*et al.\*,](#)  
 276 [2011](#)). De façon plus indirecte est attendue la fonte du permafrost, l'augmentation de  
 277 l'intensité et de la fréquence de feux et des changements dans les compositions des  
 278 communautés végétales.

279 Les tourbières, qui ont accumulées un stock de carbone important, sont donc sou-  
 280 mises à des contraintes fortes. Afin de mieux cerner le devenir de ce carbone, l'étude de  
 281 ces écosystèmes, des flux de gaz qu'ils échangent avec l'atmosphère, est une nécessité.




FIGURE 1.4 – Projection des changements à l’horizon 2100, des moyennes et extrêmes annuels (sur terre) des températures de l’air et des précipitations : (a) température de surface moyenne par °C de changement global moyen, (b) 90<sup>e</sup> percentile des températures journalières maximum par °C de changement de température moyenne maximale, (c) précipitations moyenne (en % par °C de changement de température moyenne) et (d) fraction de jours ayant des précipitations dépassant le 95<sup>e</sup> percentile. Sources : (a) et (c) simulations CMIP5, scénario RCP4.5, (b) et (d) adaptation d’après Orlowsky et Seneviratne (2012)(IPCC2013).

## 282 1.2 Flux de gaz à effet de serre et facteurs 283 contrôlants

### 284 1.2.1 GES et Tourbières

285 Dans l'atmosphère le carbone est principalement présent dans l'atmosphère sous  
286 forme de dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ) et de méthane ( $\text{CH}_4$ ).

287 La concentration en  $\text{CO}_2$  dans l'atmosphère fluctuait avant l'ère industrielle entre  
288 180 et 290 ppm. En 1750 au début de l'ère industrielle sa concentration était toujours  
289 de 280 ppm avant d'augmenter pour atteindre 391 ppm aujourd'hui (en 2011) (Ciais  
290 *et al.*, 2014). Différents processus permettent d'extraire du  $\text{CO}_2$  de l'atmosphère, la  
291 photosynthèse, la dissolution du  $\text{CO}_2$  dans l'océan et enfin l'altération de silicate et les  
292 réactions avec le carbonate de calcium. Ces processus s'effectuent avec des échelles de  
293 temps différentes, en conséquence après une émission de  $\text{CO}_2$ , il ne reste que 40 % de  
294 cette émission après 100 ans, mais il reste toujours plus de 20 % après 1000 ans et plus  
295 de 10 % après 10 000 ans (Joos *et al.*, 2013; Ciais *et al.*, 2014) (Figure 1.5).

296 La concentration en méthane de l'atmosphère est estimée à 350 ppb il y a 18 000 ans  
297 environ lors de la dernière glaciation, à 720 ppb en 1750, et à 1800 ppb aujourd'hui (ou  
298 plutôt en 2011) (Ciais *et al.*, 2014). À l'inverse du  $\text{CO}_2$  sa durée de vie dans l'atmosphère  
299 est limitée : moins de 10 ans (Lelieveld *et al.*, 1998; Prather *et al.*, 2012). Malgré sa faible  
300 durée dans l'atmosphère son potentiel de réchauffement global (PRG) est important 72  
301 à 20 ans. Les zones humides sont la première source naturelle de  $\text{CH}_4$  atmosphérique  
302 pour avec un flux à l'échelle globale estimé entre 145 et 285  $\text{Tg an}^{-1}$  (Lelieveld *et al.*,  
303 1998; Wuebbles et Hayhoe, 2002; Ciais *et al.*, 2014) (Tableau ?). Les tourbières de  
304 l'hémisphère nord comptent pour 46  $\text{Tg an}^{-1}$  (Gorham, 1991) (pas de source plus  
305 récente ?).

306 À l'échelle globale, le stockage de C par les tourbières, prenant en compte à la fois




FIGURE 1.5 – Décroissance de la proportion de CO<sub>2</sub> de l'atmosphère suite à une émission idéalisée de 100 PgC. les graphes (a) et (b) est une moyenne de modèles ([Joos et al., 2013](#)), le graphe (c) est une moyenne d'autres modèles ([Archer et al., 2009](#)). Modifié d'après ([Ciais et al., 2014](#)).

<sup>307</sup> le CO<sub>2</sub> et le CH<sub>4</sub>, est estimé à 70 Tg an<sup>-1</sup> ([Clymo et al., 1998](#)).

### <sup>308</sup> 1.2.2 Les flux entre l'atmosphère et les tourbières

#### <sup>309</sup> De l'atmosphère à l'écosystème

Avant de stocker et de conserver du carbone, le faut le capturer. Ce transfert du carbone de l'atmosphère à la tourbe se fait sous la forme de CO<sub>2</sub>, assimilé par la photosynthèse, principalement des végétaux supérieurs, et éventuellement, bien que dans de moindre proportions, par des algues, des lichens ou des bactéries photosynthétiques [Girard et al. \(2011\)](#). On peut écrire la réaction de photosynthèse de la façon suivante :



<sup>310</sup> Ce flux est généralement appelé **Production Primaire Brute** (PPB), *Gross Primary Production*, (GPP) en anglais (Figure 1.6). Les tourbières sont des écosystèmes dont <sup>311</sup> la production primaire est estimée à environ 500 gC m<sup>-2</sup> ([Francez, 2000](#)). Si la photo-<sup>312</sup> synthèse est un processus majeur d'assimilation du CO<sub>2</sub>, il existe d'autres voies mé-<sup>313</sup>




FIGURE 1.6 – schéma des flux de carbone entre une tourbière et l'atmosphère

<sup>314</sup> taboliques permettant la capture du CO<sub>2</sub> de l'atmosphère. Ainsi les micro-organismes  
<sup>315</sup> chemolithotrophes (**expliquer**) sont capables d'assimiler le CO<sub>2</sub> en utilisant l'énergie  
<sup>316</sup> issue de l'oxydation de composés inorganiques.

<sup>317</sup> Les voies métaboliques permettant l'assimilation du CO<sub>2</sub> sont plutôt bien connues et  
<sup>318</sup> le fait que les substrats de départ de varient pas (mal dit..) a permis une compréhension  
<sup>319</sup> relativement fine du processus ([Farquhar et al., 1980](#)). Cependant une fois assimilé par  
<sup>320</sup> la végétation le devenir du carbone est moins direct. À plus long terme, et après son  
<sup>321</sup> assimilation par la plante, le carbone est stocké principalement à travers la partie non  
<sup>322</sup> décomposée des litières végétales. Litières qui à force de compressions et de tassements  
<sup>323</sup> va devenir de la tourbe.

<sup>324</sup> Il n'y a pas de flux direct de CH<sub>4</sub> de l'atmosphère vers les écosystèmes terrestres,  
<sup>325</sup> la majorité du méthane atmosphérique, 90 %, réagit avec des radicaux hydroxyles,  
<sup>326</sup> principalement dans la troposphère où il sera un précurseur de l'ozone

**327 De l'écosystème à l'atmosphère**

**328** Les sources de carbone émises par les tourbières vers l'atmosphère sont multiples.



**329** D'abord différents gaz peuvent être émis, notamment le CO<sub>2</sub> et le CH<sub>4</sub>, éventuellement  
**330** du N<sub>2</sub>O, et certains d'entre eux peuvent avoir plusieurs sources.

**331** Le CO<sub>2</sub> est émis dans l'atmosphère à travers différents processus, la respiration  
**332** aérobie (le plus gros contributeur), les respirations anaérobies ou fermentations (e.g.  
**333** du glucose, de l'acétate), ou encore l'oxydation du méthane. Les principales sources de  
**334** CO<sub>2</sub>, sont représentées dans la figure 1.6. La ou plutôt les respirations sont généralement  
**335** séparées en deux. D'un côté la respiration végétale, que ce soit celle de feuilles, des tiges,  
**336** des racines et que l'on appelle la **respiration autotrophe**. De l'autre rassemblé sous le  
**337** vocable de **respiration hétérotrophe**, la respiration de la rhizosphère, liée à l'émission  
**338** d'exsudats par les racines, la décomposition des litières et des matières organiques, la  
**339** respiration de la faune et l'oxydation du CH<sub>4</sub> par les organismes méthanotrophes. On  
**340** appelle **Respiration de l'Écosystème** (RE) l'ensemble des respirations autotrophe  
**341** et hétérotrophe, en incluant à la fois ses composantes aérienne et souterraine. On la  
**342** distingue de la respiration du sol qui est définie comme l'ensemble des respirations de  
**343** la colonne de sol, en excluant la partie aérienne. La production de CO<sub>2</sub> est donc un  
**344** signal intégré sur l'ensemble de la colonne de tourbe. C'est cette multitude de processus  
**345** qui rend l'estimation de ce flux difficile, en effet chacune des respirations n'aura pas la  
**346** même sensibilité vis à vis de facteurs contrôlant.

**347** La strate muscinale pouvant jouer/participer/produire jusqu'à 80 % de la produc-  
**348** tion primaire ([Francez, 2000](#)). Cette production primaire n'est pas particulière élevée  
**349** (**Réf needed**) et c'est en fait la faible décomposition des matières organiques qui per-  
**350** met aux tourbières de stocker du carbone. L'accumulation moyenne estimée dans les  
**351** tourbières boréales est de 30 gC m<sup>-2</sup>. Le taux d'accumulation varie en fonction des  
**352** espèces végétales présentes ((**Réf needed**)), le niveau d'eau ((**Réf needed**)), ... (??)

**353** Conséquence du niveau de nappe élevé des tourbières, le développement d'une zone  
**354** anoxique importante dans la colonne de sol favorise la production de CH<sub>4</sub>. En moyenne  
**355** des flux de CH<sub>4</sub> mesurés dans les tourbières s'étendent de 0 à plus 0,96 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>,

356 avec généralement des flux compris entre 0,0048 et 0,077  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  (Blodau, 2002).  
 357 Le CH<sub>4</sub> est principalement produit à partir d'acétate (CH<sub>3</sub>COOH) ou de dihydrogène  
 358 (H<sub>2</sub>), ces deux composés étant dérivés de la décomposition préalable de matières orga-  
 359 niques (Lai, 2009).



360 Le CH<sub>4</sub> produit est transporté dans l'atmosphère par diffusion, ébullition ou à travers  
 361 certaines plantes (Joabsson *et al.*, 1999; Colmer, 2003). Pendant ce transport le CH<sub>4</sub>  
 362 peut être oxydé par des organismes méthanolotrophes. Cette transformation produit  
 363 tour à tour différents composés (méthanol, formaldéhyde, formate) aboutissant à la  
 364 production de CO<sub>2</sub> (Whalen, 2005).



365 Le méthane (Lai2009, seger1998, barlett1993 review)

### 366 1.2.3 Les facteurs majeurs contrôlant les flux

367 Les facteurs qui contrôlent ces flux de carbone sont globalement connus : la tempé-  
 368 rature, le niveau de la nappe et la végétation. L'augmentation de la vitesse de réaction  
 369 de nombreuses réactions biochimiques avec la température est connue depuis long-  
 370 temps. Elle a été mise en évidence par un chimiste suédois en 1889 : Svante August  
 371 Arrhenius sur la base de travaux réalisés par un autre chimiste, néerlandais, Jaco-  
 372 bus Henricus Van't Hoff. Depuis, de nombreuses mesures de terrain confirment cette  
 373 relation (**Réf needed**). La photosynthèse et l'ensemble des respirations sont donc  
 374 contrôlées, au moins en partie, par la température. L'hydrologie est un autre facteur  
 375 contrôlant majeur. Le niveau de la nappe, défini ici comme la distance entre la sur-  
 376 face du sol de l'écosystème et le toit de l'aquifère/l'eau libre/la zone saturée, sépare la  
 377 colonne de tourbe en une zone oxique, et une zone anoxique. L'épaisseur relative de

## 1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

---

ces deux zones va influer sur la production du CO<sub>2</sub>, majoritairement produit dans la zone oxique, et du CH<sub>4</sub> produit dans la zone anoxique. Le niveau de la nappe contraint également le teneur en eau du sol et la hauteur de la frange capillaire qui va influer sur la végétation (Laiho, 2006). La végétation est également un facteur important. D'abord car elle exerce une influence directe sur les flux, avec d'un côté la photosynthèse et les respirations des plantes vivantes, ou la décomposition des plantes mortes. La composition des communautés végétales va également influer sur le potentiel photosynthétique de l'écosystème, ce potentiel pouvant varier selon le végétal considéré Moore *et al.* (2002), et sur la vitesse de décomposition des litières qui peut également varier en fonction du végétal. De façon plus indirecte, la végétation peut également stimuler la respiration des micro-organismes présent dans la rhizosphère<sup>5</sup> via la libération d'exsudats racinaires Moore *et al.* (2002). Enfin certaines plantes vasculaires, adaptées aux conditions de saturations en eau, peuvent faciliter l'échange de gaz entre l'atmosphère et l'écosystème grâce à un espace intercellulaire agrandi, l'Aerenchyme.

Cependant la sensibilité des flux à ces facteurs ne fait pas consensus et peut varier selon les conditions environnementales ou l'échelle de temps ou d'espace considérée. Par la suite nous considérons les processus à l'échelle d'une colonne de sol ou d'un écosystème

### Facteurs contrôlant la production primaire brute

Le premier facteur contrôlant la PPB est bien sur la végétation et notamment la composition végétale des communautés présentes. Les bryophytes n'ont pas la même productivité primaire que les graminées ou que les arbustes. En plus de ces différences entre groupes de végétaux, il existe également des différences de productivité pour un même groupe selon le type de tourbière (Moore *et al.*, 2002 dans Rydin et Jeglum, 2013b) . Alors que dans les tourbières de haut-marais, les sphagnes et les arbustes ont une productivité importante, les herbacées et graminées ont une productivité beaucoup plus faible. À l'inverse ce sont les herbes et les graminées qui ont la plus forte producti-

---

5. zone du sol impacté par les racines




FIGURE 1.7 – Productivités moyennes des espèces de sphaignes en  $\text{g m}^{-2} \text{an}^{-1}$ . Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard. Le nombre d'observation est indiqué par les nombres à l'intérieur des barres. Les espèces en orange sont celles rencontrées sur le site d'étude. modifié d'après Gunnarsson (2005)

405 vité dans les tourbières de bas-marais pauvres. Elles sont suivies par les sphaignes puis  
 406 les arbustes. Au sein même de ces groupes la productivité peut varier de façon impor-  
 407 tante, c'est ce que montrent Gunnarsson (2005) avec les sphaignes, dont la productivité,  
 408 selon l'espèce et les conditions dans lesquelles elle vit, varie fortement (Figure 1.7).

409 L'effet d'une variation du niveau de la nappe et de la température, jouant sur  
 410 la végétation va également jouer sur la PPB. Distinguer ces deux facteurs n'est pas  
 411 anodin, la majorité des études réalisées sur le terrain montre les effets des deux fac-  
 412 teurs combinés. Ainsi Cai *et al.* (2010) ont montré que des conditions plus chaudes  
 413 et sèches pouvaient augmenter la PPB. L'effet du niveau de la nappe peut varier se-  
 414 lon le contexte : Dans une étude des effets à long terme de variation du niveau de la  
 415 nappe, Ballantyne *et al.* (2014) montrent qu'une baisse du niveau de la nappe entraîne  
 416 une augmentation de la PPB en facilitant l'accès des plantes vasculaire à l'oxygène  
 417 et aux nutriments. Paradoxalement, la hausse d'un niveau de nappe, initialement bas  
 418 et entraînant un stress hydrique important, conduira également à une augmentation

## 1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

---

419 de la PPB ([Strack et Zuback, 2013](#)). Ces effets sont variables selon les communautés  
420 végétales et le contexte dans lequel elles se trouvent. Pour un gradient de niveau de  
421 nappe qui augmente dans une tourbière de haut-marais, [Weltzin et al. \(2000\)](#) montrent  
422 une diminution de la productivité des arbustes, tandis que celle des graminées n'est  
423 pas affectée. À l'inverse, pour un gradient similaire dans une tourbière de bas-marais,  
424 la productivité des arbustes n'est pas affectés tandis que celle des graminées augmente.  
425 Un opposition similaire est également relevé concernant les graminées soumises à un  
426 traitement infra-rouge afin de les réchauffer. Ces dernières voient leur productivité di-  
427 minuer dans la tourbière de haut-marais et augmenter dans la tourbière de bas-marais.  
428 [Munir et al. \(2015\)](#) isolent également l'effet de la température en utilisant des OTC  
429 (*Open Top Chamber*). Ces dispositifs, ressemblant à des serres ouvertes, permettent de  
430 réchauffer une zone de la tourbière. Ils montrent que dans les zones sans manipulation  
431 du niveau de la nappe, le réchauffement des OTC, augmente la PPB.

### 432 Facteurs contrôlant la respiration de l'écosystème

433 Un facteur majeur contrôlant la RE est la température. Dans des conditions plus  
434 sèches et plus chaude [Cai et al. \(2010\)](#) qui montrait une augmentation de la PPB,  
435 montre une augmentation plus importante encore de la RE. [Updegraff et al. \(2001\)](#)  
436 montrent, dans une expérimentation à base de mésocosme, que la respiration de l'éco-  
437 système est contrôlée presque exclusivement par la température du sol. La modélisation  
438 de ce flux se fait donc généralement en utilisant la température que se soit celle de l'air  
439 ([Bortoluzzi et al., 2006](#)) ou celle du sol à différentes profondeurs ([Görres et al., 2014](#);  
440 [Zhu et al., 2015](#)).

441 Le niveau de nappe, conditionnant l'accès à l'oxygène, joue également un rôle im-  
442 portant. Un niveau qui diminue se traduit généralement pas une hausse de la RE que  
443 ce soit à long terme ([Strack et al., 2006; Ballantyne et al., 2014](#)) ou à plus court terme  
444 (**Réf needed**).

**445 Facteurs contrôlant l'ENE**

446 On défini l'Échange Net de l'Écosystème (ENE) comme la différence entre la Photo-  
447 tosynthèse Primaire Brute (PPB) et la Respiration de l'écosystème (RE). Les facteurs  
448 contrôlants l'ENE sont donc les mêmes que ceux qui contrôlent ces 2 flux. Cependant  
449 l'effet d'un même facteur de contrôle peut être différent vis à vis de PPB et de RE  
450 selon le contexte environnemental, que ce soit par rapport à la nature de l'effet ou son  
451 importance. Ainsi une variation de l'ENE peut parfois est contrôlé majoritairement  
452 soit par la PPB soit par la RE soit par les deux. Par exemple, une baisse du niveau de  
453 la nappe est souvent liée dans la littérature à une baisse de l'ENE. Cependant certains  
454 attribuent cette baisse à une augmentation de la Respiration ([?Ise et al., 2008](#)) (au-  
455 rela2013, oechel1993) quand d'autres l'attribuent à une diminution de la photosynthèse  
456 ([Sonnentag et al., 2010; Peichl et al., 2014](#)). Enfin certain voient un effet à la fois de  
457 l'augmentation de la respiration et de la diminution de la photosynthèse ([Strack et](#)  
458 [Zuback, 2013](#)).

459 À noter un article particulièrement intéressant ([Lund et al., 2012](#)) dans lequel,  
460 dans un même site une baisse du niveau de la nappe 2 année différente entraînera une  
461 baisse de l'ENE dans les 2 cas, mais dans l'un des cas cette baisse est contrôlée par  
462 un augmentation de la respiration et dans l'autre cas cette baisse est contrôlée par une  
463 diminution de la photosynthèse.

464 Également un article de [Ballantyne et al. \(2014\)](#) qui lui ne note pas d'effet d'une  
465 baisse du niveau de la nappe sur l'ENE car l'augmentation de la respiration est com-  
466 pensée par une augmentation de la photosynthèse.

**467 Facteurs contrôlant les flux de méthane**

468 Le niveau de la nappe et la température semblent être les facteurs prépondérant du  
469 contrôle des flux de méthane

470 La prépondérance relative des ces différents flux, contrôlée par les conditions envi-  
471 ronnementale, va donc impacter le fonctionnement des tourbières. Soit elles stockent  
472 du carbone, en accumulant des matières organiques, et donc fonctionnent comme des

473 puits ou soit elle relâchent du carbone et fonctionnent comme des sources.

474 L'étude individuelle de tel ou tel flux avec tel ou tel facteur contrôlant est nécessaire  
475 afin de comprendre ce qu'il se passe au niveau des processus. Il est tout aussi nécessaire  
476 d'arriver à intégrer l'ensemble de la complexité naturelle. C'est l'intérêt d'établir des  
477 bilans de carbone.

### 478 1.2.4 Bilans de carbone

479 Le calcul d'un bilan de carbone à l'échelle d'un écosystème permet de détermi-  
480 ner si l'équilibre (où le déséquilibre) des flux tend à stocker du carbone, le système  
481 fonctionnant alors comme un puits, ou à libérer du carbone, le système fonctionnant  
482 alors comme une source. Il existe différentes façons de réaliser le bilan de carbone d'une  
483 tourbière que l'on peut séparer en deux approches principales. La première approche  
484 consiste à utiliser l'archive tourbeuse pour estimer des vitesses d'accumulation de la  
485 tourbe. Cette méthode permet d'étudier la fonction puits sur des temps longs (derniers  
486 millénaires) et de lier d'éventuels changements dans les vitesses d'accumulation à des  
487 facteurs environnementaux. La seconde approche se base d'avantage sur des mesures  
488 actuelles des différents flux afin d'étudier, sur des temps forcément plus courts, l'évolu-  
489 tion de la prépondérance puits/source d'un écosystème. Les deux approches sont donc  
490 complémentaires.

#### 491 passé

492 long-term apparent rate of carbon accumulation (LORCA) datations + dry bulk  
493 density + carbon content (Tableau 1.3)

494 **tableau LORCA ajouter colonne contexte (exple : 7 tourbières ombro-**  
495 **trophes)**

#### 496 présent

497 Dans cette approche on estime les flux actuels de carbone entrant et sortant de  
498 l'écosystème afin de déterminer un bilan. Un certain nombre de flux de carbone sont

Tableau 1.3 – Vitesse apparente d’accumulation du carbon à long terme en gC m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>

min – max	moyenne	référence
20 – 140	?	Mitra2005
?	18.6	Yu2009
	17.2	Gorham2012
	20	Jones2010
	16.2	Borren2004
	18.5	Packalen2014
	19.4	Vitt2000
	19	Turunen2004
5.74 – 129.31	33.66	Xing2015

<sup>499</sup> présent au sein des écosystèmes terrestre (équation (1.1))

$$BCNE = \frac{dC}{dt} = \overbrace{PPB - Re}^{ENE} - F_{COD} - F_{COP} - F_{CH_4} - F_{CID} - F_{COV} - F_{CO} \quad (1.1)$$

<sup>500</sup> — ENE : Échange Net de l’Écosystème

<sup>501</sup> — PPB : Production Primaire Brute

<sup>502</sup> — Re : Respiration de l’Écosystème

<sup>503</sup> — F<sub>COP</sub> : Flux de Carbone Organique Dissous

<sup>504</sup> — F<sub>COP</sub> : Flux de Carbone Organique Particulaire

<sup>505</sup> — F<sub>CH<sub>4</sub></sub> : Flux de Méthane

<sup>506</sup> — F<sub>CID</sub> : Flux de Carbone Inorganique Dissous

<sup>507</sup> — F<sub>COV</sub> : Flux de Composés Organique Volatils

<sup>508</sup> — F<sub>CO</sub> : Flux de Monoxyde de Carbone

<sup>509</sup> Les bilans les plus complets réalisées sur les tourbières comprennent la partie gazeuse, dissoute...

<sup>511</sup> Dans les tourbières, les flux de CO<sub>2</sub> sont généralement les plus importants (**Réf needed**), puis les flux de CH<sub>4</sub> et/ou de COD et enfin les flux de COP.

<sup>513</sup> Pour estimer ces flux différentes techniques existent, notamment l’eddy covariance et les méthodes de chambre pour les flux de gaz.

## 1.2. Flux de gaz à effet de serre et facteurs contrôlants

---

<sup>515</sup> D'autres méthodes, moins souvent utilisées, existent comme l'utilisation du ratio  
<sup>516</sup> C :N (Kirk2015)

## <sup>517</sup> 2 Sites d'études et méthodologies employées


<sup>518</sup>

<sup>519</sup>	<b>2.1 Présentation de la tourbière de La Guette . . . . .</b>	<b>32</b>
<sup>520</sup>		
<sup>521</sup>	<b>2.2 Autres sites du service national d'observation . . . . .</b>	<b>37</b>
<sup>522</sup>		
<sup>523</sup>	<b>2.3 Mesures de flux . . . . .</b>	<b>38</b>
<sup>524</sup>	2.3.1 Présentation des méthodologies possibles . . . . .	38
<sup>525</sup>	2.3.2 Les mesures de CO <sub>2</sub> . . . . .	39
<sup>526</sup>	2.3.3 Les mesures de CH <sub>4</sub> . . . . .	42
<sup>527</sup>	2.3.4 Le calcul des flux . . . . .	43
<sup>528</sup>	<b>2.4 Facteurs contrôlants . . . . .</b>	<b>43</b>
<sup>529</sup>	2.4.1 acquisitions automatisées . . . . .	43

<sup>530</sup>

## 531 2.1 Présentation de la tourbière de La Guette

532 Le site d'étude, la tourbière de La Guette, est l'un des quatre sites du service  
533 national d'observation des tourbières (SNOT) qui vise à étudier la fonction puits de  
534 carbone des tourbières tempérées notamment vis-à-vis des changements globaux.



BDZ: Bernadouze (1400 m), FRN: Frasne (840 m),  
LDM: Landemarais (155 m), LGT: La Guette (145 m)

FIGURE 2.1 – Site d'études SNO

535 La tourbière de La Guette est située à Neuvy-sur-Barangeon, en Sologne, ( $N\ 47^{\circ}19'44''$ ,  
536 E  $2^{\circ}17'04''$ ) dans le département du Cher (Figure 2.1). Le site s'étend sur une surface  
537 d'une vingtaine d'hectare avec une géométrie relativement allongée 2.2. Cette surface  
538 la classe parmi les plus grandes de Sologne. L'épaisseur moyenne de la tourbe est de  
539 80 cm avec des maximums locaux atteignant 180 cm. La tourbière de La Guette est pro-  
540 bablement topogène (**Réf needed**), formée par l'accumulation d'eau de pluie dans une  
541 cuvette imperméabilisée par une couche d'argile issue d'alluvions de la rivière du même  
542 nom (La Guette). Les précipitations annuelles moyennes sur le site sont de 880 mm et




FIGURE 2.2 – Carte de la tourbière de La Guette

543 les températures moyenne annuelle de 11 °C. L'eau du site à une conductivité généra-  
 544 lement inférieure à  $80 \mu\text{S m}^{-2}$  et un pH compris entre 4 et 5. Ces caractéristiques classe  
 545 la tourbière parmi les tourbières minérotrophes pauvres en nutriments (*poor fen*). Les  
 546 datations effectuées sur le site permettent de dire que les premiers dépôts tourbeux  
 547 remontent à environ 5 à 6000 ans.

548 Le site a subi un certain nombre de perturbations au cours de son existence. D'abord  
 549 la construction d'une route, avant 1945, qui coupe l'extrémité sud de la tourbière  
 550 favorisant son drainage. Le site est également brûlé par un incendie en 1976. En 1979  
 551 des pins noirs (*Pinus nigra*) sont plantés au nord du site. Enfin 2008 le récurage du  
 552 fossé de drainage bordant la route semble entraîner une augmentation significative des  
 553 pertes d'eau du système.

554 Ces perturbations, ou au moins une partie d'entre elles, ont probablement favorisé  
 555 l'envahissement du site par une végétation vasculaire, notamment arborée et composée  
 556 de pins (*Pinus sylvestris*) et de bouleaux (*Betula verrucosa* et *pubescens*). [Viel et al.](#)

## 2.1. Présentation de la tourbière de La Guette

---

557 (2015) a pu calculé, grâce à l'étude de photos aérienne, la vitesse de fermeture du site,  
558 entre 1945 et 2010, estimée à  $2020 \text{ m}^2 \text{ an}^{-1}$  avant l'incendie de 1976 et à  $3469 \text{ m}^2 \text{ an}^{-1}$   
559 après. La tourbière est également envahie de façon importante par la molinie bleue  
560 (*Molinia caerulea*) de la famille des *Poaceae* (Figure 2.3c). Leur présence favorisant la  
561 dégradation des matières organiques (Gogo *et al.*, 2011). Sont également présentes sur  
562 le site un certain nombre d'espèces caractéristiques des tourbières comme les sphaignes,  
563 principalement *Sphagnum cuspidatum* et *Sphagnum rubellum*, qui forment des tapis.  
564 Un tapis de sphaignes en cours de formation est visible sur la photo 2.3a. Sur cette  
565 même photo sont également visible des Linaigrettes à feuilles étroites (*Eriophorum*  
566 *angustifolium*), une plante de la famille des *Cyperaceae* caractéristique des marais et  
567 des landes tourbeuses (Rameau *et al.*, 2008). Des bruyères sont également présentes de  
568 façon importante sur le site avec notamment *Erica tetralix*, parfois appelée la Bruyère  
569 des marais, de la famille des *Ericaceae* (Figure 2.3b). De la même famille est présente  
570 sur le site, mais de façon moins omniprésente, la Callune (*Calluna vulgaris*). L'ensemble  
571 de ces espèces tendent à préférer les milieux riches en matières organiques et pauvres  
572 en nutriment (tela-botanica). D'autres espèces sont présentes sur ce site notamment,  
573 *Rhynchospora alba* de la famille des *Cyperaceae*, *Juncus bulbosus*(image annexe ?),  
574 de la famille de *Juncaceae*, et des Droséras, une plante insectivore, de la famille des  
575 *Droseraceae* (Annexe A, Figure 6a) .

576 Au cours des dernières années, les précipitations sont relativement différentes avec  
577 deux années plus sèche que la moyenne avant 2013 et deux années plus humide en 2013  
578 et 2014 (Figure 2.4). On observe également cette dualité au niveau du niveau de la  
579 nappe. Avant 2013 les étés sont marqués par des étiages important avec des baisses du  
580 niveau de nappe allant jusqu'à -60 cm en 2012 (Figure 2.5). Après 2013, les étiages  
581 sont beaucoup moins importants sur le site (Figure 2.6). Les variations inter-annuelles  
582 de la température moyenne de l'air semblent moins marquées. L'année 2011 est très  
583 proche de 2014 avec une température moyenne supérieure à 11 °C. De la même façon  
584 les années 2012 et 2013 sont très proche avec des température moyenne inférieure à  
585 10 °C.



(a) *Sphagnum – Eriophorum austifolium*



(b) *Erica tetralix – Molinia caerulea*



(c) *Molinia caerulea*

FIGURE 2.3 – Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure.

## 2.1. Présentation de la tourbière de La Guette

---




FIGURE 2.4 – Évolution du niveau de la pluviométrie, en mm, des années 2011 à 2014




FIGURE 2.5 – Évolution du niveau de la nappe, en cm par rapport à la surface, des années 2011 à 2014




FIGURE 2.6 – Évolution de la température de l'air (en °C) des années 2011 à 2014

## <sup>586</sup> 2.2 Autres sites du service national d'obser- <sup>587</sup> vation

<sup>588</sup> Bien que moins étudiés, les autres sites du SNOT, Bernadouze, Frasne et Landemara-  
<sup>589</sup> rais ont également fait l'objet d'un suivi ponctuel en 2013. La tourbière de Bernadouze  
<sup>590</sup> est situé à 1400 m dans les Pyrénées, en Ariège (N 42°48'09'', E 1°25'24''). Elle est  
<sup>591</sup> relativement petite avec 3,75 ha seulement. La tourbière de Frasne est situé à 840 m  
<sup>592</sup> dans le Doubs et s'étend sur une surface de 98 ha. Enfin la tourbière de Landemarais  
<sup>593</sup> est située en Ille-et-villaine, à 154 m et s'étend sur 23 ha. les températures annuelles  
<sup>594</sup> moyennes sur ces trois sites sont respectivement de 6, 7,5 et 11 °C. les précipitations  
<sup>595</sup> annuelles étant de 1700, 1400, 870 mm.

<sup>596</sup> Au sein de ses sites de nombreuses mesures ont été effectuées et notamment des  
<sup>597</sup> mesures de flux de GES notamment le CO<sub>2</sub> et le CH<sub>4</sub>. La méthodologie utilisée pour  
<sup>598</sup> les mesurer étant transverse aux différentes expérimentations elle sera détaillée dans  
<sup>599</sup> ce chapitre.

## 600 2.3 Mesures de flux

### 601 2.3.1 Présentation des méthodologies possibles

602 De nombreuses techniques permettent de mesurer des flux de gaz, avec en premier  
603 lieu les méthodes de chambres.

604 Les chambres peuvent être ouvertes, c'est à dire que la mesure se fait lorsque le  
605 gaz à l'intérieur de la chambre à l'équilibre avec celui à l'extérieur, ou fermées, dans  
606 ce cas le gaz à l'intérieur de la chambre n'est pas à l'équilibre avec celui à l'extérieur.  
607 Elles peuvent également être dynamique, lorsqu'un système de pompe, permettant  
608 notamment de transporter le gaz jusqu'à l'analyseur, est présent. Ou statique si le  
609 système est sans flux artificiel.

610 Trois grandes techniques de chambre existent. D'abord les chambres **dynamiques**  
611 **ouvertes** qui se basent sur un état d'équilibre et mesurent une différence de concen-  
612 tration d'un gaz dont une partie passe par la chambre et l'autre non. Cette méthode  
613 nécessite un système de pompe et donc le passage d'un flux. Ensuite les chambres **dy-  
614 namiques fermées** qui mesurent l'évolution de la concentration du gaz au sein de la  
615 chambre à l'aide d'un système de pompe permettant l'envoi du gaz dans un analyseur  
616 externe. Enfin les chambres **statiques fermées** qui mesurent également l'évolution de  
617 la concentration du gaz au sein de la chambre sans qu'un système de pompe ne soit  
618 présent. Dans ce cas soit l'analyseur est présent dans la chambre, soit des prélèvements  
619 sont fait à intervalles réguliers puis analysés par la suite en chromatographie gazeuse.

620 Il faut noter que les dénominations anglaises de ces méthodes doit faire l'objet d'une  
621 attention particulière. *Closed chamber* par exemple est parfois utilisé pour se référer  
622 à l'état ou non d'équilibre, comme défini dans ce document, mais parfois également  
623 pour désigner les méthodes de chambre sans système de flux ce qui peut prêter à  
624 confusion [Pumpenan et al. \(2004\)](#). Souvent utilisées les dénominations *open/closed* et  
625 *dynamic/static* sont décrites dans [Luo et Zhou \(2006b\)](#), une autre convention peut être  
626 rencontrée : *flow-through/non-flow-through* et *steady state/non-steady state* [Livingston](#)

627 et Hutchinson (1995)

628 Ces différentes méthodes ont divers avantages et inconvénients.

629 Ces méthodes sont souvent utilisées car elles ont un coût modeste, et sont très ver-  
630 satiles ce qui permet leur utilisation dans de nombreuses situations. D'autres méthodes  
631 plus globales existent comme les méthodes d'Eddy Covariance.

632 Les méthodes d'Eddy Covariance se base sur...

633 Comparaison entre les méthodes de chambre et les méthodes d'Eddy Covariance.

### 634 2.3.2 Les mesures de CO<sub>2</sub>

635 Toutes les mesures de CO<sub>2</sub> présentées par la suite ont été faite avec les mêmes ma-  
636 tériels et le même protocole. Les chambres utilisées sont en plexiglass et ont été conçue  
637 (LPC2E) et fabriquées (ISTO) au CNRS. Ce sont des chambres transparentes, cylin-  
638 drique, de 30 cm de diamètre et 30 cm de hauteur. Les mesures de CO<sub>2</sub> à proprement  
639 parler ont été faite à l'aide d'une sonde Vaisala CARBOCAP® GMP 343. La sonde est  
640 directement insérée dans la chambre ainsi qu'une sonde Vaisala HUMICAP® HMP 75  
641 mesurant d'humidité et la température dans la chambre.

642 Avant toute mesure, des embases sont installées sur le site. Ce sont des cylindres  
643 de PVC d'une hauteur de 15 cm pour 30 cm de diamètres, insérés dans le sol sur 8  
644 à 10 cm. La partie basale et enterrée de ces cylindres (sur 7 cm) a été préalablement  
645 percée d'une quarantaine de trous (1 cm de diamètre) afin de minimiser les impacts de  
646 l'embase sur le développement racinaire et permettre les écoulements d'eau.

647 Pour les raisons détaillée précédemment, la méthode mise en œuvre est celle de  
648 la chambre statique fermée, aucun système de pompe n'est donc utilisé. la chambre  
649 est posée sur l'embase, elle contient l'analyseur de CO<sub>2</sub> qui mesure la variation de  
650 la concentration en gaz au cours du temps. Un ventilateur de faible puissance est  
651 également présent à l'intérieur de la chambre afin d'homogénéiser l'air. 1 à 3 min de  
652 stabilisation sont nécessaires après la pose de la chambre afin d'éviter les effets pouvant  
653 y être liés. Ensuite l'enregistrement est lancé, avec l'acquisition toutes les 5 s pendant  
654 5 min de la concentration en CO<sub>2</sub>, de la température et de l'humidité. La mesure se

## 2.3. Mesures de flux




FIGURE 2.7 – Mesures de CO<sub>2</sub>

déroule donc sur une période de temps relativement courte afin de minimiser le déséquilibre avec le milieu extérieur. Dans ce but les mesures ont parfois été manuellement raccourcies, 2 à 3 min d'acquisition, si une pente claire se dégageait rapidement. Ceci notamment lorsque les conditions météorologiques, chaudes et ensoleillées, laissaient supposer une différence rapidement importante vis-à-vis des conditions extérieures. Généralement, deux acquisitions de CO<sub>2</sub> sont faites à la suite sur une même embase. La première, avec la chambre transparente nue, permettant l'enregistrement de l'ENE (Figure 2.7-a). La seconde avec la chambre recouverte d'une chaussette de tissu occultant, isolant la chambre de la lumière, permettant d'interrompre la photosynthèse et donc d'enregistrer les respirations (RE) (Figure 2.7-b).

De nombreux écueils peuvent rendre une mesure inexploitable. D'abord le placement de la chambre, cela peut sembler trivial mais positionner la chambre au milieu d'her-



FIGURE 2.8 – SPIRIT

667 bacées et de bruyères n'est pas toujours évident. Plus anecdotiquement des sphaignes  
668 gelées, recouvrant les bords de l'embase rendent la pose de la chambre difficile voire  
669 impossible. Enfin selon l'heure de la journée des gradients de concentrations peuvent  
670 être présent et augmenter localement les concentrations de CO<sub>2</sub> de façon importante  
671 allant jusqu'à saturer la sonde.

672 Au vu du volume de données acquises et souhaitant garder l'intérêt de mesures  
673 manuelles, à savoir le contrôle humain des flux et des conditions de mesure, il a été  
674 nécessaire de développer un outil de traitement facilitant le contrôle et le calcul des flux.  
675 Ceci afin d'éviter de recourir à des seuils arbitraires (typiquement une valeur de R<sup>2</sup>)  
676 pour le contrôle qualité des données, mais également de permettre une reproductibilité  
677 et un traçage des modifications effectuées sur les données brutes. (donner des exemples)  
678 Ce travail est présenté dans l'annexe D.

<sup>679</sup> **2.3.3 Les mesures de CH<sub>4</sub>**

<sup>680</sup> Les mesures de CH<sub>4</sub> ont été réalisée avec une chambre aux caractéristiques similaires  
<sup>681</sup> à celles utilisées pour les mesures de CO<sub>2</sub> à l'exception de l'interface avec l'analyseur.  
<sup>682</sup> La méthode de la chambre dynamique fermée a été utilisée pour réaliser ces mesures,  
<sup>683</sup> elle diffère donc légèrement de celle utilisée pour le CO<sub>2</sub> puisqu'elle nécessite la mise en  
<sup>684</sup> oeuvre d'un système de pompe pour transporter le gaz jusqu'à l'analyseur. Les mesures  
<sup>685</sup> de concentration en CH<sub>4</sub> ont été réalisée à l'aide du SPIRIT (Figure 2.8).

<sup>686</sup> C'est un SPectrometre Infra Rouge In-situ Troposphérique développé par le LPC2E.  
<sup>687</sup> La spectrométrie infra-rouge se base sur la mesure de l'absorption d'un rayonnement  
<sup>688</sup> infrarouge par des molécules conduisant Cet instrument profite de l'expertise acquise  
<sup>689</sup> par le laboratoire dans le domaine de la métrologie infra-rouge, notamment avec le  
<sup>690</sup> développement de son ancêtre le SPIRALE (SPectroscopie Infra Rouge par Absorption  
<sup>691</sup> de Lasers Embarqués). Plus petit et plus léger (100 kg), le SPIRIT a été développé  
<sup>692</sup> en différentes versions, fonction des usages. Il existe actuellement une version sol et  
<sup>693</sup> une version avion de l'appareil. Les capacités du SPIRIT sont principalement liées  
<sup>694</sup> à deux éléments. Premièrement l'invention d'une cellule à réflexion multiple par le  
<sup>695</sup> LPC2E ([Robert, 2007](#)), permettant d'adapter facilement la longueur du parcours op-  
tique en fonction de la concentration des gaz à mesurer. Deuxièmement l'utilisation de  
<sup>697</sup> lasers à cascades quantique (QCL), dont la puissance permet d'augmenter le nombre  
<sup>698</sup> de réflexion et la sensibilité des mesures d'absorption. Les QCL installés émettent sé-  
<sup>699</sup> quentiellement dans le moyen infra-rouge (2,5 à 25 µm) (Choix dicté par l'absorbance  
<sup>700</sup> à ces longueurs d'onde d'un grand nombre d'espèce d'intérêt et l'intensité importante  
<sup>701</sup> des raies d'absorption.) et dans une fenêtre spécifique aux espèces que l'on souhaite  
<sup>702</sup> mesurer. Après son émission, le laser est divisé en deux. La première partie traverse  
<sup>703</sup> une cellule de référence, contenant un gaz de concentration connue. La seconde partie  
<sup>704</sup> traverse une cellule de mesure, contenant le gaz à mesurer. Les deux parties du laser  
<sup>705</sup> débouchent finalement sur les détecteurs. Le fonctionnement détaillé du SPIRIT-sol  
<sup>706</sup> est décrit dans [Guimbaud \*et al.\* \(2011\)](#).

707 **2.3.4 Le calcul des flux**

708 Que ce soit pour le CO<sub>2</sub> ou le CH<sub>4</sub>, le flux de gaz est calculé à l'aide de l'équation  
709 suivante :

$$F = \frac{dX}{dt} \times \frac{P}{R \times T} \times \frac{V}{S} \quad (2.1)$$

710 Avec :

711 F : le flux en  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$

712 X : la concentration en gaz mesuré en  $\mu\text{mol mol}^{-1}$

713 P : la pression atmosphérique en  $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$

714 R : la constante des gaz parfait en  $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$

715 T : la température dans la chambre en K

716 V : le volume de la chambre en m<sup>3</sup>

717 S : la surface occupée par l'embase en m<sup>2</sup>

718 **2.4 Facteurs contrôlants**

719 Afin de déterminer l'impact de facteurs contrôlants sur ces flux, mesurer les flux  
720 ne suffit pas il faut également mesurer les variables environnementales dont on pense  
721 qu'elles seront des facteurs contrôlants important. La description des techniques et  
722 matériels communs aux différentes expérimentations utilisées est développée ci-dessous.  
723 Par contre leur mise en œuvre ou caractéristiques spécifiques, comme la fréquence des  
724 mesures, sera décrite individuellement au niveau des parties détaillant chacune des  
725 expérimentations.

726 **2.4.1 acquisitions automatisées**

727 Les paramètres météorologiques ont été mesurés, en un point, au centre de la tour-  
728 bière (Figure 2.2)(carte ?) à l'aide d'une station d'acquisition Campbell installée sur le

## 2.4. Facteurs contrôlants

---

site en 2008. Les variables ont été acquises à une fréquence horaire jusqu'au 20 février 2014 puis toutes les demi-heures par la suite. Les paramètres enregistrés sont la pression atmosphérique, l'humidité relative de l'air, la pluviométrie, l'irradiation solaire, la vitesse et la direction du vent. (**détail du matos ?**). Cette même station a également permis l'acquisition de la température de l'air et de la tourbe à -5, -10, -20 et -40 cm. Installées à la même époque, quatre sondes **OTT ?** de mesure du niveau de la nappe d'eau permettent le suivi du niveau de la nappe dans la tourbière.

### **3 Bilan de C de la tourbière de La Guette**

736	3.1 Introduction . . . . .	46
738	3.2 Procédure expérimentale et analytique . . . . .	47
740	3.2.1 Méthodes de mesures . . . . .	47
741	3.2.2 Modélisation du bilan de C . . . . .	49
743	3.3 Résultats . . . . .	54
744	3.3.1 Cinétique des facteurs contrôlant et des flux sur la tourbière	
745	de La Guette . . . . .	54
746	3.3.2 Sélection des modèles . . . . .	59
747	3.3.3 Le bilan de carbone de la tourbière de La Guette à l'échelle	
748	de l'écosystème . . . . .	67
749	3.3.4 Variabilité spatiale du bilan . . . . .	74
750	3.4 Discussion . . . . .	76
751	3.4.1 Estimations des flux . . . . .	76
752	3.4.2 Estimations des bilans . . . . .	79
753	3.4.3 Sensibilité et limitations du bilan . . . . .	79
754	3.4.4 Représentativité locale du modèle . . . . .	80
755	3.4.5 Variation du bilan avec la végétation . . . . .	80
756	3.4.6 perspectives . . . . .	81
758		

<sub>759</sub> 3.1 Introduction

<sub>760</sub> La majorité des écosystèmes tourbeux pour lesquels un bilan de carbone a été es-  
<sub>761</sub> timé, se situe sous les hautes latitudes de l'hémisphère nord comme par exemple en  
<sub>762</sub> Suède ([Waddington et Roulet, 2000; Peichl \*et al.\*, 2014](#)), en Finlande ([Alm \*et al.\*, 1997](#)),  
<sub>763</sub> au Canada ([Trudeau \*et al.\*, 2014](#)). Les tourbières situées plus au sud ont fait l'objet de  
<sub>764</sub> rare estimation de bilan (e.g. tourbière du Jura français par [Bortoluzzi \*et al.\* \(2006\)](#)).  
<sub>765</sub> L'étude de ces écosystèmes présent à la limite sud de leur extension est importante car  
<sub>766</sub> ils expérimentent des conditions plus extrêmes que les autres qui sans être identiques,  
<sub>767</sub> peuvent se rapprocher de celles que subiront d'autres écosystèmes tourbeux suite au  
<sub>768</sub> réchauffement climatique. Par ailleurs, concernant la tourbière de La Guette, ce site  
<sub>769</sub> est représentatif d'une grande partie des tourbières dans les perturbations qu'elle su-  
<sub>770</sub> bie : son drainage et son envahissement par une végétation vasculaire (cf Chapitre 2)  
<sub>771</sub> Le premier objectif de ce chapitre est donc d'établir le bilan de C de la tourbière de  
<sub>772</sub> La Guette. Le second objectif est de caractériser la variabilité spatiale de ces flux de  
<sub>773</sub> GES à travers ce bilan de C. En effet les tourbières sont des écosystèmes avec des  
<sub>774</sub> conditions environnementales qui peuvent varier dans l'espace. Par exemple le niveau  
<sub>775</sub> de la nappe, à cause de variation micro-topographique peut être plus ou moins élevé,  
<sub>776</sub> faire des flaques d'eau libre ou au contraire être quelques dizaines de centimètres sous  
<sub>777</sub> la surface du sol. Conséquence de ces variations, ces micro-environnements abritent  
<sub>778</sub> des communautés végétales et microbiennes différentes. Finalement ces conditions en-  
<sub>779</sub>vironnementales contrôlant les flux, ceux-ci varient également. Estimer ces variations  
<sub>780</sub> est donc nécessaire afin de préciser dans quelle mesure elles influent sur le bilan de C.




FIGURE 3.1 – Répartition des 20 placettes de mesures suivant un échantillonnage aléatoire stratifié.

## 781 3.2 Procédure expérimentale et analytique

### 782 3.2.1 Méthodes de mesures

#### 783 Mesures de flux de gaz

784 Les mesures des flux de CO<sub>2</sub> et de CH<sub>4</sub> ont été effectuées en utilisant la méthode  
 785 décrite dans la partie 2.3. En juin 2011, 20 placettes ont été installées <sup>1</sup> selon un échan-  
 786 tillonnage aléatoire stratifié : La surface de la tourbière a été divisée selon une grille de  
 787 20 mailles et un point choisi aléatoirement dans chaque maille localise chaque placette.  
 788 La taille de la maille a été ajustée de manière à avoir vingt 20 carrés sur la surface de  
 789 la tourbière. Cette méthode permet de conserver un échantillonnage aléatoire tout en

1. je remercie ici Sébastien Gogo pour avoir installé ces placettes sur le terrain avant même mon arrivée.

### 3.2. Procédure expérimentale et analytique

790 étant assuré d'avoir une représentativité homogène du site. Les placettes, délimitées  
791 par des piquets, occupaient une surface de 4 m<sup>2</sup> (2×2 m), à l'intérieur de laquelle ont  
792 été installé de façon permanente un piézomètre et une embase permettant la mesure  
793 des flux de gaz (Les embases sont décrites dans le chapitre 2, partie 2.3.2). Usuelle-  
794 ment les placettes sont séparées en groupes micro-topographiques (Figure 1.1), avec des  
795 embases positionnées sur les buttes (*hummock*), les trous (*hollows*) et les zones d'eau  
796 libre (*pool*) (Alm *et al.*, 1997; Waddington et Roulet, 2000). Ou encore selon différent  
797 traitements, réhabilité/non réhabilité, exploité/non exploité, manipulé/non manipulé  
798 (Bortoluzzi *et al.*, 2006; Strack et Zuback, 2013). Ceci a l'avantage de permettre une  
799 distinction fine des capacités sources/puits mais a l'inconvénient du placement proche  
800 des embases les unes des autres limitant la représentativité spatiale des mesures. Elles  
801 peuvent également être séparées en zone dans la tourbière, haut-marais *versus* bas-  
802 marais, ou réhabilité *versus* non-réhabilité. Afin de gagner en représentativité spatiale,  
803 la taille du site le permettant, il a été décidé de positionner des placettes sur l'ensemble  
804 du site. De plus, du fait de l'omniprésence de végétation vasculaire, et de la taille des  
805 chambres par rapport à la micro-topographie une telle approche était difficile à mettre  
806 en oeuvre.

807 Les flux de CO<sub>2</sub> et de CH<sub>4</sub> sont mesurés. Des tests effectués sur la tourbière ayant  
808 montré des émissions nulles de N<sub>2</sub>O, ce gaz n'a pas été étudié. Les mesures de CO<sub>2</sub>  
809 ont été effectuées de mars 2013 à février 2015, avec une fréquence quasiment mensuelle  
810 (20 campagnes, pour 24 mois de mesures). Les mesures de CH<sub>4</sub> ont été effectuées avec  
811 une fréquence et sur un nombre d'embases inférieur (12 campagnes, 5 embases). Ceci  
812 a été déterminé par la difficulté de déploiement *in-situ* de l'instrument SPIRIT (lourd,  
813 difficilement transportable dans un milieu tourbeux).

814 Les facteurs contrôlant mesurés manuellement sont la pression atmosphérique, le  
815 rayonnement photosynthétique actif (*photosynthetically active radiation*, PAR), les tem-  
816 pératures du sol à différentes profondeurs, la végétation (pourcentage de recouvrement),  
817 le niveau de la nappe d'eau. Des prélèvements d'eau ont été effectués chaque mois pour  
818 mesurer le pH et la conductivité (mesures effectuées sur le terrain après les mesures de

819 flux). Les échantillons ont été congelés pour la mesure ultérieure de la concentration  
820 en carbone organique dissout. Ces mesures nécessitant d'accéder aux placettes régu-  
821 lièrement, des planches de bois ont été utilisées comme pontons mobiles pour limiter  
822 les perturbations. La dispersion des placettes sur l'ensemble du site a rendu impossible  
823 une installation plus permanente.

824 Les mesures automatiquement acquise via une station météo Campbell sont la tem-  
825 pérature de l'air, température de la tourbe à  $-5$ ,  $-10$ ,  $-20$  et  $-40$  cm de profondeur,  
826 vitesse et direction du vent, humidité relative de l'air, rayonnement solaire, pression  
827 atmosphérique.

### 828 3.2.2 Modélisation du bilan de C

#### 829 Estimation du bilan et variabilité temporelle

830 Pour estimer le bilan de carbone du site il est nécessaire d'établir des modèles  
831 reliant des flux mesurés ponctuellement avec des variables explicatives mesurées à haute  
832 fréquence (e.g. relation entre la respiration de l'écosystème et la température de l'air).  
833 Ces relations empiriques permettront d'interpoler les données acquises mensuellement  
834 sur l'ensemble des deux années de mesure et de reconstituer ainsi une chronique de flux  
835 dont l'intégration dans le temps permettra d'estimer une quantité sur l'année. Pour  
836 établir ces modèles empiriques les données acquises ont été moyennées par campagne  
837 de mesure. Ceci permettant, dans un premier temps, de s'affranchir de la variabilité  
838 spatiale des flux pour se concentrer sur la variabilité temporelle. Les relations entre  
839 flux et facteurs contrôlant ont ensuite été étudiées deux à deux.

840 La RE, et l'ENE sont mesurés directement sur le terrain. Cependant afin d'établir  
841 le bilan de C tout en gardant une discrimination entre flux d'entrée et de sortie la RE et  
842 la PPB (obtenue grâce à l'équation  $PPB = ENE - RE$ ) ont été modélisé séparément.  
843 Les flux en phase gazeuse ont été modélisés en partant d'équations usuellement utilisées  
844 et dans lesquelles la température est le facteur contrôlant majeur. Puis les résidus<sup>2</sup> de  
845 ces modèles de base ont ensuite été étudiés en fonction des facteurs de contrôle restant.

---

2. Valeurs moyennes - Valeurs moyennes estimées

### 3.2. Procédure expérimentale et analytique

846 Dans le cas où une tendance est visible, le facteur est intégré.

847 Les modèles ont été comparés avec différents indicateurs : Le coefficient de dé-  
848 termination ( $R^2$ ), l'erreur standard normalisée (*Normalised Root Mean Square Error*,  
849 NRMSE) et le critère d'information d'Akaike (*Akaike Information Criterion*, AIC). Le  
850  $R^2$  est utilisé comme indicateur de la proportion de la variabilité des données expliquée  
851 par le modèle, sa valeur est comprise entre 0 et 1. La RMSE et sa normalisation par la  
852 moyenne NRMSE sont utilisés comme indicateur de l'écart entre les données mesurées  
853 et les données modélisées. L'AIC permet de déterminer la pertinence de l'ajout d'un  
854 paramètre sur la représentation des données par le modèle.

855 La température a été choisie comme base de départ à la construction des modèles  
856 de RE et PPBsat, à la fois car c'est le facteur de contrôle le plus souvent invoqué et à  
857 la fois car les corrélations avec les flux étaient les plus forte. Concernant la respiration  
858 de l'écosystème, les températures utilisées dans la littérature sont variables. La tem-  
859 pérature la plus utilisée est la température du sol à -5 cm ([Ballantyne et al., 2014](#)).  
860 La température de l'air et la température du sol à -10 cm sont aussi régulièrement  
861 utilisées ([Bortoluzzi et al., 2006](#); [Kim et Verma, 1992](#)). Cette profondeur, -5 cm, est  
862 régulièrement utilisée car c'est dans la tourbe, proche de la surface que la respiration  
863 du sol est la plus importante. **production CO2 ? profils ?** C'est également à des  
864 profondeurs relativement faibles que se situent la majorité des racines (**Réf needed**).  
865 La respiration liée aux racines (autotrophe et hétérotrophe stimulée par les exsudats  
866 racinaires) peut contribuer à la respiration du sol (**de l'écosystème ?**) pour 35 à 60 %  
867 ([Silvola et al., 1996](#); [Crow et Wieder, 2005](#)). La RE est estimée directement à partir  
868 des données acquises moyennées en partant de la température connue pour contrô-  
869 ler une grande partie de ce flux. Les modèles les plus fréquemment utilisés (linéaire,  
870 exponentiel, arrhénius) ont été testés.

871 Pas de consensus émerge de la littérature quant aux facteurs contrôlant les émissions  
872 de CH<sub>4</sub>. La température, ([?Bubier et al., 1995](#)), le niveau de la nappe ([Bubier et al.,](#)  
873 [1993](#)) et/ou la végétation ([Bortoluzzi et al., 2006](#)) peuvent être utilisés isolément ou  
874 conjointement.

875       Après la phase de calibration, les facteurs de contrôle utilisés dans les modèles  
876       ont été évalués à l'aide de données indépendantes issues d'une autre expérimentation  
877       réalisée sur le même site en 2014. Les méthodes de mesures des flux sont strictement  
878       identiques à celles utilisées pour établir le bilan de carbone. En revanche le position-  
879       nement des placettes est beaucoup plus classique : proches les unes des autres, et avec  
880       différents traitements. Afin de pouvoir les comparer, seule les placettes de contrôles,  
881       (n'ayant donc subie aucune manipulation) de cette expérimentation seront utilisées soit  
882       4 placettes dans une station en amont et 4 en aval de la tourbière de La Guette (plus  
883       de détails dans l'annexe C). Le terme d'évaluation est préféré à celui de validation car  
884       le nouveau jeu de données utilisé bien qu'indépendant de celui utilisé pour la calibra-  
885       tion n'a pas été acquis de manière strictement identique, notamment au niveau de la  
886       répartition des embases sur le site.

887       Enfin les facteurs contrôlants ont été interpolés au pas de mesure de la station  
888       météo présente sur le site, c'est-à-dire à l'heure. Pour des données dont l'acquisition  
889       est manuelle uniquement, comme la végétation, une interpolation linéaire est faite  
890       entre les points de mesures. Pour les données acquises à la fois automatiquement par  
891       la station météorologique et manuellement, comme la température de l'air ou de la  
892       tourbe, l'interpolation est faite à partir de la relation entre les mesures continues et  
893       ponctuelles. Les flux sont ensuite recalculés (en  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{h}^{-1}$ ) à l'échelle horaire sur  
894       les deux années de mesure puis sommés afin d'estimer les bilans de carbone. Ces bilans  
895       sont par la suite exprimés en  $\text{gC m}^{-2}$  par période de temps (souvent l'année).

## 896       **Étude de la variabilité spatiale**

897       Deux approches ont été testées afin de caractériser la variabilité spatiale des flux et  
898       du bilan. La première consiste à calibrer par placette les modèles sélectionnés lors de la  
899       modélisation à l'échelle de l'écosystème. Cette opération permet ainsi calculer des flux  
900       par placette et éventuellement un bilan. L'inconvénient de cette méthode étant le faible  
901       nombre de points permettant la calibration des modèles conduisant éventuellement à  
902       une forte erreur sur l'estimation des paramètres voire à la non convergence des modèles.




FIGURE 3.2 – Cas idéaux de distribution des résidus (source ?)




FIGURE 3.3 – Partitionnement des placettes en fonction de leur similarité en termes de composition végétale (pourcentage des strates muscinales, herbacées et arbustives)

903 La seconde approche permet de palier en partie à ce souci en faisant des groupes de  
 904 placette. Ces ensembles de placette ont été fait en regroupant les placettes ayant la  
 905 composition végétale la plus proche. Ce choix se justifie par le fait que la végétation  
 906 joue un rôle important tout en étant délicate à prendre en compte. La température,  
 907 plus facile à mesurer et le niveau de la nappe, qui n'a que peu varié, semblait des choix  
 908 moins pertinent. Le partitionnement a été fait via une classification hiérarchique et  
 909 quatre groupes ont été déterminés (Figure 3.3).

### 3.3. Résultats




FIGURE 3.4 – Évolution du niveau de la nappe moyen des 20 embases mesuré pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)

## 910 3.3 Résultats

### 911 3.3.1 Cinétique des facteurs contrôlant et des flux sur la tour- 912 bière de La Guette

#### 913 Les Facteurs contrôlant

914 L'évolution du niveau de la nappe des 20 placettes est marquée par un étiage d'une  
915 vingtaine de centimètres en moyenne en 2013 et l'absence d'un étiage net en 2014  
916 (Figure 3.4). Le niveau de la nappe moyen ne descend pas sous la barre des  $-10\text{ cm}$   
917 avec  $-9,2 \pm 7,6$  et  $-7,1 \pm 4,8\text{ cm}$  respectivement pour 2013 et 2014. Ces observations  
918 sont cohérentes avec les mesures haute fréquence (Figure 2.5), et confirment l'étiage  
919 particulièrement haut de ces 2 années vis-à-vis des précédentes.

920 La température de l'air mesurée manuellement montre une variabilité saisonnière  
921 cohérente avec celle mesurées par la station météo. La variabilité saisonnière de la  
922 température est également visible dans le sol avec cependant un amortissement et une  
923 diminution de la variabilité avec la profondeur (figure 3.5)

924 La conductivité moyenne mesurée sur le site varie entre  $35$  and  $55\text{ }\mu\text{S m}^{-2}\text{ s}^{-1}$  (fi-  
925 gure 3.6).




FIGURE 3.5 – Évolution des températures de l'air (Tair) et du sol à  $-5$ ,  $-30$ ,  $-50$  et  $-100$  cm (T5, T30, T50 et T100 respectivement) moyenne mesurée lors des campagnes de terrain de mars 2013 à février 2015




FIGURE 3.6 – Évolution de la conductivité pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)

### 3.3. Résultats




FIGURE 3.7 – Évolution du pH pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)




FIGURE 3.8 – Évolution de la concentration en carbone organique dissous dans l'eau du sol pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)

926 En moyenne le pH mesuré sur la tourbière de La Guette est compris entre 4 et 5

927 (figure 3.7). Ces valeurs sont cohérentes avec la classification en *poor-fen* du site .

928 La concentration en carbone organique dissous présente dans l'eau de la tourbière

929 est compris en moyenne entre 10 et 30 mg L<sup>-1</sup> (figure 3.8).

#### 930 Les flux de carbone

931 L'ensemble des mesures de CO<sub>2</sub> s'étendent de mars 2013 à février 2015. Cependant

932 de novembre 2013 à février 2014 les mesures ont été interrompues suite à des problèmes

933 techniques. Les deux saisons de végétation, ont pu être mesurées dans leur ensemble,




FIGURE 3.9 – Évolution du niveau de PPB, RE et ENE pendant la période de mesure. Moyenne des 20 embases de mars 2013 à février 2015.

### 3.3. Résultats

---

934 permettant d'avoir un jeu de données représentatif sur le fonctionnement de l'écosys-  
935 tème. À noter également que pour l'ensemble des flux, la déviation standard augmente  
936 avec les valeurs mesurées.

937 En 2013, les valeurs de la PPB (flux de CO<sub>2</sub> entrant dans l'écosystème) augmentent  
938 au printemps et une partie de l'été avec un maximum de  $12,80 \pm 4,91 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$   
939 atteint fin juillet, avant de diminuer à partir d'août (Figure 3.9a). En 2014 la PPB  
940 maximale est atteinte en juin ( $13,16 \pm 4,70 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ), soit environ un mois plus tôt  
941 que l'année précédente. Puis pendant l'été et l'automne les valeurs décroissent jusqu'à  
942 être proche de 0. En moyenne les valeurs de la PPB sont de  $7,12 \pm 5,19 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$   
943 en 2013 et de  $6,56 \pm 4,72 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  en 2014 (Figure 3.9a).

944 La RE (flux de CO<sub>2</sub> sortant de l'écosystème) en 2013 augmente pendant le prin-  
945 temps et une partie de l'été (Figure 3.9b). Elle atteint un maximum de  $9,43 \pm 3,48 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$   
946 en juillet avant de diminuer. En 2014 la RE atteint, comme la PPB, son maximum plus  
947 tôt, en juin à  $7,83 \pm 2,55 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  avant de décroître jusqu'en hiver pour approcher  
948 des valeurs nulles. La moyenne annuelle de RE en 2013 est de  $4,27 \pm 3,16 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ,  
949 ce qui est légèrement supérieure à celle de 2014 :  $3,63 \pm 2,56 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  (Figure 3.9b).

950 Concernant l'ENE (bilan des flux de CO<sub>2</sub> entrant et sortant), elle augmente en 2013  
951 jusque  $5,19 \pm 4,51 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , avec un maximum en juin, avant de diminuer jusqu'à  
952 la fin de l'année. Cependant, cette baisse est moins uniforme que celle des deux flux  
953 précédents, avec notamment une augmentation de l'ENE entre juillet et août 2013.  
954 Ceci étant, il faut également noter les valeurs importantes de la déviation standard  
955 particulièrement en juin et en août. En 2014, l'ENE maximum est atteinte en juillet  
956 avec  $5,79 \pm 2,77 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  avant qu'elle ne décroisse. Cette baisse est cependant plus  
957 homogène qu'en 2013. les moyennes de l'ENE en 2013 et 2014 sont très proches sont  
958 respectivement de  $2,85 \pm 3,05 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  et  $2,93 \pm 2,77 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  (Figure 3.9c).

959 Les flux de CH<sub>4</sub> comme ceux du CO<sub>2</sub> montrent une variabilité saisonnière importante.  
960 Cependant les flux de CH<sub>4</sub> mesurés sont un ordre de grandeur en dessous de ceux  
961 mesurés pour le CO<sub>2</sub> (Figure 3.10). À l'inverse de ce dernier, l'importance des flux de  
962 CH<sub>4</sub> mesurés en 2013 et 2014 est différente. En 2013 les flux sont moins importants




FIGURE 3.10 – Évolution des flux de méthane moyen (N?) pendant la période de mesure (mars 2013 – février 2015)

963 qu'en 2014 avec des maximum de 0,078 et 0,196  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  respectivement.

#### 964 Les relations flux gazeux et facteurs contrôlant

965 Comme précisé précédemment, le niveau de la nappe n'a que peu varié pendant les  
 966 deux années de mesures. De ce fait aucune relation claire ne se distingue entre les flux  
 967 et le niveau de la nappe que ce soit pour le CO<sub>2</sub> (PPB et RE) ou le CH<sub>4</sub> (Figure 3.11).

968 La PPB et la RE présentent cependant des relations avec la température de l'air,  
 969 et l'indice de végétation, même si pour ce dernier les tendances sont moins claires,  
 970 particulièrement pour la RE (Figure 3.11). Le CH<sub>4</sub> quant à lui ne présente pas de  
 971 relation avec la température de l'air, mais une tendance exponentielle est visible vis-à-  
 972 vis de l'indice de végétation (Figure 3.11). (**CH<sub>4</sub> et Température dans la tourbe ?**)

#### 973 3.3.2 Sélection des modèles

##### 974 La Production Primaire Brute

975 L'estimation de la PPB se fait en deux étapes. Dans un premier temps on estime le  
 976 potentiel maximum de photosynthèse à un instant donné dans des conditions de lumière  
 977 saturante (PPBsat). Ce potentiel peut varier avec les conditions environnementales et  
 978 a été déterminé en utilisant l'équation de (June *et al.*, 2004) qui relie la vitesse de

### 3.3. Résultats

---




FIGURE 3.11 – Relations entre les flux de gaz et une sélection de facteurs contrôlant

<sup>979</sup> transport des électrons photosynthétiques à lumière saturante à la température :

$$PPB_{sat} = a * \exp\left(\frac{Tair - b}{c}\right)^2 \quad (3.1)$$

<sup>980</sup> Avec a la vitesse de transport des électrons photosynthétique à lumière saturante, b  
<sup>981</sup> la température optimale pour ce transport et c la différence de température à laquelle  
<sup>982</sup> à laquelle PPB<sub>sat</sub> vaut  $e^{-1}$  de sa valeur à la température optimale. À partir de ce  
<sup>983</sup> potentiel à lumière saturante, la PPB est estimée en prenant en compte la lumino-  
<sup>984</sup> sité. On utilise l'équation 3.2 proposée par (Bubier *et al.*, 1998) et régulièrement et  
<sup>985</sup> majoritairement utilisée (Bortoluzzi *et al.*, 2006; Worrall *et al.*, 2009) :

$$PPB = \frac{PPB_{sat} * a * PAR}{PPB_{sat} + a * PAR} \quad (3.2)$$

<sup>986</sup> L'utilisation de l'équation de June seule, avec la température de l'air comme variable  
<sup>987</sup> explicative de la PPB<sub>sat</sub>, permet d'expliquer 66 % des variations observées avec une




FIGURE 3.12 – PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.1

### 3.3. Résultats

---

988 erreur standard de l'estimation de 32 % (Figure 3.12-a). Les résidus de ce modèle se ré-  
989 partissent de façon relativement homogène et non biaisée (Figure 3.12-b). Corrélés avec  
990 l'indice de végétation IV, ils présentent une tendance linéaire croissante (Figure 3.12-  
991 c). On observe la même tendance avec le recouvrement de la strate herbacée avec une  
992 dispersion des points plus importante (Figure 3.12-d). Par contre aucune tendance par-  
993 ticulière n'est visible vis-à-vis du niveau de la nappe (Figure 3.12-e) Le recouvrement  
994 des sphaignes (non présenté) ne montre également, aucune tendance avec les résidus  
995 de cette équation. La PPB calculée à partir de l'équation 3.1 montre une erreur stan-  
996 dard de 31 %, du même ordre de grandeur que celle de PPBsat (Figure 3.12-f) et les  
997 résidus se répartissent de façon relativement homogène et non biaisée (Figure 3.12-g).  
998 Cependant l'évaluation du modèle sur les données de tests montre une erreur stan-  
999 dard de l'estimation plus forte qui atteint 47 % (Figure 3.12-h). Par ailleurs une forte  
1000 incertitude est présente concernant l'estimation des paramètres qui ont tous une erreur  
1001 standard importante, parfois plus importante que la valeur du paramètre, et une faible  
1002 significativité (Tableau 3.1). Afin de prendre en compte la tendance linéaire entre les  
1003 résidus et l'indice de végétation (IV) le modèle est adapté pour y intégré une fonction  
1004 linéaire de la végétation :

$$PPBsat = (a * IV + d) * \exp\left(\frac{T - b}{c}\right)^2 \quad (3.3)$$

1005 Cette nouvelle équation permet d'expliquer une part plus importante des varia-  
1006 tions de PPBsat ( $R^2 = 0,85$ ) et augmente la proximité entre les données mesurées et  
1007 les données modélisées : l'erreur standard diminue à 21 %. (Figure 3.13-a). Les résidus  
1008 de cette équation semblent répartis de façon moins homogène que précédemment. On  
1009 observe notamment un resserrement des points autour de zéro à l'exception d'un point  
1010 de valeur supérieur à 4. Le biais reste malgré tout léger au regard de l'amélioration ap-  
1011 portée. Aucune tendance claire ne se dégage des résidus lorsqu'ils sont mis en relation  
1012 avec des facteurs contrôlant tel que les recouvrements végétaux (sphaignes, herbacées),  
1013 ou le niveau de la nappe (Figure 3.13-c,d,e). Comme précédemment, l'erreur standard  
1014 de la PPB, de 19 %, est du même ordre de grandeur que celle de PPBsat. Pour PPBsat




FIGURE 3.13 – PPBsat modèles Tair utilisant l'équation 3.3

### 3.3. Résultats

---

1015 comme pour PPB l'erreur standard diminue avec l'ajout de l'indice de végétation lors  
1016 de la calibration. En revanche, l'évaluation sur les données de test de ce dernier modèle  
1017 montre une erreur importante (58 %), supérieure à celle du modèle ne prenant pas en  
1018 compte la végétation. Cette évaluation montre également une tendance importante à  
1019 sous-estimer les valeurs mesurées. Néanmoins ce modèle intégrant la végétation permet  
1020 de diminuer de façon importante l'erreur standard associée à l'estimation des para-  
1021 mètres de l'équation. Dans la suite du texte le modèle permettant d'estimer la PPB à  
1022 partir des équations 3.1 et 3.2 sera nommé PPB-1 et celui utilisant les équations 3.3 et  
1023 3.2 sera nommée PPB-2.

1024 **La Respiration de l'Écosystème**

1025 L'estimation de la RE s'effectue avec l'équation :

$$RE = a * \exp(b * T) \quad (3.4)$$

1026 La température de l'air utilisée dans un modèle exponentiel permet d'expliquer 90 %  
1027 des variations de la respiration de l'écosystème avec une erreur standard de 18 % (Fi-  
1028 gure 3.14-a). Les résidus de cette équation semblent répartis de façon non-biaisée, pas  
1029 de tendance dans le nuage de point (Figure 3.14-b). L'évaluation de ce modèle montre  
1030 une erreur standard de 35 % avec une tendance à sous-estimer les valeurs mesurées.  
1031 Une légère tendance, moins claire que pour la PPBsat, est visible entre les résidus et  
1032 l'indice de végétation ainsi qu'avec le recouvrement de la strate herbacée. Très souvent  
1033 utilisée, la température à -5 cm donne des résultats proche mais moins bons notam-  
1034 ment avec une hétéroscédasticité des résidus (**Fig Annexe ?** nope : M&M). On adapte  
1035 l'équation 3.4 pour intégrer le signal de végétation :

$$RE = (a * IV + c) * \exp(b * T) \quad (3.5)$$

$$RE = (a * H + c) * \exp(b * T) \quad (3.6)$$




FIGURE 3.14 – RE modèles avec Tair

1036 Les calibrations de ces nouvelles équations sont présentées dans la figure 3.14-a,b et  
 1037 3.14-d,e respectivement. Dans les deux cas, l'erreur diminue pour avoisiner 13 %, avec  
 1038 des résidus qui se répartissent de façon non-biaisée. L'évaluation de ces deux équations  
 1039 montre cependant des différences : D'un côté l'équation 3.5 ne permet pas de diminuer  
 1040 l'erreur standard qui vaut 34 %, et est donc très proche des 35 % calculé pour l'évalua-  
 1041 tion du modèle n'intégrant pas la végétation. De l'autre l'évaluation de l'équation 3.6  
 1042 montre une erreur standard plus faible s'établissant à 23 %. Les paramètres des diffé-  
 1043 rentes équations sont présentés dans le tableau 3.1, les modèles RE-1, RE-2, et RE-3  
 1044 correspondent respectivement aux équations 3.4, 3.5 et 3.6. À l'inverse de la PPB les  
 1045 paramètres des modèles de la RE ont, à l'exception du paramètre c du modèle RE-2,  
 1046 une significativité importante et une erreur standard faible.

#### 1047 Le flux de CH<sub>4</sub>

1048 Les relations entre les facteurs contrôlant mesurés et le CH<sub>4</sub> sont moins claires que  
 1049 celles concernant le CO<sub>2</sub>. La corrélation la plus importante est liée à la végétation ( $R^2$

### 3.3. Résultats




FIGURE 3.15 – RE modèles avec Tair




FIGURE 3.16 – CH<sub>4</sub> modèle H

1050 = **XX**,Figure 3.11). le CH<sub>4</sub> est également corrélé avec les températures, faiblement avec  
 1051 les températures de surface, mais de manière plus importante avec les températures du  
 1052 sol à plus forte profondeur ( $R^2 = \text{XX}$ ,Figure 3.11). Enfin il est anti-corrélé ( $R=-0.51$ )  
 1053 avec le niveau de la nappe. Les relations CH<sub>4</sub> et végétation ont donc pu être modélisées  
 1054 avec

$$F_{CH_4} = a * \exp(b * IV) \quad (3.7)$$

1055 Avec les données acquises, l'indice de végétation est le meilleur prédicteur (Fi-  
 1056 gure 3.16), il explique 78 % de la variabilité du CH<sub>4</sub> avec une erreur standard de 32 %.  
 1057 Aucune tendance ne semble se dégager entre les résidus de cette équations et les facteurs  
 1058 contrôlant mesurés. L'évaluation de cette équation montre une tendance à sous-estimer  
 1059 les flux de CH<sub>4</sub> et une erreur standard qui double par rapport à la phase de calibration  
 1060 en atteignant 68 %. Les détails de l'estimation des paramètres de l'équation 3.7 est  
 1061 visible dans le tableau 3.1 sous le nom FCH4.

## 1062 Le COD

### 1063 3.3.3 Le bilan de carbone de la tourbière de La Guette à l'échelle 1064 de l'écosystème

1065 L'interpolation des flux de PPB montrent une variabilité saisonnière proche de  
 1066 celle mesurée sur le terrain (Figure 3.17). Les valeurs mesurées les plus grandes (partie  
 1067 supérieure de la barre rouge sur la figure 3.17) ne semblent pas atteinte par le modèle  
 1068 PPB-2 à l'inverse du modèle PPB-1 (courbes noires sur la figure 3.17). Dans les deux  
 1069 cas les modèles semblent sur-estimer la valeur de PPB mesurées fin 2014.


1070 Pour la RE, l'interpolation suit également les variations saisonnières mesurées men-  
 1071 suellement (Figure 3.18). Les gammes de valeurs mesurées sont très proche des gammes  
 1072 interpolées : les valeurs interpolées fluctuent dans les limites des barres d'erreurs. L'in-  
 1073 terpolation des flux de la RE est très proche quel que soit le modèle utilisé (Figure 3.18).  
 1074 L'intégration de la végétation dans les modèles RE-2 et RE-3 diminue la RE maximum

### 3.3. Résultats

---

Tableau 3.1 – Valeur des paramètres des équations utilisées pour modéliser les flux et sensibilité relative (en %) des flux en réponse à une variation de  $\pm 10\%$  de chacun des paramètres des modèles.

	par	valeur	se	pval	-10 %	+10 %
PPB-1 – équations 3.1 et 3.2						
	a	26.23	62.07	0.68	-9.7	+9.6
	b	53.68	61.27	0.39	+43.7	-35.1
	c	27.21	28.56	0.35	-22.5	+21.9
	i	1.84	21.6	0.93	-0.4	+0.4
PPB-2 – équations 3.3 et 3.2						
	a	39.44	18.89	0.05	-11.8	+11.5
	b	40.27	19.11	0.05	+15.8	-17.2
	c	25.23	14.35	0.1	-8.1	+6.7
	d	-3.73	3.49	0.3	+2.8	-2.8
	i	0.26	0.25	0.31	-1.3	+1.1
RE-1 – équation 3.4						
	a	0.34	0.08	0	-10	+10
	b	0.10	0.01	0	-22.6	+29.9
RE-2 – équation 3.5						
	a	0.92	0.34	0.02	-7.3	+7.3
	b	0.09	0.01	0.00	-19.5	24.7
	c	0.14	0.09	0.14	+2.7	-2.7
RE-3 – équation 3.6						
	a	0	0	0.01	-3.9	+3.9
	b	0.08	0.01	0	-18.8	+23.6
	c	0.33	0.06	0	-6.1	+6.1
FCH4 – équation 3.7						
	a	0	0	0.48	-10	+10
	b	13.01	2.82	0	-43.9	+79.2

FIGURE 3.17 – Flux de CO<sub>2</sub> interpolé à partir de PPB-1 et PPB-2

modélisée en 2013 par rapport au modèle RE-1.

Les flux de CH<sub>4</sub> interpolés (Figure 3.19), suivent également une cyclicité saisonnière.

L'estimation du CH<sub>4</sub> semble rendre compte dans les grandes lignes de la différence de flux mesurée entre 2013 et 2014.

Les flux interpolés à l'heure puis sommés par années sont présentés dans le tableau 3.2 pour les différents modèles. Sur les deux années, selon le modèle utilisé, le flux total entrant via la PPB est estimé à 1070 et 1290 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> pour PPB-2 et PPB-1 respectivement. Dans le détail on observe une différence entre les deux modèles : Celui utilisant uniquement la température de l'air (PPB-1) présente un stockage plus important en 2013 qu'en 2014. Tandis que le modèle prenant en compte la végétation (PPB-2) stocke moins de carbone en 2013 qu'en 2014. L'intégration de la végétation minimise également l'erreur standard de l'estimation, la divisant approximativement par deux.

La différence de comportement, entre les années de mesures, liée à l'intégration de

### 3.3. Résultats

---




FIGURE 3.18 – Flux de CO<sub>2</sub> interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3




FIGURE 3.19 – Flux de CO<sub>2</sub> interpolé à partir de RE-1, RE-2 et RE-3

Tableau 3.2 – Bilan des flux en gCm<sup>2</sup>an<sup>-1</sup>

ID	Flux	équation	2013	2014	moyen
PPB-1	PPB	3.1 et 3.2	1322 ± 410	1258 ± 390	1290 ± 400
PPB-2		3.3 et 3.2	957 ± 182	1184 ± 225	1070 ± 203
RE-1	RE	3.4	1337 ± 241	1235 ± 222	1286 ± 231
RE-2		3.5	1232 ± 160	1310 ± 170	1271 ± 165
RE-3		3.6	1240 ± 161	1281 ± 167	1261 ± 164
FCH4	CH4	3.7	10 ± 3	24 ± 8	17 ± 5

Tableau 3.3 – Bilan des flux en gCm<sup>2</sup>an<sup>-1</sup>

combinaison de modèles	2013	2014	moyen
PPB-1, RE-1, FCH4	-25	-2	-14
PPB-1, RE-3, FCH4	+72	-48	+12
PPB-2, RE-1, FCH4	-390	-75	-233
PPB-2, RE-3, FCH4	-293	-122	-208

la végétation est également visible sur l'estimation de la RE. La prise en compte de la végétation (modèles RE-2 et RE-3) conduit à une respiration plus forte en 2014 qu'en 2013 à l'inverse de RE-1. La différence entre l'estimation de la RE en 2013 et en 2014 diminue avec l'intégration de la végétation. Elle passe de 102 pour RE-1 à 78 puis 41 pour RE-2 et RE-3. Malgré ces différences, on observe une grande proximité dans les valeurs des flux interpolés sur les 2 années, quel que soit le modèle, avec un écart maximum de 25 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>.

Les flux de CH<sub>4</sub> estimés ont une erreur importante et sont beaucoup plus faible que les flux de la PPB ou de la RE. Le flux de CH<sub>4</sub> est au moins deux fois plus important en 2014 qu'en 2013.

Les bilans issus des différentes combinaisons de modèles (à l'exception de RE-3, non présenté car très proche de RE-2) varient de -233 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> à +12 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> stocké dans la tourbière (tableau 3.3). L'intégration de la végétation dans la modélisation de PPB fait baisser les bilans de carbone dans le négatif (système source) au-delà de -200 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>, avec une différence entre les bilans de 220 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> environ. La différence sur les bilans quand les modèles de RE utilisent ou non la végétation est moindre : environ 26 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> (tableau 3.3).

### 3.3. Résultats

---

Tableau 3.4 – Sensibilité relative (en %) du bilan de CO<sub>2</sub> (ENE) en réponse à une variation de  $\pm 10\%$  de chacun des paramètres des modèles.

PPB		RE		CH <sub>4</sub>			
	-10 %		+10 %		-10 %		+10 %
PPB-1		RE-1		FCH4			
a	-3263	+3243	a	+3371	-3371	a	+0,05
b	+14 788	-11 859	b	+7616	-10 078	b	+0,2
c	-7597	+7398					-0,36
i	+119	-139					
PPB-2		RE-1		FCH4			
a	+59	-57	a	-60	+60	a	0
b	-78	+85	b	-135	+178	b	0
c	+40	-33					+0,01
d	-14	+14					
i	6,22	-5,40					
PPB-1		RE-3		FCH4			
a	-426	+423	a	+168	-168	a	+0,01
b	+1931	-1548	b	+813	-1018	b	+0,03
c	-992	+966	c	+263	-263		-0,05
i	-18	+15					
PPB-2		RE-3		FCH4			
a	+67	-65	a	-26	+26	a	0
b	-89	+97	b	-125	+157	b	0
c	+45	-38	c	-40	+40		0
d	-16	+16					
i	+7,1	-6,1					

#### <sup>1106</sup> Évaluation du bilan

<sup>1107</sup> L'analyse de sensibilité, consistant à faire varier chaque paramètre des modèles  
<sup>1108</sup> de  $\pm 10\%$ , les combinaisons de modèles PPB-1, PPB-2, RE-1 et RE-3 ont été testé  
<sup>1109</sup> (Tableau 3.4). Le modèle RE-2, très proche du modèle RE-3 n'a pas été testé. **Attente**  
<sup>1110</sup> **du COD, les valeurs du tableau sont fausse pour le moment**




FIGURE 3.20 – Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres des modèles RE-1 et RE-3

### 3.3. Résultats




FIGURE 3.21 – Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2

#### 3.3.4 Variabilité spatiale du bilan

##### Représentativité locale

La classification hiérarchique a permis de distinguer 4 groupes de végétation (Figure 3.22). Dans le premier groupe, la strate muscinale est majoritaire avec un recouvrement moyen de 91 %, moins de 35 et 15 % de recouvrement pour les herbacées et les arbustes respectivement. Le deuxième groupe est le plus homogène avec un recouvrement moyen des strates muscinale et arbustive de 63 et 58 % chacune. C'est également le groupe où il y a de moins d'herbacées avec un recouvrement de 24 %. La strate herbacée est majoritaire dans le troisième groupe avec un recouvrement moyen de 63 %, la strate arbustive y est peu présente (19 % en moyenne) et la strate muscinale y est pour ainsi dire absente (1 %). La strate muscinale est également absente, ou presque, dans le groupe quatre (1 %). Groupe dans lequel la strate arbustive est majoritaire avec de 65 % de recouvrement moyen, et la strate herbacée avec 33 %.

Les bilans de CO<sub>2</sub> calculés par groupe de végétations sont présentés dans le ta-




FIGURE 3.22 – Distribution de l'erreur standard par placette et des paramètres du modèle PPB-2

Tableau 3.5 – Bilan des flux de CO<sub>2</sub> en gCm<sup>2</sup>an<sup>-1</sup>, en utilisant PPB-2 et RE-3

groupe	PPB-2	RE-3	ENE
1	714	1023	-308
2	1045	1385	-340
3	1323	1057	266
4	1002	1262	-260

bleau 3.5. On constate que du point de vue de l'ENE les groupes 1 et 2 sont relativement proche, et que le groupe 3 est du même ordre de grandeur bien qu'avec une ENE un peu moins négative. Le groupe 3 est le seul groupe présentant une ENE positive, du même ordre de grandeur que les précédentes en valeur absolue. Dans le détail, la RE est la plus forte, supérieure à 1200 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>, dans les groupes 2 et 4. Elle est plus faible dans les groupes 1 et 3 (environ 1000 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>). Pour la PPB, la valeur la plus faible est dans le groupe 1 et la plus forte dans le groupe 3 avec plus de 1300 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>, soit une différence de plus de 600 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>. Les groupes 2 et 4 sont relativement proches avec des valeurs intermédiaires avoisinant 1000 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>.

<sub>1134</sub> Modélisation par placette

<sub>1135</sub> Corrélation avec facteurs contrôlant

<sub>1136</sub> 3.4 Discussion

<sub>1137</sub> 3.4.1 Estimations des flux

<sub>1138</sub> PPB

<sub>1139</sub> L'estimation des flux de PPB, est comprise entre 957 et 1322 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> selon  
<sub>1140</sub> l'année et le modèle utilisé. Ces valeurs sont très élevées comparées à des tourbières  
<sub>1141</sub> boréales comme celles étudiées par ([Trudeau et al., 2014](#)) ou encore ([Peichl et al., 2014](#))  
<sub>1142</sub> dont les valeurs de PPB sont respectivement comprise entre 123 et 131 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>  
<sub>1143</sub> et entre 203 et 503 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>. Une première hypothèse permettant d'expliquer une  
<sub>1144</sub> telle différence, est la différence entre les températures moyennes sur les sites. -4,3 °C  
<sub>1145</sub> et 1,2 °C respectivement pour [Trudeau et al. \(2014\)](#) et [Peichl et al. \(2014\)](#). Ces tem-  
<sub>1146</sub> pératures sont bien plus faible pour les sites des études pré-citées que sur la tourbière  
<sub>1147</sub> de La Guette. Une seconde hypothèse, qui n'exclue pas la première, serait la com-  
<sub>1148</sub> position végétale de ces sites. La tourbière de La Guette envahie par une végétation  
<sub>1149</sub> vasculaire, notamment herbacée, est plus proche d'une prairie tourbeuse que d'une tour-  
<sub>1150</sub> bière boréale. En effet les valeurs observées à La Guette sont comparables à ce type  
<sub>1151</sub> d'écosystèmes. [Jacobs et al. \(2007\)](#) estiment des valeurs de PPB comprises entre 400 et  
<sub>1152</sub> 2000 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> avec une moyenne de 1300 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> dans des prairies tourbeuses  
<sub>1153</sub> hollandaises. Sur des écosystèmes similaires, au Danemark, ([Görres et al., 2014](#)) trouve  
<sub>1154</sub> des valeurs de PPB plus importantes encore, entre 1555 et 2590 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>. Il appa-  
<sub>1155</sub> rait cohérent que la tourbière de La Guette, par sa position géographique, et donc le  
<sub>1156</sub> climat qu'elle subit, mais également par sa problématique d'envahissement important  
<sub>1157</sub> par une végétation vasculaire notamment herbacée, s'approche en termes de flux de  
<sub>1158</sub> site tourbeux drainés pour les utiliser comme prairie.

1159 Le modèle PPB-1 a une incertitude importante sur l'estimation de ses paramètres.  
1160 L'apport de l'indice de végétation dans l'estimation de la PPB est important lors de la  
1161 phase de calibration. Il permet de diminuer l'incertitude sur les paramètres du modèles,  
1162 d'augmenter leur significativité et d'améliorer la représentativité des données mesurées.  
1163 L'intégration de la végétation aux modèles d'estimation de la PPB est rarement réalisé  
1164 ([Bortoluzzi et al., 2006; Görres et al., 2014](#)), probablement à cause de la difficulté à  
1165 prendre en compte ce signal aux sources multiples. Malgré cette amélioration lors de la  
1166 calibration, lorsqu'il est évalué sur un jeu de données indépendant, le modèle PPB-2 à  
1167 une erreur standard plus importante que celle du modèle PPB-1. L'apport de cet indice  
1168 dans l'estimation de la PPB n'est donc pas généralisable. Bien que rarement faite à  
1169 cause de la rareté des données, l'évaluation des modèles est cependant d'un intérêt  
1170 majeur afin de confirmer ou d'infirmer l'apport de l'ajout d'un prédicteur à un modèle,  
1171 particulièrement si l'on souhaite l'extrapoler.

1172 Les différences observées selon la façon d'estimer la PPB peuvent paraître impor-  
1173 tante, néanmoins elles sont du même ordre de grandeur que celle rencontré par [Worrall](#)  
1174 *et al.* ([2009](#)) qui compare différentes façons de modéliser des flux de gaz avec des équa-  
1175 tions différentes (et non pas juste des variations sur un type de modèle). Ces différences  
1176 sont également liées à l'importance des flux qui font que, surtout dans le cas de mo-  
1177 dèles exponentiels, de faibles variations peuvent avoir des effets importants comme en  
1178 témoigne l'analyse de sensibilité des paramètres du modèle ([Tableau 3.4](#)).

1179 **Discussion 2013-2014 ?** Dans le détail l'intégration de l'indice de végétation à un  
1180 effet beaucoup plus important en 2013, avec un flux qui diminue de  $365 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ ,  
1181 qu'en 2014 où la baisse n'est que de  $74 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ .

1182 **RE**

1183 De la même façon que pour la PPB, les flux de la RE sont important si on les  
1184 compare à des tourbières boréales et s'approchent davantage des flux mesurés dans  
1185 les prairies sur sols tourbeux. La Re sur la tourbière de La Guette, comprise entre  
1186 1232 et  $1337 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$  est plus importante que celle observée par ([Peichl et al.](#),

### 3.4. Discussion

---

1187 2014; Trudeau *et al.*, 2014) (pour reprendre les études citées précédemment) qui s'éta-  
1188 blissent respectivement entre 137 et 443 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> et 206 et 234 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>. Elles  
1189 sont en revanche plus faible que celle mesurées par (Jacobs *et al.*, 2007), entre 500 et  
1190 2000 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>, ou par (Görres *et al.*, 2014) : entre 2070 et 3500 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>.

1191 À l'inverse de la PPB, l'intégration de la végétation pour modéliser la RE n'amé-  
1192 liore que peu l'estimation de la RE lors de la phase de calibration : la différence entre  
1193 les valeurs d'erreur standard est de 5 %. En revanche lors de la phase d'évaluation,  
1194 l'utilisation du recouvrement des herbacées semble améliorer l'estimation de façon plus  
1195 importante avec une différence de 11 % entre les valeurs d'erreur standard. Contraî-  
1196 rement à la PPB la différence apportée par l'intégration de la végétation (RE-2 ou  
1197 RE-3) est du même ordre de grandeur en 2013 et en 2014. Sur les 2 années, l'effet  
1198 de l'intégration de la végétation est limité avec une différence de 25 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup> au  
1199 maximum (entre ER-1 et ER-3), soit moins de 2 % du flux. Encore une fois l'intérêt  
1200 de l'évaluation est mis en avant puisqu'il permet de distinguer des modèles très proche  
1201 lors de la calibration.

1202 Les incertitudes sur l'estimation des paramètres RE sont beaucoup moins impor-  
1203 tante que celle de la PPB. L'estimation des paramètres des modèles, à l'exception du  
1204 paramètre c du modèles RE-2, ont une p-value inférieure à 0.05. L'erreur calculée lors  
1205 de l'évaluation de ces modèles, si elle augmente par rapport à la calibration, reste  
1206 faible particulièrement pour le modèle RE-3 où elle vaut moins de 25 %. La RE semble  
1207 donc mieux contrainte que la PPB, avec une estimation des paramètres fiable et une  
1208 différence entre les estimations issues des modèles limitée.

### 1209 CH<sub>4</sub>

1210 Les flux de CH<sub>4</sub> sont faibles comparés aux flux de CO<sub>2</sub>. Les valeurs mesurées sont  
1211 plus forte que celles mesurés entre 0 et 0,03 μmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> par Bortoluzzi *et al.* (2006).  
1212 Pour 2013 les valeurs mesurées sont proches de celle mesurée par Long *et al.* (2010).  
1213 L'absence d'étiage en 2014 explique peut-être le doublement des flux... (**Réf needed**)

1214 La faible relation observée entre le niveau de la nappe et les flux de méthane va dans

le même sens que les observations faites par Trudeau *et al.* (2012) et (à développer, de ref ds trudeau2012)

**COD**

### 3.4.2 Estimations des bilans

D'une manière générale, les bilans sont principalement contraints par les flux de CO<sub>2</sub>, le CH<sub>4</sub> ne jouant qu'un rôle marginal en termes de quantité de carbone. Ces observations sont cohérentes avec d'autres études comme Bortoluzzi *et al.* (2006); Worrall *et al.* (2009). La forte variabilité entre les différents bilans est à attribuer en grande majorité à l'erreur sur l'estimation du flux de PPB.

Selon le bilan considéré, la tourbière de La Guette stocke de faible quantité de C de l'ordre d'une dizaine de grammes par mètre carré, ou émet du carbone dans l'atmosphère de l'ordre de XX à plus de 200 gC m<sup>-2</sup> an<sup>-1</sup>. Les estimations sont cohérentes avec le fait que la tourbière de La Guette a subie un drainage à l'aval (fossé de la départementale 926) induisant un envahissement par une végétation vasculaire.

### 3.4.3 Sensibilité et limitations du bilan

Les incertitudes les plus fortes du bilan sont sur les flux de CH<sub>4</sub> avec une erreur standard de 32 % lors de la calibration et de 68 % lors de la validation. Cette différence importante montre que l'estimation des flux de CH<sub>4</sub> à l'aide de l'indice de végétation à permis l'estimation de sa contribution au bilan de carbone de l'écosystème pour les années 2013 et 2014, mais que son utilisation dans d'autre conditions (année sèche, haute MAT) est fortement limité. L'importance faible du CH<sub>4</sub> dans le bilan de carbone de la tourbière rend ces erreurs moins critiques que celles faites sur l'estimation de la PPB. Les incertitudes importantes sur la PPB, sont mises en évidence par les fortes variations des flux interpolés selon l'équation utilisée. Elles sont la source des variations observées en termes de bilan. L'ajout d'un indice de végétation diminue d'incertitude des paramètres du modèle, mais cet apport semble spécifique à l'étude, n'étant pas

### **3.4. Discussion**

---

reflété par l'évaluation dont la végétation est relativement similaire à celle de l'étude spatiale. À l'inverse la RE est bien contrainte. Sur les 2 années la différence entre les différentes équations utilisées ne dépassent pas  $25 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ .

#### **sensibilité du bilan au variation des paramètres**

**limitations** Outre ces aspects ce bilan de carbone est aussi limité par sa représentativité. Ainsi la strate arborée fortement présente dans certaines zones n'est pas directement prise en compte. De la même manière une partie restreinte de la tourbière mais néanmoins présente est constitué de touradons dont l'effet n'a pas été pris en compte. (**Réf needed**) (**biblio effet microtype**).

- pas de cartographie (pas grave si p7 maj bien représentée par mdl ecos)
- extrapolation sur d'autres site difficile (cf validation)

#### **3.4.4 Représentativité locale du modèle**

Distribution des paramètres

Pourquoi certaines placette mieux que d'autres

Concernant la respiration la représentativité locale des modèles calibrés à l'échelle de l'écosystème semble plus homogène pour le modèle RE-3 que pour le modèle RE-1.

Une telle comparaison entre PPB-1 et PPB-2 n'a pas été possible car vu le faible nombre de données et la qualité relative des modèles PPB par rapport aux modèles RE, peu de modèles sont parvenus à converger pour PPB-1 (11 sur 20 placettes) et pour PPB-2 (17 sur 20 placettes).

#### **3.4.5 Variation du bilan avec la végétation**

Le calcul des bilans avec les groupes de végétation permet de mettre en évidence des comportements différents des flux selon la végétation majoritaire. Ainsi le groupe 3 dans lequel la strate herbacée est la plus importante est celui où la PPB est la plus forte. Ce point semble en cohérence avec la croissance annuelle importante des herbacées. À l'inverse le groupe 1 dans lequel la strate muscinale est la plus importante est également le groupe pour lequel la PPB est la plus faible. (**Réf needed**)

<sub>1268</sub> Pour la RE, ce sont les groupes 3 et 4 qui ont les flux estimés les plus importants  
<sub>1269</sub> avec une différence d'environ  $200 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$  avec les deux autres groupes. Malgré  
<sub>1270</sub> leurs différences, le groupe 2 possède une strate muscinale importante alors qu'elle est  
<sub>1271</sub> absente dans le groupe 3, ils ont en commun d'avoir une strate arbustive importante.

### <sub>1272</sub> 3.4.6 perspectives

<sub>1273</sub> cartographie ?



# <sup>1274</sup> 4 Effets de l'hydrologie sur les flux de GES

<sup>1275</sup>

<sup>1276</sup>	<b>4.1 Introduction</b>	<sup>1277</sup> . . . . . 84
<sup>1278</sup>	<b>4.2 Procédure expérimentale</b>	<sup>1279</sup> . . . . . 85
<sup>1280</sup>	4.2.1 Expérimentation A	<sup>1281</sup> . . . . . 86
<sup>1282</sup>	4.2.2 Expérimentation B	<sup>1283</sup> . . . . . 86
<sup>1284</sup>	4.2.3 traitement	<sup>1285</sup> . . . . . 87
<sup>1286</sup>	<b>4.3 Résultats</b>	<sup>1287</sup> . . . . . 88
<sup>1288</sup>	4.3.1 Expérimentation A	<sup>1289</sup> . . . . . 88
<sup>1290</sup>	4.3.2 Expérimentation B	<sup>1291</sup> . . . . . 91
	4.3.3 tendances générales	. . . . . 94
<sup>1292</sup>	<b>4.4 Discussion</b>	<sup>1293</sup> . . . . . 94
<sup>1294</sup>	4.4.1 Comparaison aux mesures <i>in-situ</i>	<sup>1295</sup> . . . . . 94
<sup>1296</sup>	4.4.2 Effet des variations du niveau de la nappe sur les flux de gaz	<sup>1297</sup> . . . . . 96
	4.4.3 Effet cycles multiples	. . . . . 97

## 1292 4.1 Introduction

1293 Au cours des deux années qu'ont duré les suivis des émissions de flux de CO<sub>2</sub> et  
1294 de CH<sub>4</sub> sur la tourbière de La Guette, le niveau de la nappe n'a que très faiblement  
1295 varié comparé aux années précédentes bien plus sèches. En conséquence de cette faible  
1296 variation peu de variations des flux ont pu y être relié. Malgré tout il est connu que  
1297 l'hydrologie est un facteur contrôlant important des flux.

1298 Ainsi de nombreuses études on reliées les émissions de CO<sub>2</sub> au niveau de la nappe  
1299 avec, cependant, des résultats et des conclusions variables. La majorité des études  
1300 montrent qu'une tourbière dont le niveau de la nappe est abaissé, soit par un drainage,  
1301 soit par une sécheresse, aura tendance à avoir un ENE plus faible : Ainsi [Strack et](#)  
1302 [Zuback \(2013\)](#) expliquent des valeurs d'ENE plus faibles qu'escompté, par des mesures  
1303 faites pendant une période relativement sèche. Une observation similaire est faite par  
1304 [Aurela et al. \(2007\)](#) qui mesure un ENE plus faible lors d'une année sèche, sur une  
1305 tourbière à Carex du sud de la Finlande. Ils attribuent la variation de l'ENE à une  
1306 augmentation de la RE et à une baisse de la PPB, dans des conditions plus chaudes  
1307 et plus sèches. [Peichl et al. \(2014\)](#) observent également une baisse de l'ENE lors d'une  
1308 année où le niveau de la nappe baisse de façon importante, au delà de -30 cm. Ils  
1309 expliquent cette baisse par une baisse de la PPB. Cette observation va dans le même  
1310 sens que [Lund et al. \(2012\)](#) qui, lors de l'étude d'une tourbière située au sud de la suède,  
1311 observent en 2008 une baisse de l'ENE. Les mesures de RE faites cette année là étant  
1312 similaires à celles effectuées les autres années, ils lient cette baisse à une diminution  
1313 de la PPB. En 2006, sur la même tourbière, [Lund et al. \(2012\)](#) observent une autre  
1314 baisse de l'ENE. Mais cette fois, les mesures de PPB à leur tour similaires à celle  
1315 des autres années n'expliquent pas cette baisse. À l'inverse de 2008, cette baisse est  
1316 expliqué par une augmentation de la RE Ce paradoxe apparent est interprété grâce  
1317 au type de sécheresse : courte et intense pendant la saison de végétation de 2006 et  
1318 d'intensité plus faible mais d'une durée plus longue en 2008. Enfin et à l'inverse des

1319 résultats précédemment cités, [Ballantyne et al. \(2014\)](#) dans une étude des effets à long  
 1320 terme d'une baisse du niveau de la nappe, n'observe que peu d'effet sur l'ENE tandis  
 1321 que les flux de RE et de PPB augmentent tous deux. Toutes ces études montrent que  
 1322 si le niveau de la nappe est incontestablement reconnu comme un facteur de contrôle  
 1323 des flux de CO<sub>2</sub>, il est difficile d'en dégager, avec certitude, un comportement valable  
 1324 de façon générale.

1325 Concernant le méthane, une baisse du niveau de la nappe est généralement liée à  
 1326 une baisse des émissions de CH<sub>4</sub>, et inversement ([Strack et al., 2006; Pelletier et al.,](#)  
 1327 [2007; Turetsky et al., 2008](#)). Cependant d'autres études, principalement dans des sites  
 1328 où le niveau de la nappe est proche de la surface du sol, montrent une absence de  
 1329 relation entre le niveau de la nappe et les émissions de méthane, voire une relation  
 1330 inverse, avec des flux plus faibles liés à des niveaux de nappe plus élevés ([Kettunen](#)  
 1331 [et al., 1996; Bellisario et al., 1999; Treat et al., 2007](#)). Là encore selon les conditions  
 1332 environnementales, la relation entre les flux de CH<sub>4</sub> et le niveau de la nappe n'est pas  
 1333 aisément généralisable.

1334 L'objectif de ce chapitre est donc d'explorer plus en avant l'effet du niveau de la  
 1335 nappe sur les émissions de GES, effet peu ou pas visible *in-situ*. Plus précisément il  
 1336 s'agit de déterminer l'effet de cycles de dessication/ré-humectation sur les émissions de  
 1337 CO<sub>2</sub> et de CH<sub>4</sub>.

## 1338 4.2 Procédure expérimentale

1339 L'étude des cycles de dessication/ré-humectation s'est effectué sur des mésocosmes,  
 1340 prélevés sur la tourbière de La Guette. L'expérimentation a été testé durant l'été 2013  
 1341 avec un seul cycle relativement long, on s'y référera par la suite comme l'expérimenta-  
 1342 tion A. Cette expérimentation a été renouvelée l'été 2014 afin d'augmenter à trois le  
 1343 nombre de cycles, ceux-ci étant plus court. On appellera cette seconde expérimentation,  
 1344 l'expérimentation B (Tableau 4.1).

### **1345 4.2.1 Expérimentation A**

1346 Le 12 avril 2013, ont été prélevés, sur la tourbière de La Guette 6 mésocosmes. Le  
1347 prélèvement de mésocosmes s'effectue à l'aide de cylindres de PVC qui, dans un premier  
1348 temps, posé sur le sol, permettent de faire un pré-découpage au couteau, puis dans un  
1349 second temps sont insérés, délicatement, dans la tourbe. Les mésocosmes sont finale-  
1350 ment dégagés en creusant de chaque côté (Figure 4.1). Les mésocosmes sont transportés  
1351 au laboratoire où ils sont enterrés en extérieur et saturé en eau (eau prélevée dans la  
1352 tourbière), afin que leur conditions hydrologique de départ soient les plus proche pos-  
1353 sible (Figure 4.2). Trois mésocosmes sont choisi pour servir de contrôle, et trois vont  
1354 subir un cycle de dessication/ré-humectation. À partir du 31 mars 2013 les précipita-  
1355 tions ont été interceptées à l'aide d'abri bâchés installable rapidement en cas de pluie  
1356 et la nuit. Ces interceptions ont été faites jusqu'au 17 juillet dans les 3 mésocosmes  
1357 traités pour simuler une sécheresse. À cette date de l'eau est ajouté aux mésocosmes,  
1358 que ce soit les contrôles ou les traitements, pour simuler de fortes précipitations.

### **1359 4.2.2 Expérimentation B**

1360 Le 17 avril 2014, 6 nouveaux mésocosmes ont été prélevés sur la tourbières de La  
1361 Guette et installé près du laboratoire, en suivant le même protocole que pour l'expéri-  
1362 mentation A. Une station météo a été installée à côté des mésocosmes afin de mesurer  
1363 la température de l'air, l'humidité relative, l'irradiation solaire, la vitesse et la direction  
1364 du vent et les précipitations toutes les 15 minutes. Cette station permettait également  
1365 l'enregistrement des températures mesurées par des sondes (T107) installées à -5, -10,  
1366 et -20 cm. Les conditions météorologiques moins ensoleillée qu'en 2013 et l'objectif de  
1367 suivre plusieurs cycles de dessication/réhumectation ont nécessité la mise en place  
1368 d'un abaissement manuel du niveau de la nappe. Pendant les phases d'assèchement les  
1369 niveaux de nappes des placettes traitées étaient donc abaissés en moyenne de 2,5 cm  
1370 par jour. Le premier cycle de dessication/réhumectation dura du 30 juin au 6 juillet  
1371 pour la phase de dessication est du 7 au 16 juillet pour la phase de réhumectation.



FIGURE 4.1 – Prélèvement des mésocosmes

Tableau 4.1 – Récapitulatif des mesures pour les deux expérimentations

expérimentation	A	B
année	2013	2014
réplicats	6	6
cycles	1	3
station météo	non	oui

<sup>1372</sup> Le deuxième cycle dura du 17 au 28 juillet et du 29 juillet au 3 aout, Enfin le dernier  
<sup>1373</sup> cycle fut mesuré du 4 au 11 aout pour la dessication et du 12 au 14 aout pour la  
<sup>1374</sup> réhumectation.

### <sup>1375</sup> 4.2.3 traitement

<sup>1376</sup> Les flux sont moyennés par jour de mesure.




FIGURE 4.2 – Schéma d'un mésocosme

## <sup>1377</sup> 4.3 Résultats

### <sup>1378</sup> 4.3.1 Expérimentation A

<sup>1379</sup> Pendant la phase de dessication de l'expérimentation A, on observe une baisse du  
<sup>1380</sup> niveau de la nappe pour les placettes contrôles comme pour les placettes traitements  
<sup>1381</sup> (Figure 4.3–A). Malgré tout leur comportement est différent : les placettes contrôles ont  
<sup>1382</sup> un niveau de nappe relativement élevé jusqu'au 24 juin puis ce niveau baisse fortement  
<sup>1383</sup> alors que les placettes du groupe traité ont un niveau de nappe qui diminue de façon  
<sup>1384</sup> plus continue sur l'ensemble de la phase. La remontée du niveau de la nappe s'effectue  
<sup>1385</sup> de façon similaire pour les deux groupes. Enfin après la phase de ré-humectation, le  
<sup>1386</sup> niveau de la nappe baisse à nouveau, plus rapidement pour le groupe traitement que  
<sup>1387</sup> pour le groupe contrôle.

<sup>1388</sup> Les émissions de  $\text{CH}_4$ , s'étendant de 0 et  $0,3 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , sont relativement si-  
<sup>1389</sup> milaires entre les deux groupes jusqu'au 24 juin 2013, date à partir de laquelle ils  
<sup>1390</sup> commencent à diverger (Figure 4.3–B). À cette date les émissions du groupe contrôle  
<sup>1391</sup> augmentent rapidement pour atteindre  $0,55 \pm 0,31 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  tandis que celles du  
<sup>1392</sup> groupe traité restent stable. Finalement mi-juillet, à la fin de la phase de dessicca-  
<sup>1393</sup> tion les deux groupes retrouvent des niveaux d'émission similaires compris entre 0,1 et




FIGURE 4.3 – Expérimentation A : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux,  $\text{CH}_4$ , RE, PPB, ENE en  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent à la phase de dessiccation (D) en rouge et à la phase de réhuméfaction (R) en bleu.

### 4.3. Résultats

---

1394 0,2  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ . Ces niveaux restent constant pendant toute la phase de réhumecta-  
1395 tion, avant d'augmenter légèrement par la suite ; ils ne dépassent pas 0,25  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$   
1396 mais franchissent la barre des 0,2  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ .

1397 Pendant la phase de dessication, les valeurs de la RE tendent à augmenter quel  
1398 que soit le groupe de placettes considéré (Figure 4.3–C). Ces valeurs inférieures à  
1399 2,5  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  début juin, atteignent environ 7  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  pour les deux groupes  
1400 mi-juillet, avant la réhumectation. Dans le détail cependant les deux groupes ne se  
1401 comportent pas de la même façon : la RE du groupe traité augmente régulièrement  
1402 pendant l'ensemble de cette phase, tandis que les valeurs du groupe de contrôle res-  
1403 tent, dans un premier temps, stable jusque fin juin. La RE de ce groupe vaut alors  
1404  $2,45 \pm 0,75 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  contre  $3,26 \pm 0,46 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  pour le groupe traité. Cet  
1405 écart, pouvant varier dans le temps, étant installé depuis le 9 juin. À partir de dé-  
1406 but juillet, les valeurs de RE du groupe de contrôle augmentent fortement dépas-  
1407 sant les valeurs du groupe traité. La RE de ce groupe atteint alors un maximum à  
1408  $7,93 \pm 1,52 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  le 8 juillet avant de retrouver des valeurs proche de celles ob-  
1409 servées dans le groupe traité. Cette augmentation brusque correspond temporellement  
1410 à celle observé, pour le même groupe, dans les flux de CH<sub>4</sub>. Lors de la phase de réhu-  
1411 mectation, les flux de RE diminuent de façon très similaire pour les deux groupes ou  
1412 ils atteignent un minimum proche de 2,75  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ . Ce minimum reste cependant  
1413 plus élevé que les valeurs mesurées initialement. Après la phase de réhumectation, les  
1414 flux des deux groupe restent relativement proches pendant le reste des mesures, où ils  
1415 remontent à mesure que le niveau de la nappe diminue à nouveau.

1416 Pour les deux groupes, les flux de PPB restent relativement stables pendant la  
1417 phase de dessiccation (Figure 4.3–D). Jusqu'au 24 juin, les flux des deux groupes sont  
1418 très proches et sont compris entre 5 et 6  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  ( $5,29 \pm 0,76 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  de  
1419 moyenne pour les deux groupes). Après cette date, et comme pour le CH<sub>4</sub> et la RE,  
1420 les valeurs de la PPB du groupe de contrôle augmentent et s'écartent de celles me-  
1421 surées dans le groupe traité, en attendant de les rejoindre avant la fin de cette phase  
1422 de dessiccation. Par ailleurs, à la fin de cette phase, les flux diminuent légèrement at-

teignant un minimum proche de  $3 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ . Pendant la phase de réhumectation, la PPB augmente très légèrement pour les deux groupes, le groupe de contrôle ayant des valeurs systématiquement supérieures à celles du groupe traité. Après la réhumectation, la PPB augmente un peu pour le groupe traité, atteignant un maximum de  $5,83 \pm 1,61 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , et plus fortement pour le groupe de contrôle où le maximum atteint, de  $10,17 \pm 3,30 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , est quasiment le double du précédent.

L'ENE mesuré sur les deux groupes est systématiquement supérieure pour le groupe contrôle, avec une évolution parallèle des flux pour les deux groupes (Figure 4.3–E). Pendant la phase de dessiccation l'ENE reste relativement constante jusque fin juin avec une valeur moyenne pour les deux groupes de  $1,18 \pm 0,58 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ . L'écart entre le groupe contrôle et le groupe traitement tend à augmenter du 10 au 30 juin environ, avant que les valeurs du groupe de contrôle ne rejoignent celles du groupe traité. Au delà du 24 juin, l'ENE baisse fortement pour les deux groupes pour atteindre un minimum proche de  $-4,5 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ . Pendant la phase de réhumectation l'ENE monte rapidement pour atteindre  $1,52 \pm 0,36$  et  $2,15 \pm 1,47 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  pour le groupe de contrôle et de groupe traité respectivement. Après la réhumectation, l'ENE du groupe contrôle varie en suivant généralement les variations du niveau de nappe. Pour le groupe traité, l'ENE baisse par rapport au maximum atteint lors de la réhumectation puis se stabilise autour de 0.

Les variations du niveau de la nappe sont principalement liée à la RE (Figure 4.5–C) et, à travers elle, à l'ENE (Figure 4.5–G). L'effet des variations du niveau de la nappe sur la PPB est quasiment nul (Figure 4.5–E), même si la PPB semble diminuer aux plus fortes profondeurs. Pour le CH<sub>4</sub> il est également difficile de distinguer des tendances générales entre les flux et les niveaux de nappe (Figure 4.5–A).

### 4.3.2 Expérimentation B

Contrairement à l'expérimentation A, le niveau de nappe du groupe de contrôle de l'expérimentation B reste relativement constant pendant l'ensemble de la période de mesure. Le drainage artificiel du groupe traité permet d'abaisser le niveau de la nappe

### 4.3. Résultats




FIGURE 4.4 – Expérimentation B : Moyenne journalière du niveau de nappe en cm (A), et des flux,  $\text{CH}_4$ , RE, PPB, ENE en  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , B, C, D, E. Les cadres et bandes colorées correspondent aux phases de dessiccation (D) en rouge et aux phases de réhumectation (R) en bleu.

1451 d'une quinzaine de centimètres en moyenne pour chaque cycle (Figure 4.4–A).

1452 Les flux de CH<sub>4</sub> moyen s'étendent de 0,07 à 0,34 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>. Les flux du groupe  
1453 de contrôle, à l'exception de la première mesure, sont supérieurs aux flux du groupe  
1454 traité, leurs moyennes respectives sur l'ensemble des mesures étant de 0,20 ± 0,06 et  
1455 0,11 ± 0,05 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> respectivement. Les émissions du groupe de contrôle tendent  
1456 à augmenter sur la période de mesure. Une tendance similaire, quoique moins mar-  
1457 quée, est également visible pour le groupe traité. Concernant les cycles de dessicca-  
1458 tion/réhumectation, il est difficile de dégager des comportements communs, même s'il  
1459 semble que l'assèchement conduit à une baisse des émissions (Figure 4.4–B) Cette re-  
1460 lation, mise en exergue pas un nombre de points très faible, n'apparaît cependant pas  
1461 sur l'ensemble des données (Figure 4.5–B) Un pic d'émission de CH<sub>4</sub> est également à  
1462 noter pour chaque cycle pendant la phase de dessiccation.

1463 La RE varie pour les deux groupes entre 0,42 et 5,12 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> (Figure 4.4–C)).  
1464 Avant le démarrage des manipulations du niveau de la nappe, les valeurs des deux  
1465 groupes sont très proches et augmentent tandis que le niveau de nappe diminue. Pen-  
1466 dant les phases de dessiccation, les valeurs du groupe traité sont systématiquement supé-  
1467 rieures, de 1,5 à 1,8 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> en moyenne par phase, par rapport à celle du groupe  
1468 de contrôle. À l'inverse pendant les phases de réhumectation les flux entre les deux  
1469 groupes sont beaucoup plus proches avec une tendance de la RE du groupe de contrôle  
1470 à être au dessus de celle du groupe traité. La RE du groupe traité est systématiquement  
1471 plus faible pendant les phases de réhumectations que pendant les phases de dessicca-  
1472 tions. En moyenne la RE vaut respectivement 2,28 ± 1,00 et 3,86 ± 0,80 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>  
1473 pour les groupes de contrôle et traité pendant les phases de dessiccation et 1,70 ± 0,62  
1474 et 1,51 ± 0,98 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> pendant les phases de réhumectation.

1475 Sur l'ensemble de la période de mesure la PPB est comprise entre 2,78 et 7,96 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>.

1476 Avant le début des traitements les flux des deux groupes sont similaires (Figure 4.4–D).  
1477 La première phase de dessiccation fait passer la PPB du groupe de contrôle au dessus  
1478 du groupe traité. Pour les deux groupes, la PPB est plus importante lors des phases  
1479 de dessiccation comparée aux phase de réhumectation, avec des moyennes respectives

## **4.4. Discussion**

---

<sup>1480</sup> de  $6,35 \pm 2,19$  contre  $5,80 \pm 2,20$  pour le groupe de contrôle et de  $5,95 \pm 1,46$  contre  
<sup>1481</sup>  $4,05 \pm 1,60 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  pour le groupe traité.

<sup>1482</sup> Les valeurs d'ENE mesurées sont comprises entre  $0,11$  et  $5,42 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , elles  
<sup>1483</sup> ont tendance à augmenter au cours du temps. Passé la période pré-traitements pendant  
<sup>1484</sup> laquelle les flux de l'ENE sont similaires pour les deux groupes l'ENE du groupe de  
<sup>1485</sup> contrôle est systématiquement supérieure à celle du groupe de traitement (Figure 4.4–  
<sup>1486</sup> E). L'évolution des deux groupes reste cependant relativement conjointe pendant la  
<sup>1487</sup> période de mesure avec pour le groupe traité une diminution récurrente de l'ENE au  
<sup>1488</sup> début de chaque phase de dessiccation.

### **4.3.3 tendances générales**

<sup>1490</sup> Pour les deux expérimentations une relation nette est visible entre le niveau de la  
<sup>1491</sup> nappe et l'ENE qui diminue lorsque le niveau de nappe augmente (Figure 4.5–G,H).  
<sup>1492</sup> La relation inverse est visible, pour les deux expérimentations, entre la RE et le niveau  
<sup>1493</sup> de la nappe (Figure 4.5–C,D). La PPB par contre ne montre aucune tendance claire  
<sup>1494</sup> quelle que soit l'expérimentation. On peut malgré tout noter que les valeurs de PPB les  
<sup>1495</sup> plus faibles correspondent aux niveaux de nappe les plus élevés(Figure 4.5–E,F). Pour  
<sup>1496</sup> le méthane, que ce soit pour l'expérimentation A ou B, aucune tendance ne semble se  
<sup>1497</sup> dégager vis à vis du niveau de la nappe (Figure 4.5–A,B).

## **4.4 Discussion**

### **4.4.1 Comparaison aux mesures *in-situ***

<sup>1500</sup> Les flux moyen de  $\text{CH}_4$  mesurés dans les mésocosmes des deux expérimentations  
<sup>1501</sup> font partie des valeurs hautes mesurées sur le terrain. Certaines campagnes dépassent  
<sup>1502</sup> nettement, en faisant plus que doubler, le maximum de  $0,2 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  mesuré en  
<sup>1503</sup> 2014 sur la tourbière de La Guette.




FIGURE 4.5 – Relations entre les flux de GES et le niveau de la nappe

#### 4.4. Discussion

---

1504 Pour le CO<sub>2</sub> les flux sont généralement dans la gamme des valeurs mesurée sur la  
1505 tourbière de La Guette. Pour l'expérimentation A, l'ENE moyen est plus faible que  
1506 celui mesuré sur le terrain la même année : 0,81 contre 2,85 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>. Pour l'expé-  
1507 rimentation B en revanche l'ENE moyen vaut 0,71 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> ce qui est relativement  
1508 proche de celui mesuré sur le terrain : 2,93 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>. Les flux de RE et de PPB  
1509 sont moins fort que les flux mesurés sur le terrain mais restent dans leur gamme de  
1510 valeurs. Ces comparaisons sont par ailleurs à relativiser puisque les mesures de flux  
1511 n'ont pas nécessairement lieu aux mêmes moment de la journée.

1512 Comme pour la RE, les flux de PPB sont du même ordre de grandeur que ceux me-  
1513 surés sur le terrain, mais légèrement plus faible : les maxima moyens mesurés dans les  
1514 mésocosmes sont d'environ 7,5 pour des valeurs de 13 µmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup> mesuré directement  
1515 sur la tourbière.

##### 1516 4.4.2 Effet des variations du niveau de la nappe sur les flux de 1517 gaz

1518 Les résultats de ces deux expérimentations montrent clairement une augmentation  
1519 de la RE quand le niveau de la nappe diminue. Ceci est en accord avec les résultats  
1520 d'autres études que ce soit in-situ (Ballantyne *et al.*, 2014) ou en mésocosmes (Blodau  
1521 *et al.*, 2004; Dinsmore *et al.*, 2009). Dans ces deux dernières publications, la baisse  
1522 du niveau de la nappe diminue la PPB. Pas de variations claires de la PPB n'est vi-  
1523 sible dans les données présentées, même si une légère tendance semble émergée aux  
1524 plus fortes profondeur de nappe pour l'expérimentation A, ces observations restent à  
1525 confirmer. Cette absence d'effet du niveau de la nappe sur la PPB peut, peut être,  
1526 être liée à la profondeur des mésocosmes (30 cm). En effet dans Blodau *et al.* (2004)  
1527 et Dinsmore *et al.* (2009), les mésocosmes utilisés sont plus grands, 75 et 41 cm res-  
1528 pectivement, ont permis d'abaisser le niveau de l'eau au delà de -30 cm. Cette limite  
1529 a été rapportée plusieurs fois comme étant un seuil au delà duquel son observés des  
1530 changements importants (Blodau *et al.*, 2004; Peichl *et al.*, 2014). Ce seuil est expliqué  
1531 comme étant la limite au delà de laquelle les forces de capillarités ne permettent plus

1532 d'alimenter en eau les sphaignes (Rydin et Jeglum, 2013a; Ketcheson et Price, 2014).  
1533 Il résulte des constats précédents qu'une baisse du niveau de nappe, faisant augmenter  
1534 la RE et ne changeant pas ou peu la PPB, conduit à une baisse de l'ENE. Cette di-  
1535 minution de l'ENE est cohérente avec la littérature, que ce soit des expérimentations  
1536 en mésocosmes (Aerts et Ludwig, 1997; Blodau *et al.*, 2004), ou in-situ (Bubier *et al.*,  
1537 2003; Sonnentag *et al.*, 2010). Malgré tout l'extrapolation de ses résultats à d'autres  
1538 situations n'est pas évidente car fortement fonction du contexte. D'autre études n'ont,  
1539 par exemple, pas observé d'influence du niveau de la nappe sur la RE (Updegraff *et al.*,  
1540 2001). Par ailleurs Laiho (2006) a montré l'importance du contexte et notamment celui  
1541 de l'échelle de temps considéré qui peut impliquer des phénomènes différents et donc  
1542 avoir des conséquences différentes.

1543 La dépendance entre les flux de CH<sub>4</sub> et le niveau de la nappe, devant conduire à une  
1544 baisse des émissions quand le niveau de la nappe diminue, comme décrite dans Aerts et  
1545 Ludwig (1997), Pelletier *et al.* (2007) ou Turetsky *et al.* (2008), n'a pas été clairement  
1546 observée. Ce constat rejoins d'autres études dans lesquelles une relation inverse ou un  
1547 absence de relation a été trouvé entre le CH<sub>4</sub> et le niveau de la nappe Kettunen *et al.*  
1548 (1996); Bellisario *et al.* (1999); Treat *et al.* (2007). L'observation d'un pic de méthane  
1549 suivant de quelques jours une phase de hausse du niveau de la nappe, est également  
1550 rapportée par Kettunen *et al.* (1996). (**And so what ?**)

#### 1551 4.4.3 Effet cycles multiples



1552 5 Variation journalière de la respiration de  
1553 l'écosystème (article)

1554

1555	<b>5.1 Introduction</b>	101
1556	5.1.1 Study sites	103
1557	5.1.2 Data acquisition	103
1558	5.1.3 Data synchronisation	104
1559	5.1.4 Sensitivity of ER to temperature	104
1560	5.1.5 Testing difference between daytime and nighttime ER sensi-	
1561	tivity to temperature	105
1562	5.1.6 Physico-chemical characterisation of the peat	105
1563	<b>5.2 Résultats</b>	106
1564	5.2.1 Température de l'air et variabilité de RE	106
1565	5.2.2 Synchronisation RE et température du sol	107
1566	5.2.3 Équations utilisées	108
1567	5.2.4 Relation entre RE et la température	109
1568	5.2.5 Évolution du Q10	110
1569	5.2.6 Différence entre mesures de jour et de nuit	112
1570	5.2.7 Caractérisation de la tourbe	112
1571	<b>5.3 Discussion</b>	112
1572	5.3.1 Différence de RE entre les différents sites	112
1573	5.3.2 Temps de latence entre température et RE	116
1574	5.3.3 La synchronisation entre RE et la température améliore la	
1575	représentation de la sensibilité de RE à la température	117
1576		

---

1577	5.3.4 Différence entre mesure de RE faite le jour et la nuit . . . . .	118
1578	5.3.5 La sensibilité du Q10 à la profondeur de la température et à	
1579	la synchronisation . . . . .	118
1580	<b>5.4 Conclusions . . . . .</b>	<b>119</b>
1582		

## 1583 5.1 Introduction

1584 At a global scale, Ecosystem Respiration (ER) and photosynthesis are the most  
1585 important fluxes between the atmosphere and the biosphere, accounting for 98 and  
1586 123 PgC yr<sup>-1</sup>, respectively (Bond-Lamberty et Thomson, 2010; Beer *et al.*, 2010). By  
1587 contrast the fossil fuel and cement production flux is one order of magnitude lower, at  
1588 7.8 PgC yr<sup>-1</sup> (Ciais *et al.*, 2014). Consequently, even small variations in the ecosystem  
1589 fluxes may result in substantial changes in carbon (C) storage dynamics. This can have  
1590 a significant effect on the global C budget, in particular on atmospheric C concentration.  
1591 The C stock in natural ecosystems is divided into two pools : vegetation, which contains  
1592 450 to 650 Pg C, and the soil which contains 1500 to 2400 Pg C (Prentice *et al.*, 2001;  
1593 Eswaran *et al.*, 1993; Batjes, 1996). Across the world, the soil organic C (SOC) pool is  
1594 spatially heterogeneous in terms of source and physical conditions, leading to variable  
1595 storage rates between ecosystem types. Peatlands are efficient C storage ecosystems.  
1596 They cover only 3 % of the global terrestrial area, but contain from 270 to 455 Pg C as  
1597 SOC, i.e. from 10 to 30 % of the world's soil C (Gorham, 1991; Turunen *et al.*, 2002).  
1598 Thus, peatlands are considered as a "hot spots" for SOC storage, and their evolution  
1599 under current environmental changes deserves attention.

1600 As in many other terrestrial ecosystems, many factors affect ER variability in peat-  
1601 lands : temperature, soil water content, vegetation, and substrate supply (Luo et Zhou,  
1602 2006a). All these factors are thought to be affected by global change, with unknown  
1603 consequences on the C balance (Limpens *et al.*, 2008). ER is often related to tempe-  
1604 rature : either to air temperature (e.g., Bortoluzzi *et al.*, 2006), or soil temperature.  
1605 The most commonly used soil temperatures are those at -5 cm (Ballantyne *et al.*, 2014;  
1606 Görres *et al.*, 2014) and -10 cm (Kim et Verma, 1992; Zhu *et al.*, 2015). In some studies,  
1607 different depths are used and the selected one depends on the goodness-of-fit (Günther  
1608 *et al.*, 2014; Zhu *et al.*, 2015). All these studies use the chamber method to measure  
1609 gas fluxes. Even though most studies use -5 cm soil temperature, no clear consensus

## 5.1. Introduction

---

exists. In addition Pavelka *et al.* (2007) and Graf *et al.* (2008) showed that the relationship between ER and temperature is depth dependent since heat transfer in the soil profile is not instantaneous and leads to a time-delay between the temperature and the ER signals. The relationship between ER and temperature is often described using the  $Q_{10}$  indicator, which represents the proportional increase of a reaction rate due to a 10°C rise in temperature. However, even if the  $Q_{10}$  seems coherent at a global scale (Mahecha *et al.*, 2010), reported values show a significant variability at the ecosystem level (Graf *et al.*, 2008). Because the measured  $Q_{10}$  are not linked to a single reaction but to multiple processes, numerous issues arise (Davidson *et al.*, 2006). Among them are the time-scale considered (Curiel Yuste *et al.*, 2004), the depth (Graf *et al.*, 2008) and the time-delays between ER and soil temperatures (Phillips *et al.*, 2011). One way to deal with the time-delays might be data synchronisation according to Pavelka *et al.* (2007). Another issue is the difference between the daytime and nighttime ER relationship with temperature. Juszczak *et al.* (2012), for example, showed that there are significant differences between ER modelled with daytime and nighttime data. Assessing these differences may be important when working at a daily timescale and when treating data from eddy-covariance measurements.

Based on these previous studies, we expected that time-delays in *Sphagnum*-dominated peatlands would be significant, even in the first 10 centimetres depth and that they would lead to a better description of observed data once taken into account, especially through data synchronisation. To our knowledge no studies have explored the time-delay between ER and soil temperature in peatlands yet. Differences in the ER-temperature relationship between daytime and nighttime datasets were also expected. To test these predictions, ER fluxes, during the growing season in 4 *Sphagnum*-dominated peatlands were measured in 2013. Continuous measurements over 72 hours were carried out in each site using static dark chambers. Air and soil temperature were also monitored. Specifically, the relationship between ER and temperature, measured at different depths in peat was studied and the difference between daytime and nighttime measurements was assessed.

1639        The aim of this study was (i) to highlight any time-delay at the daily timescale  
1640      between ER and soil temperature at different depths in peatlands (ii) to assess the  
1641      effect of synchronisation between ER and temperature in the representation of the diel  
1642      ER variations (iii) to use the improved model to assess whether there is a difference  
1643      between nighttime and daytime ER.

1644      **5.1.1 Study sites**

1645        The study was performed on four French *Sphagnum*-dominated peatlands : Berna-  
1646      douze (BDZ, Ariège ; 3.75 ha, N 42°48'09", E 1°25'24", 1400 m), Frasne (FRN, Doubs ;  
1647      98 ha, N 46°49'35", E 6°10'20", 836 m), Landemarais (LDM, Ille-et-vilaine ; 23 ha,  
1648      N 48°26'30", E 1°10'54", 154 m), and La Guette (LGT, Cher ; 26 ha, N 47°19'44", E  
1649      2°17'04", 145 m). Mean annual air temperatures and annual rainfalls were 6, 7.5, 11,  
1650      11°C, and 1700, 1400, 870, 880 mm for BDZ, FRN, LDM and LGT respectively. During  
1651      the measurements the water table level remained constant at to -12, -7, -35 and -9 cm  
1652      for BDZ, FRN, LDM and LGT.

1653      **5.1.2 Data acquisition**

1654        Fieldwork was conducted between July and October 2013. In each site, four plots  
1655      (replicates) with similar plant cover were chosen. Four cylindrical PVC collars (diame-  
1656      ter : 31 cm, height : 15 cm) were inserted into the peat the day before beginning the  
1657      measurements. For 72 hours, CO<sub>2</sub> fluxes were measured in the 4 plots once an hour  
1658      in random order. These measurements were undertaken using a closed static cham-  
1659      ber (diameter of 30.5 cm, height of 30 cm), with a GMP343 Vaisala probe. ER was  
1660      measured with a transparent chamber covered by an opaque material to avoid input of  
1661      photosynthetic active radiation. Inside the chamber the air was homogenized with a fan  
1662      in order to minimize concentration gradients ([Pumpanen et al., 2004](#)). Measurement  
1663      lasted a maximum of 5 min with CO<sub>2</sub> concentration recorded every 5 seconds as well  
1664      as the relative humidity and the temperature inside the chamber.

1665        In each site a weather station and a data logger were set up near the plots to provide

## 5.1. Introduction

---

1666 meteorological and environmental data recorded every second : surface temperature (air  
1667 temperature as close as possible to the surface : 5 cm), peat temperature (at -5, -10,  
1668 -20 and -30 cm depth), air relative humidity and solar radiation.

1669 After the 72 hours of measurements four peat cores (30 cm height and 15 cm  
1670 diameter), one for each replicate, were extracted at each site for physico-chemical cha-  
1671 racterisation.

### 1672 5.1.3 Data synchronisation

1673 The synchronisations between ER fluxes and temperatures were calculated for each  
1674 depth and time-delays : The acquisition frequency between temperature and ER were  
1675 different. Thus an average of the temperatures recorded during the ER measurement  
1676 time was calculated for all depths at the corresponding CO<sub>2</sub> flux measurement time.  
1677 Then the temperature averaging procedure was repeated at 10-minute increments, until  
1678 a 24 hour shift. The 10-minute step was a compromise between precision and calculation  
1679 time. Next a correlation coefficient was calculated for each time step and temperature  
1680 measurement depth. Finally the synchronisation was determined for each depth, by  
1681 selecting the time-delay corresponding to the highest correlation coefficient. Negative  
1682 correlations caused by the phase shift were discarded.

### 1683 5.1.4 Sensitivity of ER to temperature

Three widely used models Fang et Moncrieff (2001) were implemented to study the relationship between ER and temperature : Linear regression (5.1), exponential models : Q<sub>10</sub> (5.2) and Arrhenius (5.3)

$$ER = \alpha + \beta T \quad (5.1)$$

$$ER = \alpha e^{\beta T}; Q_{10} = e^{10*\beta} \quad (5.2)$$

$$ER = \alpha e^{\frac{-E_a}{RT}} \quad (5.3)$$

1684 ER was estimated using air temperature, soil temperatures at -5, -10, -20 and -30

1685 cm depth with both non-synchronised and synchronised datasets. Calculations were  
1686 implemented in R, and modelled data were adjusted to measured data using Ordinary  
1687 Least Squares (OLS). The goodness-of-fit was estimated by calculating the regression  
1688 coefficient ( $R^2$ ) and the root mean square error normalized by the mean (NRMSE).

1689 **5.1.5 Testing difference between daytime and nighttime ER**  
1690 **sensitivity to temperature**

1691 To test whether the relationship between ER and temperature differed during day-  
1692 time and nighttime, the dataset was split into two groups which were then compared.  
1693 The data between 10 am and 5 pm were considered as representative of the day and  
1694 data between 11 pm and 6 am as representative of the night. Only the air temperature  
1695 and the -5 cm depth peat temperature (with synchronised and non-synchronised data)  
1696 were investigated as they provide the best ER representation. The data for day and  
1697 night were centred to account for natural differences in measurement, since : during  
1698 the day both temperature and ER are higher than in the night. Using these centred  
1699 data, ratios between ER and temperatures were calculated. Finally a paired Student's  
1700 t test was applied on the mean of the replicate for each site and each temperature to  
1701 assess the significance of the differences between day and night measurements.

1702 **5.1.6 Physico-chemical characterisation of the peat**

1703 In the laboratory, two peat cores from each site were immersed in water during 24  
1704 hours to saturate the pores. Then, the cores were soaked overnight to get rid of the  
1705 water filling the effective porosity. At 5 cm steps, a piece of peat with a known volume  
1706 ( $V$ ,  $\text{cm}^3$ ) was cut and weighed ( $W_1$ , g). Then, the samples were dried at  $50^\circ\text{C}$  for 48  
1707 hours and weighed ( $W_2$ , g). Total porosity ( $\Phi_T$ , dimensionless), retention porosity ( $\Phi_R$ ,  
1708 dimensionless), effective porosity ( $\Phi_E$ , dimensionless) and bulk density ( $Bd$ ,  $\text{g cm}^{-3}$ )  
1709 were calculated as follows :

$$\Phi_T = 1 - \left[ \frac{\left( \frac{W2}{\rho_{peat}} \right)}{V} \right] \quad (5.4)$$

$$\Phi_R = 1 - \left[ \frac{\left( \frac{(W1-W2)}{\rho_{peat}} \right)}{V} \right] \quad (5.5)$$

$$\Phi_E = \Phi_T - \Phi_R \quad (5.6)$$

$$Bd = \frac{W2}{V} \quad (5.7)$$

<sub>1710</sub> Peat density ( $\rho_{peat}$ ) was set at 1.45 according to [Kennedy et Price \(2005\)](#). Then  
<sub>1711</sub> the peat was crushed and C, H, N and S analyses were performed with an elemental  
<sub>1712</sub> analyser (Thermo Flash analyser).

<sub>1713</sub> 5.2 Résultats

<sub>1714</sub> 5.2.1 Température de l'air et variabilité de RE

<sub>1715</sub> Mean surface air temperatures were about 14-15 °C for all sites, except for LGT  
<sub>1716</sub> which was  $20.8 \pm 7.4$  °C, (Figure 5.1 – H). The lowest mean temperature and amplitude  
<sub>1717</sub> were found at BDZ :  $14.4 \pm 3.3$  °C (Figure 5.1 – E). In LDM and FRN, the mean surface  
<sub>1718</sub> air temperatures were respectively  $14.9 \pm 8.7$  °C and  $15.0 \pm 10.3$  °C (Figure 5.1 – F,  
<sub>1719</sub> G) Surface air temperature was the highest in FRN.

<sub>1720</sub> At -5 cm depth, BDZ and LGT had lower mean temperatures than at the surface :  
<sub>1721</sub>  $14.1 \pm 1.5$  °C and  $20.3 \pm 1.7$  °C respectively, whereas the opposite was observed in FRN  
<sub>1722</sub> and LDM with  $16.3 \pm 2.4$  °C and  $15.9 \pm 1.0$  °C respectively. Mean soil temperatures  
<sub>1723</sub> were still higher at -10 cm for both sites, but only in LDM at -20 cm. At -30 cm  
<sub>1724</sub> the soil temperature amplitude ranged from 0.2 in LDM to 0.6 in LGT and FRN.  
<sub>1725</sub> Overall conditions were warmer in LGT than in the other sites and LDM, despite a  
<sub>1726</sub> large amplitude of surface air temperature, had a particularly low soil temperature  
<sub>1727</sub> amplitude.




FIGURE 5.1 – Ecosystem Respiration (ER), air and peat temperature, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT).

1728 In terms of ER, mean and variability were the lowest in FRN among all sites ( $1.75 \pm 0.83 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , Figure 5.1 – B). The highest variability and mean ER ( $6.13 \pm 2.81 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ , Figure 5.1 – C) were observed in LDM. On this site replicates had different behaviours even though they were close to each other and in a similar environment. In BDZ and LGT, ER mean values were  $3.12 \pm 0.92$  and  $4.10 \pm 1.15 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  respectively (Figure 5.1 – A, B)

### 1734 5.2.2 Synchronisation RE et température du sol

1735 Figure 5.1 shows that the deeper the temperature was measured, the greater the shift with respect to ER. Taking this shift into account by synchronising soil temperatures with ER led to a significant positive linear correlation between the temperature

## 5.2. Résultats

measurement depth and the synchronisation time-delay (all sites pooled,  $R^2=0.94$ ,  $p<0.001$ ; Figure 5.2). The range of estimated time-delays decreased with depth up to -20 cm. At this depth the time-delay was 12 hours, i.e. a phase inversion on a daily timescale. For the three sites other than LDM, the slopes of the time-delay and measurement depth relationship were in a close range : 0.56, 0.54, 0.52 for FRN, BDZ and LGT respectively. The relationship for LDM was higher at -30 cm, leading to a steeper slope (0.66) than in the other sites (Figure 5.2). At the other depths, this site always had the highest time-delay, though the values were close to those of the other sites. BDZ always had the lowest time-delay, but like LDM, the values were close to those of the other sites, although slightly lower at -5 cm depth.




FIGURE 5.2 – Time delay between temperature at different depths and ER, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT)

### 5.2.3 Équations utilisées

For both types of model (using non-synchronised and synchronised data), the differences between the 3 tested models were very small. The greatest differences, in  $R^2$  values, were 0.07 and 0.05 for non-synchronised and synchronised data respectively,

Tableau 5.1 –  $R^2$  and NRMSE profile with depth for models using non-synchronised and synchronised data and for the three equations (linear : lin, exponential : exp, arrhenius : arr).

depth	Non-synchronised						Synchronised					
	lin $R^2$	NRMSE	exp $R^2$	NRMSE	arr $R^2$	NRMSE	lin $R^2$	NRMSE	exp $R^2$	NRMSE	arr $R^2$	
Bernadouze												
0	0.22	25.88	0.19	26.09	0.19	26.09	0.22	25.88	0.19	26.09	0.19	
-5	0.23	25.66	0.20	25.89	0.20	25.89	0.27	25.18	0.24	25.40	0.24	
-10	0.02	28.92	0.03	29.26	0.03	29.26	0.23	25.72	0.22	25.90	0.22	
-20	0.04	28.64	0.03	28.98	0.03	28.98	0.13	27.79	0.13	28.16	0.13	
-30	0.02	28.93	0.02	29.28	0.02	29.28	0.05	29.54	0.05	29.92	0.05	
Frasne												
0	0.66	27.58	0.63	26.74	0.63	26.96	0.66	27.58	0.63	26.74	0.63	
-5	0.19	42.34	0.21	43.00	0.21	43.01	0.68	26.34	0.68	25.02	0.68	
-10	0.01	46.73	0.00	48.01	0.00	48.01	0.59	29.98	0.60	29.20	0.60	
-20	0.34	38.29	0.27	38.78	0.27	38.77	0.34	38.05	0.36	39.17	0.36	
-30	0.03	46.30	0.03	47.47	0.03	47.47	0.18	43.66	0.19	44.75	0.19	
Landemarais												
0	0.29	38.55	0.32	39.31	0.32	39.24	0.29	38.55	0.32	39.31	0.32	
-5	0.03	45.18	0.04	46.06	0.04	46.07	0.21	40.63	0.25	41.58	0.25	
-10	0.05	44.53	0.04	45.45	0.04	45.45	0.13	42.65	0.16	43.71	0.16	
-20	0.09	43.75	0.08	44.55	0.08	44.55	0.09	43.83	0.12	44.97	0.12	
-30	0.03	45.09	0.02	46.07	0.02	46.07	0.13	44.94	0.12	46.02	0.12	
La Guette												
0	0.61	17.44	0.56	17.30	0.56	17.34	0.61	17.44	0.56	17.30	0.56	
-5	0.31	23.27	0.29	23.24	0.28	23.26	0.63	16.83	0.59	16.49	0.58	
-10	0.08	26.89	0.07	27.09	0.07	27.10	0.61	17.21	0.57	16.84	0.57	
-20	0.30	23.41	0.27	23.30	0.27	23.30	0.54	18.93	0.51	19.01	0.51	
-30	0.12	26.25	0.11	26.37	0.11	26.37	0.39	22.18	0.36	22.26	0.36	

whereas differences in NRMSE maximum values were 1.28 and 1.14 (Table 5.1). In most cases the linear model led to a slightly better  $R^2$  than the others. As the differences between equations were small, however, we will describe the exponential model in the following sections, because (i) it is the most widely used model to describe the ER–temperature relationship and (ii) the  $Q_{10}$  value can be derived from this equation. This will allow the comparison of the results of our study to others.

#### 5.2.4 Relation entre RE et la température

The relationship between air temperature and ER, using the exponential model, was better in LGT and FRN ( $R^2 > 0.55$ ) than in LDM and LDM ( $R^2 < 0.35$ ) (Table 5.1). Nevertheless in all sites and with both linear and exponential models, using synchronised soil temperatures gave a better account of the ER variability than their non-synchronised counterparts (Figure 5.3). The goodness of fit ( $R^2$ ) increased on average by 0.26 to 0.35 at -5 cm and -10 cm depth respectively. The degree of improvement

## 5.2. Résultats

---

varied however between sites. For instance, at -5 cm depth  $R^2$  between synchronised and non-synchronised models increased by only 0.04 in BDZ while it increased by 0.47 in FRN. The improvement gained by using synchronised data was higher at -5 cm and -10 cm than at deeper layers, with 0.12, 0.11 on average for -20 and -30 cm depth (Figure 5.3).

A similar observation can be made for NRMSE. Regardless of some exceptions at deeper layers especially at -20 cm depth, the NRMSE values show that using synchronised data rather than non-synchronised ones improved the representation of ER variability at a daily timescale, indicating that depth measurements dependence is smaller for models using synchronised data than for models using non-synchronised data. However with increasing depth  $R^2$  values still decreased and NRMSE values still increased. For FRN, LDM and LGT, synchronised data at -5 cm depth gave a better account of the ER variability than surface air temperature (Figure 5.3). This was not the case in LDM, where temperature at the surface was the best descriptor of ER. For both  $R^2$  and NRMSE the values at -20 cm depth were better than those observed at -10 or -30 cm depth. This pattern was observed with different magnitudes among sites, and was particularly visible in FRN and LGT. For the most part, the synchronisation of data led to higher  $R^2$  and NRMSE values for models using one soil temperature, at a daily scale on *sphagnum*-dominated peatlands.

### 5.2.5 Évolution du Q<sub>10</sub>

The Q<sub>10</sub> stood between 0 and 2.5 for non-synchronised data with a maximum at -5 cm depth. Average values were 1.4, 2.4 and 1.3, at the surface, -5 and -10 cm depth respectively (Figure 5.4). Average Q<sub>10</sub> values at the surface and -10 cm depth were very similar. However there was much more variability at -10 cm depth, where the values ranged from 0.1 to 2.1, than at the surface where the values stood between 1.3 and 1.5. Beyond -10 cm depth Q<sub>10</sub> values fell almost to 0, while for non-synchronised data Q<sub>10</sub> values greatly increased with depth, reaching meaningless values. Q<sub>10</sub> values estimated with surface temperature were very similar between sites with an average of




FIGURE 5.3 – Profile of  $R^2$  and NRMSE, (RMSE, normalized by the mean), with depth, in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT) using the exponential model.

### **5.3. Discussion**

---

1793 1.4 (Figure 5.4). It increased to about 2.5 at -5 cm depth, with both synchronised and  
1794 non-synchronised data. Below this depth,  $Q_{10}$  estimated with both methods either de-  
1795 creased downwards (non-synchronised) or increased (synchronised data) to unrealistic  
1796 values (Figure 5.4).

#### **1797 5.2.6 Différence entre mesures de jour et de nuit**

1798 For BDZ and LDM sites no significant differences were found between daytime and  
1799 nighttime data no matter which model was used, whereas differences were found for  
1800 FRN and LGT (Figure 5.5). In FRN, synchronisation increased the significance of the  
1801 differences :  $p < 0.001$  with and  $p < 0.01$  without synchronisation respectively. The  
1802 same pattern was found in LGT but with lower significance. Hence models using -5  
1803 cm depth with non-synchronised data are not significantly different but those using  
1804 synchronised data are. Note that, for LGT, the model using air temperature had a  
1805 daytime slope that was higher than the nighttime one, which was the opposite of all  
1806 the other cases.

#### **1807 5.2.7 Caractérisation de la tourbe**

1808 Elemental compositions were similar in all sites : 1–3%, 4–6% and <1% for N, H  
1809 and S respectively (Table 5.2). C content was mainly between 40 and 50 %, except at  
1810 the deeper levels in LDM and LGT where values were lower (< 32%).

## **1811 5.3 Discussion**

### **1812 5.3.1 Différence de RE entre les différents sites**

1813 The ER fluxes calculated in the 4 sites were in the same order of magnitude as those  
1814 of peatlands found in the literature. [Bortoluzzi \*et al.\* \(2006\)](#), for instance, found ER  
1815 values ranging from 2 to 5 during the same period as this study, i.e. July to October




FIGURE 5.4 – Profile of  $Q_{10}$  with depth for synchronised (white) and non synchronised (black) data and exponential model in the 4 sites (Bernadouze : BDZ, Frasne : FRN, Landemarais : LDM, La Guette : LGT).




FIGURE 5.5 – Differences between daytime and nighttime measurements using 3 models : non-synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – NS), synchronised data at -5 cm depth temperature (T5 – S), and non-synchronised data at air temperature (Tair).

Tableau 5.2 – Peat chemical properties as a function of depth in cm : content (%) N, C, H, S, the total, retention and effective porosity,  $\Phi_T$ ,  $\Phi_R$ ,  $\Phi_E$  respectively in  $m^3.m^{-3}$ , solid peat volumic fraction in  $m^3.m^{-3}$  and the bulk density (Bd) in  $g.cm^{-3}$ .

level	N	C	H	S	$\Phi_T$	$\Phi_R$	$\Phi_E$	solid	Bd
<b>Bernadouze</b>									
0–5	1.76	41.84	6.05	0.05	0.99	0.47	0.52	0.01	0.03
5–10	1.99	43.99	6.18	0.07	0.97	0.78	0.19	0.03	0.06
10–15	2.28	45.38	6.35	0.1	0.96	0.92	0.04	0.04	0.10
15–20	2.92	44.95	6.23	0.23	0.95	0.82	0.13	0.05	0.11
20–25	3.14	39.01	5.31	0.23	0.93	0.90	0.04	0.07	0.16
25–30	2.50	31.15	4.28	0.13	0.89	0.86	0.03	0.11	0.24
<b>Frasne</b>									
0–5	1.73	43.67	6.24	0.00	0.99	0.40	0.58	0.01	0.03
5–10	1.55	43.35	5.97	0.00	0.98	0.59	0.40	0.02	0.03
10–15	1.69	43.49	6.17	0.00	0.98	0.89	0.09	0.02	0.05
15–20	1.63	43.06	5.97	0.00	0.98	0.89	0.09	0.02	0.05
20–25	1.30	43.68	6.29	0.05	0.98	0.93	0.04	0.02	0.05
25–30	1.48	43.44	6.21	0.03	0.98	0.87	0.11	0.02	0.05
<b>Landemarais</b>									
0–5	1.36	45.63	5.69	0.25	0.97	0.62	0.35	0.03	0.07
5–10	3.08	47.37	5.37	0.09	0.95	0.74	0.21	0.05	0.11
10–15	2.73	48.34	5.63	0.10	0.94	0.94	0.00	0.06	0.13
15–20	2.54	48.67	5.64	0.30	0.96	0.81	0.15	0.04	0.10
20–25	2.08	46.99	5.80	0.23	0.97	0.89	0.08	0.03	0.07
25–30	1.57	45.65	6.23	0.21	0.97	0.89	0.08	0.03	0.07
<b>La Guette</b>									
0–5	1.55	38.33	5.23	0.05	0.97	0.61	0.36	0.03	0.05
5–10	2.35	41.31	4.66	0.20	0.93	0.83	0.10	0.07	0.08
10–15	2.34	43.81	5.72	0.18	0.91	0.89	0.02	0.09	0.10
15–20	1.99	43.17	5.45	0.10	0.89	0.87	0.01	0.11	0.13
20–25	1.90	37.91	4.83	0.05	0.88	0.83	0.05	0.12	0.15
25–30	1.32	18.95	2.32	0.01	0.79	0.76	0.03	0.21	0.28

### 5.3. Discussion

---

2004. In the present study, the models performed poorly in 2 sites, BDZ and LDM. For  
BDZ, amplitudes of both ER and temperatures were low (Figure 5.1 – A, E) making  
the representation of ER possible only on a short temperature span. With such low  
ranges of both ER and temperature, it can be assumed that ER variability was due  
to the variability between plots. For LDM, the ER fluxes were measured in plots that  
were more heterogeneous than expected, resulting in strong variability (Figure 5.1 –  
C). This observation is consistent with the high NRMSE value calculated for this site  
(39.3 % for BDZ against 26.1 % for LDM) whereas the  $R^2$  values for these two sites  
were close, 0.19 and 0.32 for BDZ and LDM respectively, using surface air temperature  
and an exponential relationship. It is noteworthy that in FRN the NRMSE values were  
high with respect to  $R^2$  values. This result can be explained by the fact that the mean  
ER flux was low ( $1.75 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ) and thus had a strong influence on NRMSE as  
we used mean normalization. Finally at -20 cm depth, models using non-synchronised  
data showed, an increase in  $R^2$  and a decrease in NRMSE which was more or less  
observable in the different sites : clearly in FRN, LGT and to a lesser extent in LDM,  
but barely perceivable in BDZ. At this depth the temperature and the ER signal phases  
are opposed making the non-synchronised models better at representing ER than at -10  
or -30 centimetres but with a reverse relationship. The ER fluxes thus show different  
behaviours either in their amplitude or in their homogeneity

#### 5.3.2 Temps de latence entre température et RE

Time-delays between soil temperatures and ER occur in *Sphagnum*-dominated peat-  
lands. They occur even close to the soil surface and increase with depth. The relation-  
ship between time-delays and depth was similar in all the studied sites although LDM  
had slightly higher time-delays. The overall delay observed in peat soils, 0.57 hours  
per centimetre, was higher than those found by [Pavelka \*et al.\* \(2007\)](#) in a forest and  
[Parkin et Kaspar \(2003\)](#) on two agricultural soils (0.4  
and 0.5 hours per centimetre respectively). This is coherent with the fact that peat soil  
has a lower thermal diffusivity than mineral soils ([Farouki, 1981; Arya, 2001](#)). LDM

1844 was the only site with a slightly higher slope especially at -30 cm. This was expected  
1845 as soil diffusivity increases with wetness (Hillel, 2003) and LDM was the site with the  
1846 lowest water table level. This was confirmed by thermal conductivity measurements  
1847 conducted on the peat cores (data not shown). Overall, it should be noted that the  
1848 time-delays were similar in all the studied sites despite their variability in terms of ER  
1849 fluxes.

1850 **5.3.3 La synchronisation entre RE et la température améliore**  
1851 **la représentation de la sensibilité de RE à la température**

1852 In spite of the importance of lags between physical phenomena and biological  
1853 activities (Vargas *et al.*, 2010), few studies have addressed the effect of time-delays bet-  
1854 ween soil temperature and global biological activity (ER) at the daily timescale. At this  
1855 scale, we showed in peatlands that using synchronised data improved the representation  
1856 of the temperature sensitivity of ER. The improvement provided by synchronisation  
1857 was evidenced at shallow depth. The best goodness-of-fit obtained with synchronised  
1858 data and models using one temperature, was found at -5 cm depth. These observations  
1859 are in agreement with those of Pavelka *et al.* (2007) who also found a decreasing ef-  
1860 fect of synchronisation with depth. Such a lesser depth effect could be explained by  
1861 a simultaneous decrease in temperature amplitude. Because the goodness-of-fit of the  
1862 non-synchronised data increases at -20 cm, the synchronisation effect strongly decreases  
1863 at this depth. This pattern is visible, with various amplitudes, in the different sites.  
1864 It is explained by the 12 h time-delay (Figure 5.2) corresponding to a phase inversion  
1865 that occurs at this depth between the ER and the daily temperature courses. Such a  
1866 phase inversion was found deeper, at -30 cm by Pavelka *et al.* (2007), due to a higher  
1867 temperature diffusivity in mineral soils. Finally in our study these models, using syn-  
1868 chronised -5 cm depth temperature, show slightly higher  $R^2$  and lower NRMSE values  
1869 than those using surface air temperature.

1870 **5.3.4 Différence entre mesure de RE faite le jour et la nuit**

1871 The significant differences observed between daytime and nighttime measurements  
1872 corroborate other studies in which these differences were found using chamber tech-  
1873 niques ([Juszczak et al., 2012](#); [Darenova et al., 2014](#)). The fact that some sites show  
1874 significant differences (FRN and LGT) and not others (BDZ and LDM) seems to be  
1875 linked to the variability between plots and temperature amplitude. When temperature  
1876 amplitude was low, most of the variability originated from spatial variability between  
1877 plots. This was also corroborated by a test done on LGT where we calculated the day  
1878 and night differences only on the last two days when temperature amplitude was the  
1879 greatest. As a result the significance increased from  $p < 0.05$  to  $p < 0.01$  for the syn-  
1880 chronised model using -5 cm depth temperature and the differences observed in the  
1881 model using air temperature were no longer significant any more ( $p > 0.05$ ).

1882 **5.3.5 La sensibilité du Q<sub>10</sub> à la profondeur de la température  
1883 et à la synchronisation**

1884 In shallow layers ( $\leq 10$  cm), the  $Q_{10}$  values calculated with non-synchronised data  
1885 in the ranges that are usually reported, i.e. between 1.3 to 3.3 ([Raich et Schlesinger,](#)  
1886 [1992](#)). At deeper levels in the peat profile ( $\geq 10$  cm), they reach 0 as the relationship  
1887 between ER and the temperature weakens, and is not compensated by a long term  
1888 evolution. A similar behaviour was found by [Pavelka et al. \(2007\)](#) even if this  $Q_{10}$   
1889 decrease with depth is not usually seen and most studies show the opposite, namely  
1890 an increase in  $Q_{10}$  values with depth ([Graf et al., 2008](#)). This apparent contradiction  
1891 may be explained by the length of the study. Because of its short duration, the effect of  
1892 the time-delays on ER were preponderant over the temperature effect. Synchronisation  
1893 also led to meaningless high  $Q_{10}$  values because synchronisation can explain a higher  
1894 proportion of ER flux with a smaller temperature variation. Temperature amplitude  
1895 decreases with depth because of soil dampening.

## <sup>1896</sup> 5.4 Conclusions

<sup>1897</sup> We showed that the time-delays between ER and soil temperatures at different  
<sup>1898</sup> depths are significant on a daily timescale as the signals are shifted 30 minutes every  
<sup>1899</sup> centimetre. At this scale the use of synchronised soil temperature, to take into account  
<sup>1900</sup> these time-delays, can improve the representation of ER particularly in the first 10  
<sup>1901</sup> centimetres. Only one of the studied sites showed highly significant differences between  
<sup>1902</sup> daytime and nighttime measurements. However it is possible that such differences exist  
<sup>1903</sup> in the other sites, depending on the environmental conditions (e.g. temperature am-  
<sup>1904</sup> plitude) and spatial variability in the ER fluxes. Addressing questions of bio-physical  
<sup>1905</sup> coupling in determining ER at different timescales requires high frequency observations  
<sup>1906</sup> ([Vargas \*et al.\*, 2011](#)). Even if the automated chamber technique is increasingly used, it  
<sup>1907</sup> cannot be easily deployed in some sites due to tall vegetation, power supply difficulties,  
<sup>1908</sup> or harsh environmental conditions. In contrast, temperature measurements at different  
<sup>1909</sup> depths are easy to conduct, robust to harsh conditions and can be powered by a small  
<sup>1910</sup> solar panel. A calibration campaign with human manipulated closed chambers could be  
<sup>1911</sup> carried out to assess ER variability at different timescales. Coupling temperature pro-  
<sup>1912</sup> file and punctual ER measurements and then using synchronised data in models may  
<sup>1913</sup> be a good alternative in sites where automated chambers are not easily implantable.



<sup>1914</sup> Synthèse et perspectives

## 5.5. Bilan du bilan (de C) ?

<sub>1915</sub> schéma conceptuel ? Modèles globaux (ORCHID, chloée)

## <sub>1916</sub> 5.5 Bilan du bilan (de C) ?

<sub>1917</sub> Flux fort

<sub>1918</sub> sensibilité param forte

<sub>1919</sub> Modèles multi annuel et prise en compte de la végétation

<sub>1920</sub> Quid des variations journalières dans un bilan annuel ?

<sub>1921</sub> Les prendre en compte améliorerait-il les modèles

<sub>1922</sub> modèles globaux ? **limitations deséquations** : Plus généralement, la majorité des  
<sub>1923</sub> tourbières sont sous la neige une partie de l'année, ce qui n'arrive que rarement sur  
<sub>1924</sub> la tourbière de La Guette et une partie possède également des zones d'eau libre, qui  
<sub>1925</sub> n'existent pas sur ce site.

<sub>1926</sub> modèles globaux et profondeur de tourbe

## <sub>1927</sub> 5.6 Résilience de la tourbe par rapport aux

<sub>1928</sub> 2 années sèches qui précèdent le BdC

<sub>1929</sub> (lien chap 3 et 4)

## <sub>1930</sub> 5.7 Ouverture vers d'autre méthodes de me-

<sub>1931</sub> sures

<sub>1932</sub> — chambre automatique (lien chap 5, et chap 3 ?)

<sub>1933</sub> — tour eddy covariance (lien chap 5 et chap 3 ?)

# <sup>1934</sup> Bibliographie

- <sup>1935</sup> AERTS, R. et LUDWIG, F. (1997). Water-table changes and nutritional status affect trace gas emissions from laboratory columns of peatland soils. *Soil Biology and Biochemistry*, 29(11–12):1691–1698.
- <sup>1938</sup> ALM, J., TALANOV, A., SAARNIO, S., SILVOLA, J., IKKONEN, E., AALTONEN, H., NYKÄNEN, H. et MARTIKAINEN, P. J. (1997). Reconstruction of the carbon balance for microsites in a boreal oligotrophic pine fen, Finland. *Oecologia*, 110:423–431.
- <sup>1941</sup> ANDREJKO, M. J., FIENE, F. et COHEN, A. D. (1983). Comparison of ashing techniques for determination of the inorganic content of peats. In *Testing of Peats and Organic Soils : A Symposium*, volume 820, pages 5–10. ASTM International.
- <sup>1944</sup> ARCHER, D., EBY, M., BROVKIN, V., RIDGWELL, A., CAO, L., MIKOŁAJEWICZ, U., CALDEIRA, K., MATSUMOTO, K., MUNHOVEN, G., MONTENEGRO, A. et OTHERS (2009). Atmospheric lifetime of fossil fuel carbon dioxide. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 37(1):117.
- <sup>1948</sup> ARYA, S. P. (2001). *Introduction to Micrometeorology*, volume 79 de *International Geophysics Series*. Academic Press.
- <sup>1950</sup> AURELA, M., RIUTTA, T., LAURILA, T., TUOVINEN, J.-P., VESALA, T., TUITTILA, E.-S., RINNE, J., HAAPANALA, S. et LAINE, J. (2007). CO<sub>2</sub> exchange of a sedge fen in southern Finland—the impact of a drought period. *Tellus B*, 59(5):826–837.
- <sup>1953</sup> BALLANTYNE, D. M., HRIBLJAN, J. A., PYPKER, T. G. et CHIMNER, R. A. (2014). Long-term water table manipulations alter peatland gaseous carbon fluxes in northern Michigan. *Wetlands Ecol. Manage.*, 22(1):35–47.
- <sup>1956</sup> BATJES, N. H. (1996). Total carbon and nitrogen in the soils of the world. *Eur. J. Soil Sci.*, 47(2):151–163.
- <sup>1958</sup> BEER, C., REICHSTEIN, M., TOMEILLERI, E., CIAIS, P., JUNG, M., CARVALHAIS, N., RÖDENBECK, C., ARAIN, M. A., BALDOCCHI, D., BONAN, G. B., BONDEAU, A., CESCATTI, A., LASSLOP, G., LINDROTH, A., LOMAS, M., LUSSAERT, S., MARGOLIS, H., OLESON, K. W., ROUPSARD, O., VEENENDAAL, E., VIOVY, N., WILLIAMS, C., WOODWARD, F. I. et PAPALE, D. (2010). Terrestrial Gross Carbon Dioxide Uptake : Global Distribution and Covariation with Climate. *Science*, 329(5993):834–838.
- <sup>1964</sup> BELLISARIO, L. M., BUBIER, J. L., MOORE, T. R. et CHANTON, J. P. (1999). Controls on CH<sub>4</sub> emissions from a northern peatland. *Global Biogeochemical Cycles*, 13(1):81–91.
- <sup>1967</sup> BLODAU, C. (2002). Carbon cycling in peatlands. A review of processes and controls. *Environmental Reviews*, 10(2):111–134.

- 1969 BLODAU, C., BASILIKO, N. et MOORE, T. R. (2004). Carbon turnover in peatland  
1970 mesocosms exposed to different water table levels. *Biogeochemistry*, 67(3):331–351.
- 1971 BOND-LAMBERTY, B. et THOMSON, A. (2010). Temperature-associated increases in  
1972 the global soil respiration record. *Nature*, 464(7288):579–582.
- 1973 BORTOLUZZI, E., EPRON, D., SIEGENTHALER, A., GILBERT, D. et BUTTLER, A.  
1974 (2006). Carbon balance of a European mountain bog at contrasting stages of re-  
1975 generation. *New Phytol.*, 172(4):708–718.
- 1976 BUBIER, J., COSTELLO, A., MOORE, T. R., ROULET, N. T. et SAVAGE, K. (1993).  
1977 Microtopography and methane flux in boreal peatlands, northern Ontario, Canada.  
1978 *Canadian Journal of Botany*, 71(8):1056–1063.
- 1979 BUBIER, J. L., BHATIA, G., MOORE, T. R., ROULET, N. T. et LAFLEUR, P. M. (2003).  
1980 Spatial and Temporal Variability in Growing-Season Net Ecosystem Carbon Dioxide  
1981 Exchange at a Large Peatland in Ontario, Canada. *Ecosystems*, 6:353–367.
- 1982 BUBIER, J. L., CRILL, P. M., MOORE, T. R., SAVAGE, K. et VARNER, R. K. (1998).  
1983 Seasonal patterns and controls on net ecosystem CO<sub>2</sub> exchange in a boreal peatland  
1984 complex. *Global Biogeochemical Cycles*, 12(4):703–714.
- 1985 BUBIER, J. L., MOORE, T. R., BELLISARIO, L., COMER, N. T. et CRILL, P. M. (1995).  
1986 Ecological controls on methane emissions from a Northern Peatland Complex in the  
1987 zone of discontinuous permafrost, Manitoba, Canada. *Global Biogeochemical Cycles*,  
1988 9(4):455–470.
- 1989 BUCKLAND, P. C. (1993). Peatland archaeology : a conservation resource on the edge  
1990 of extinction. *Biodivers. Conserv.*, 2(5):513–527.
- 1991 CAI, T., FLANAGAN, L. B. et SYED, K. H. (2010). Warmer and drier conditions  
1992 stimulate respiration more than photosynthesis in a boreal peatland ecosystem :  
1993 Analysis of automatic chambers and eddy covariance measurements. *Plant Cell  
1994 Environ.*, 33(3):394–407.
- 1995 CHAPMAN, S., BUTTLER, A., FRANCEZ, A.-J., LAGGOUN-DÉFARGE, F., VASANDER,  
1996 H., SCHLOTER, M., COMBE, J., GROSVERNIER, P., HARMS, H., EPRON, D. et  
1997 OTHERS (2003). Exploitation of northern peatlands and biodiversity maintenance :  
1998 a conflict between economy and ecology. *Front. Ecol. Environ.*, 1(10):525–532.
- 1999 CHRISTENSEN, J. H., HEWITSON, B., BUSUIOC, A., CHEN, A., GAO, X., HELD, R.,  
2000 JONES, R., KOLLI, R. K., KWON, W. K., LAPRISE, R. et OTHERS (2007). Regional  
2001 climate projections. *Clim. Change 2007 Phys. Sci. Basis Contrib. Work. Group  
2002 Fourth Assess. Rep. Intergov. Panel Clim. Change Univ. Press Camb. Chapter 11,*  
2003 pages 847–940.
- 2004 CHRISTENSEN, J. H., KANIKICHLARLA, K. K., MARSHALL, G. et TURNER, J. (2013).  
2005 Climate phenomena and their relevance for future regional climate change.
- 2006 CIAIS, P., SABINE, C., BALA, G., BOPP, L., BROVKIN, V., CANADELL, J., CHHABRA,  
2007 A., DEFRIES, R., GALLOWAY, J., HEIMANN, M. et OTHERS (2014). Carbon and  
2008 other biogeochemical cycles. In *Climate Change 2013 : The Physical Science Basis*.

- 2009 Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pages 465–570. Cambridge University Press.
- 2010
- 2011 CLYMO, R. S., TURUNEN, J. et TOLONEN, K. (1998). Carbon accumulation in peatland. *Oikos*, pages 368–388.
- 2012
- 2013 COLMER, T. D. (2003). Long-distance transport of gases in plants : a perspective on internal aeration and radial oxygen loss from roots. *Plant Cell Environ.*, 26(1):17–36.
- 2014
- 2015 CORNELISSEN, J. H., LANG, S. I., SOUDZILOVSKAIA, N. A. et DURING, H. J. (2007).
- 2016 Comparative cryptogam ecology : a review of bryophyte and lichen traits that drive biogeochemistry. *Ann. Bot.*, 99(5):987–1001.
- 2017
- 2018 CROW, S. E. et WIEDER, R. K. (2005). Sources of CO<sub>2</sub> emission from a northern peatland : root respiration, exudation, and decomposition. *Ecology*, 86(7):1825–1834.
- 2019
- 2020 CURIEL YUSTE, J., JANSSENS, I. A., CARRARA, A. et CEULEMANS, R. (2004). Annual Q<sub>10</sub> of soil respiration reflects plant phenological patterns as well as temperature sensitivity. *Global Change Biol.*, 10(2):161–169.
- 2021
- 2022
- 2023 DARENOVA, E., PAVELKA, M. et ACOSTA, M. (décembre 2014). Diurnal deviations in the relationship between CO<sub>2</sub> efflux and temperature : A case study. *CATENA*, 123:263–269.
- 2024
- 2025
- 2026 DAVIDSON, E. A., JANSSENS, I. A. et LUO, Y. (2006). On the variability of respiration in terrestrial ecosystems : moving beyond Q<sub>10</sub>. *Global Change Biol.*, 12(2):154–164.
- 2027
- 2028 DINSMORE, K. J., SKIBA, U. M., BILLETT, M. F. et REES, R. M. (2009). Effect of water table on greenhouse gas emissions from peatland mesocosms. *Plant Soil*, 318(1-2):229–242.
- 2029
- 2030
- 2031 ESWARAN, H., VAN DEN BERG, E. et REICH, P. (1993). Organic carbon in soils of the world. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 57(1):192–194.
- 2032
- 2033 FANG, C. et MONCRIEFF, J. (2001). The dependence of soil CO<sub>2</sub> efflux on temperature. *Soil Biol. Biochem.*, 33(2):155–165.
- 2034
- 2035 FAROUKI, O. (1981). *Thermal properties of soils*. Series on rock and soil mechanics. Trans Tech Pub., Rockport, MA.
- 2036
- 2037 FARQUHAR, G. D., VON CAEMMERER, S. et BERRY, J. A. (1980). A biochemical model of photosynthetic CO<sub>2</sub> assimilation in leaves of C<sub>3</sub> species. *Planta*, 149(1):78–90.
- 2038
- 2039 FRANCEZ, A.-J. (2000). La dynamique du carbone dans les tourbières à Sphagnum, de la sphaine à l'effet de serre. *L'Année Biologique*, 39:205–270.
- 2040
- 2041 FROLKING, S., TALBOT, J., JONES, M. C., TREAT, C. C., KAUFFMAN, J. B., TUITTILA, E.-S. et ROULET, N. (2011). Peatlands in the Earth's 21st century climate system. *Environ. Rev.*, 19(NA):371–396.
- 2042
- 2043
- 2044 GIRARD, M. C., WALTER, C., REMY, J. C., BERTHELIN, J. et MOREL, J. L. (2011). *Sols et Environnement*, (2e édn), volume 28 de *Sciences Sup.* Editions Dunod : Paris, Vottem, Belgique, 2nd édition édition.
- 2045
- 2046

- 2047 GOGO, S., GUIMBAUD, C., LAGGOUN-DÉFARGE, F., CATOIRE, V. et ROBERT, C.  
2048 (2011). In situ quantification of CH<sub>4</sub> bubbling events from a peat soil using a new  
2049 infrared laser spectrometer. *Journal of Soils and Sediments*, 11:545–551.
- 2050 GORHAM, E. (1991). Northern Peatlands : Role in the Carbon Cycle and Probable  
2051 Responses to Climatic Warming. *Ecol. Appl.*, 1(2):182–195.
- 2052 GÖRRES, C. M., KUTZBACH, L. et ELSGAARD, L. (2014). Comparative modeling of  
2053 annual CO<sub>2</sub> flux of temperate peat soils under permanent grassland management.  
2054 *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 186:64–76.
- 2055 GRAF, A., WEIHERMÜLLER, L., HUISMAN, J. A., HERBST, M., BAUER, J. et VEREE-  
2056 CKEN, H. (2008). Measurement depth effects on the apparent temperature sensitivity  
2057 of soil respiration in field studies. *Biogeosciences*, 5(3):1867–1898.
- 2058 GUIMBAUD, C., CATOIRE, V., GOGO, S., ROBERT, C., CHARTIER, M., LAGGOUN-  
2059 DÉFARGE, F., GROSSEL, A., ALBÉRIC, P., POMATHIOD, L., NICOUILLAUD, B. et  
2060 RICHARD, G. (2011). A portable infrared laser spectrometer for flux measurements  
2061 of trace gases at the geosphere-atmosphere interface. *Measurement Science & Tech-*  
2062 *nology*, 22(7):1–17.
- 2063 GUNNARSSON, U. (2005). Global patterns of Sphagnum productivity. *Journal of*  
2064 *Bryology*, 27(3):269–279.
- 2065 GÜNTHER, A., HUTH, V., JURASINSKI, G. et GLATZEL, S. (2014). The effect of bio-  
2066 mass harvesting on greenhouse gas emissions from a rewetted temperate fen. *GCB*  
2067 *Bioenergy*, pages n/a–n/a.
- 2068 HARRIS, D. C. (2010). Charles David Keeling and the Story of Atmospheric CO<sub>2</sub>  
2069 Measurements†. *Anal. Chem.*, 82(19):7865–7870.
- 2070 HILLEL, D. (2003). Soil temperature and heat flow. In *Introduction to Environmental*  
2071 *Soil Physics*. Academic Press. {DOI :10.1016/B978-012348655-4/50013-7}.
- 2072 HOBBIE, S. E. (1996). Temperature and plant species control over litter decomposition  
2073 in Alaskan tundra. *Ecol. Monogr.*, 66(4):503–522.
- 2074 ISE, T., DUNN, A. L., WOFSY, S. C. et MOORCROFT, P. R. (2008). High sensitivity of  
2075 peat decomposition to climate change through water-table feedback. *Nat. Geosci.*,  
2076 1(11):763–766.
- 2077 JACOBS, C. M. J., JACOBS, A. F. G., BOSVELD, F. C., HENDRIKS, D. M. D., HENSEN,  
2078 A., KROON, P. S., MOORS, E. J., NOL, L., SCHRIER-UIJL, A. et VEENENDAAL, E. M.  
2079 (2007). Variability of annual CO<sub>2</sub> exchange from Dutch grasslands. *Biogeosciences*,  
2080 4(5):803–816.
- 2081 JOABSSON, A., CHRISTENSEN, T. R. et WALLÉN, B. (1999). Vascular plant controls  
2082 on methane emissions from northern peatforming wetlands. *Trends in Ecology &*  
2083 *Evolution*, 14(10):385–388.
- 2084 JONES, M. C. et YU, Z. (2010). Rapid deglacial and early Holocene expansion of  
2085 peatlands in Alaska. *PNAS*, 107(16):7347–7352.

- 2086 JOOS, F., ROTH, R., FUGLESTVEDT, J. S., PETERS, G. P., ENTING, I. G., VON BLOH,  
2087 W., BROVKIN, V., BURKE, E. J., EBY, M., EDWARDS, N. R., FRIEDRICH, T., FRÖ-  
2088 LICHER, T. L., HALLORAN, P. R., HOLDEN, P. B., JONES, C., KLEINEN, T., MAC-  
2089 KENZIE, F. T., MATSUMOTO, K., MEINSHAUSEN, M., PLATTNER, G.-K., REISIN-  
2090 GER, A., SEGGSCHNEIDER, J., SHAFFER, G., STEINACHER, M., STRASSMANN, K.,  
2091 TANAKA, K., TIMMERMANN, A. et WEAVER, A. J. (2013). Carbon dioxide and  
2092 climate impulse response functions for the computation of greenhouse gas metrics :  
2093 a multi-model analysis. *Atmos. Chem. Phys.*, 13(5):2793–2825.
- 2094 JOOSTEN, H. et CLARKE, D. (2002). *Wise use of mires and peatlands*. International  
2095 mire conservation group.
- 2096 JUNE, T., EVANS, J. R. et FARQUHAR, G. D. (2004). A simple new equation for the  
2097 reversible temperature dependence of photosynthetic electron transport : a study on  
2098 soybean leaf. *Funct. Plant Biol.*, 31(3):275–283. WOS :000220831200008.
- 2099 JUSZCZAK, R., ACOSTA, M. et OLEJNIK, J. (2012). Comparison of daytime and night-  
2100 time ecosystem respiration measured by the closed chamber technique on temperate  
2101 mire in Poland. *Pol. J. Environ. Stud.*, 21(3):643–658.
- 2102 KAUFMAN, D. S., AGER, T. A., ANDERSON, N. J., ANDERSON, P. M., ANDREWS,  
2103 J. T., BARTLEIN, P. J., BRUBAKER, L. B., COATS, L. L., CWYNAR, L. C., DUVALL,  
2104 M. L., DYKE, A. S., EDWARDS, M. E., EISNER, W. R., GAJEWSKI, K., GEIRSDÓT-  
2105 TIR, A., HU, F. S., JENNINGS, A. E., KAPLAN, M. R., KERWIN, M. W., LOZHKNIN,  
2106 A. V., MACDONALD, G. M., MILLER, G. H., MOCK, C. J., OSWALD, W. W., OTTO-  
2107 BLIESNER, B. L., PORINCHU, D. F., RÜHLAND, K., SMOL, J. P., STEIG, E. J. et  
2108 WOLFE, B. B. (2004). Holocene thermal maximum in the western Arctic (0–180°W).  
2109 *Quaternary Science Reviews*, 23(5–6):529–560.
- 2110 KENNEDY, G. W. et PRICE, J. S. (février 1, 2005). A conceptual model of volume-  
2111 change controls on the hydrology of cutover peats. *J. Hydrol.*, 302(1–4):13–27.
- 2112 KETCHESON, S. J. et PRICE, J. S. (2014). Characterization of the fluxes and stores of  
2113 water within newly formed Sphagnum moss cushions and their environment. *Ecohy-  
2114drology*, 7(2):771–782.
- 2115 KETTUNEN, A., KAITALA, V., ALM, J., SILVOLA, J., NYKÄNEN, H. et MARTIKAINEN,  
2116 P. J. (1996). Cross-correlation analysis of the dynamics of methane emissions from  
2117 a boreal peatland. *Glob. Biogeochem. Cycles*, 10(3):457–471.
- 2118 KIM, J. et VERMA, S. B. (1992). Soil surface CO<sub>2</sub> flux in a Minnesota peatland.  
2119 *Biogeochemistry*, 18(1):37–51.
- 2120 LAI, D. (2009). Methane Dynamics in Northern Peatlands : A Review. *Pedosphere*,  
2121 19(4):409–421.
- 2122 LAIHO, R. (août 2006). Decomposition in peatlands : Reconciling seemingly contrasting  
2123 results on the impacts of lowered water levels. *Soil Biology and Biochemistry*, 38(8):  
2124 2011–2024.

- 2125 LANDVA, A. O., KORPIJAAKKO, E. O. et PHEENEY, P. E. (1983). Geotechnical clas-  
2126 sification of peats and organic soils. *In Testing of peats and organic soils*, volume  
2127 820, pages 37–51.
- 2128 LAPPALAINEN, E. (1996). *Global peat resources*, volume 4. International Peat Society  
2129 Jyskä.
- 2130 LELIEVELD, J. O. S., CRUTZEN, P. J. et DENTENER, F. J. (1998). Changing concentra-  
2131 tion, lifetime and climate forcing of atmospheric methane. *Tellus B*, 50(2):128–150.
- 2132 LIMPENS, J. et BERENDSE, F. (2003). How litter quality affects mass loss and N loss  
2133 from decomposing Sphagnum. *Oikos*, 103(3):537–547.
- 2134 LIMPENS, J., BERENDSE, F., BLODAU, C., CANADELL, J. G., FREEMAN, C., HOLDEN,  
2135 J., ROULET, N., RYDIN, H. et SCHAEPMAN-STRUB, G. (2008). Peatlands and the  
2136 carbon cycle : from local processes to global implications – a synthesis. *Biogeosciences*,  
2137 5(2):1475–1491.
- 2138 LIU, W., FOX, J. E. et XU, Z. (2000). Leaf litter decomposition of canopy trees, bamboo  
2139 and moss in a montane moist evergreen broad-leaved forest on Ailao Mountain,  
2140 Yunnan, south-west China. *Ecol. Res.*, 15(4):435–447.
- 2141 LIVINGSTON, G. P. et HUTCHINSON, G. L. (1995). Enclosure-based measurement of  
2142 trace gas exchange : applications and sources of error. *Biog. Trace Gases Meas.*  
2143 *Emiss. Soil Water*, pages 14–51.
- 2144 LONG, K. D., FLANAGAN, L. B. et CAI, T. (2010). Diurnal and seasonal variation in  
2145 methane emissions in a northern Canadian peatland measured by eddy covariance.  
2146 *Global Change Biology*, 16(9):2420–2435.
- 2147 LUND, M., CHRISTENSEN, T. R., LINDROTH, A. et SCHUBERT, P. (2012). Effects  
2148 of drought conditions on the carbon dioxide dynamics in a temperate peatland.  
2149 *Environ. Res. Lett.*, 7(4):045704.
- 2150 LUO, Y. et ZHOU, X. (2006a). Chapter 5 - Controlling factors. *In LUO, Y. et ZHOU,*  
2151 X., éditeurs : *Soil Respiration and the Environment*, pages 79 – 105. Academic Press,  
2152 Burlington.
- 2153 LUO, Y. et ZHOU, X. (2006b). Chapter 8 - Methods of measurements and estimations.  
2154 *In LUO, Y. et ZHOU, X., éditeurs : Soil Respiration and the Environment*, pages 161  
2155 – 185. Academic Press, Burlington.
- 2156 MACDONALD, G. M., BEILMAN, D. W., KREMENETSKI, K. V., SHENG, Y., SMITH,  
2157 L. C. et VELICHKO, A. A. (2006). Rapid early development of circumarctic peatlands  
2158 and atmospheric CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> variations. *Science*, 314(5797):285–288.
- 2159 MAHECHA, M. D., REICHSTEIN, M., CARVALHAIS, N., LASSLOP, G., LANGE, H., SE-  
2160 NEVIRATNE, S. I., VARGAS, R., AMMANN, C., ARAIN, M. A., CESCATTI, A., JANS-  
2161 SENS, I. A., MIGLIAVACCA, M., MONTAGNANI, L. et RICHARDSON, A. D. (2010).  
2162 Global Convergence in the Temperature Sensitivity of Respiration at Ecosystem Le-  
2163 vel. *Science*, 329(5993):838–840.

- 2164 MALMER, N., SVENSSON, B. M. et WALLÉN, B. (1994). Interactions between Sphagnum  
2165 mosses and field layer vascular plants in the development of peat-forming systems.  
2166 *Folia geobot. phytotax.*, 29(4):483–496.
- 2167 MANNEVILLE, O. (1999). *Le monde des tourbières et des marais : France, Suisse,  
2168 Belgique et Luxembourg*. Delachaux & Niestle.
- 2169 MOORE, T. R., BUBIER, J. L., FROLKING, S. E., LAFLEUR, P. M. et ROULET, N. T.  
2170 (2002). Plant biomass and production and CO<sub>2</sub> exchange in an ombrotrophic bog.  
2171 *Journal of Ecology*, 90(1):25–36.
- 2172 MUNIR, T. M., PERKINS, M., KAING, E. et STRACK, M. (février 20, 2015). Carbon  
2173 dioxide flux and net primary production of a boreal treed bog : Responses to warming  
2174 and water-table-lowering simulations of climate change. *Biogeosciences*, 12(4):1091–  
2175 1111.
- 2176 NATIONAL WETLANDS WORKING GROUP (1997). *The Canadian wetland classifica-  
2177 tion system*. University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 2nd edition édition.
- 2178 ORLOWSKY, B. et SENEVIRATNE, S. I. (2012). Global changes in extreme events :  
2179 regional and seasonal dimension. *Clim. Change*, 110(3-4):669–696.
- 2180 PARKIN, T. B. et KASPAR, T. C. (2003). Temperature Controls on Diurnal Carbon  
2181 Dioxide Flux. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 67(6):1763–1772.
- 2182 PAVELKA, M., ACOSTA, M., MAREK, M. V., KUTSCH, W. et JANOUS, D. (2007).  
2183 Dependence of the Q<sub>10</sub> values on the depth of the soil temperature measuring point.  
2184 *Plant Soil*, 292(1-2):171–179.
- 2185 PEICHL, M., ÖQUIST, M., LÖFVENIUS, M. O., ILSTEDT, U., SAGERFORS, J., GRELLE,  
2186 A., LINDROTH, A. et NILSSON, M. B. (2014). A 12-year record reveals pre-growing  
2187 season temperature and water table level threshold effects on the net carbon dioxide  
2188 exchange in a boreal fen. *Environ. Res. Lett.*, 9(5):055006.
- 2189 PELLETIER, L., MOORE, T. R., ROULET, N. T., GARNEAU, M. et BEAULIEU-AUDY,  
2190 V. (2007). Methane fluxes from three peatlands in the La Grande Rivière watershed,  
2191 James Bay lowland, Canada. *J. Geophys. Res. Biogeosciences 2005–2012*, 112(G1).
- 2192 PHILLIPS, C. L., NICKERSON, N., RISK, D. et BOND, B. J. (2011). Interpreting diel  
2193 hysteresis between soil respiration and temperature. *Global Change Biol.*, 17(1):515–  
2194 527.
- 2195 POST, W. M., EMANUEL, W. R., ZINKE, P. J. et STANGENBERGER, A. G. (1982). Soil  
2196 carbon pools and world life zones. *Nature*, 298:156–159.
- 2197 PRATHER, M. J., HOLMES, C. D. et HSU, J. (2012). Reactive greenhouse gas sce-  
2198 narios : Systematic exploration of uncertainties and the role of atmospheric chemistry.  
2199 *Geophys. Res. Lett.*, 39(9):L09803.
- 2200 PRENTICE, I. C., FARQUHAR, G. D., FASHAM, M. J. R., GOULDEN, M. L., HEIMANN,  
2201 M., JARAMILLO, V. J., KHESHGI, H. S., LEQUÉRÉ, C., SCHOLES, R. J. et WALLACE,

- 2202 D. W. R. (2001). The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide. In HOUGH-  
 2203 TON, J. T., DING, Y., GRIGGS, D. J., NOGUER, M., VAN DER LINDEN, P. J., DAI,  
 2204 X., MASKELL, K. et JOHNSON, C. A., éditeurs : *Climate Change 2001 : the Scientific Basis. Contributions of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, pages 185–237. Cambridge University  
 2205 Press, Cambridge, UK.
- 2206
- 2207
- 2208 PUMPANEN, J., KOLARI, P., ILVESNIEMI, H., MINKKINEN, K., VESALA, T., NIINISTÖ,  
 2209 S., LOHLA, A., LARMOLA, T., MORERO, M., PIHLATIE, M., JANSSENS, I., YUSTE,  
 2210 J. C., GRÜNZWEIG, J. M., RETH, S., SUBKE, J.-A., SAVAGE, K., KUTSCH, W., ØS-  
 2211 TRENG, G., ZIEGLER, W., ANTHONI, P., LINDROTH, A. et HARI, P. (2004). Comparison of different chamber techniques for measuring soil CO<sub>2</sub> efflux. *Agric. For. Meteorol.*, 123(3–4):159–176.
- 2212
- 2213
- 2214 RAICH, J. W. et SCHLESINGER, W. H. (1992). The global carbon dioxide flux in soil respiration and its relationship to vegetation and climate. *Tellus B*, 44(2):81–99.
- 2215
- 2216 RAMEAU, J.-C., MANSION, D. et DUMÉ, G. (2008). *Flore forestière française : Plaines et collines*. Forêt privée française.
- 2217
- 2218 RAMSAR, C. (1987). *Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, (Ramsar, Iran, 1971) telle qu'amendée en 1982 et 1987*.
- 2219
- 2220
- 2221 ROBERT, C. (2007). Simple, stable, and compact multiple-reflection optical cell for very long optical paths. *Appl. Opt.*, 46(22):5408.
- 2222
- 2223 ROBERT, M. et SAUGIER, B. (2003). Contribution des écosystèmes continentaux à la séquestration du carbone. *Comptes Rendus Geoscience*, 335(6–7):577–595.
- 2224
- 2225 RYDIN, H. et JEGLUM, J. (2013a). Peatland habitats. In *The biology of Peatlands*, pages 85–107. Oxford University Press.
- 2226
- 2227 RYDIN, H. et JEGLUM, J. (2013b). Productivity and peat accumulation. In *The biology of Peatlands*, pages 254–273. Oxford University Press.
- 2228
- 2229 SIEGENTHALER, U. et OESCHGER, H. (février 4, 1987). Biospheric CO<sub>2</sub> emissions during the past 200 years reconstructed by deconvolution of ice core data. *Tellus B*, 39B(1-2):140–154.
- 2230
- 2231
- 2232 SILVOLA, J., ALM, J., AHLHOLM, U., NYKÄNEN, H. et MARTIKAINEN, P. J. (1996). The contribution of plant roots to CO<sub>2</sub> fluxes from organic soils. *Biol Fertil Soils*, 23(2):126–131.
- 2233
- 2234
- 2235 SMITH, L. C., MACDONALD, G. M., VELICHKO, A. A., BEILMAN, D. W., BORISOVA, O. K., FREY, K. E., KREMENETSKI, K. V. et SHENG, Y. (2004). Siberian Peatlands a Net Carbon Sink and Global Methane Source Since the Early Holocene. *Science*, 303(5656):353–356.
- 2236
- 2237
- 2238
- 2239 SONNENTAG, O., VAN DER KAMP, G., BARR, A. G. et CHEN, J. M. (2010). On the relationship between water table depth and water vapor and carbon dioxide fluxes in a minerotrophic fen. *Glob. Change Biol.*, 16(6):1762–1776.
- 2240
- 2241

- 2242 STRACK, M. (2008). *Peatlands and climate change*. IPS, International Peat Society,  
2243 Jyväskylä, Finland.
- 2244 STRACK, M., WALLER, M. F. et WADDINGTON, J. M. (2006). Sedge succession and  
2245 peatland methane dynamics : A potential feedback to climate change. *Ecosystems*,  
2246 9(2):278–287.
- 2247 STRACK, M. et ZUBACK, Y. C. A. (2013). Annual carbon balance of a peatland 10 yr  
2248 following restoration. *Biogeosciences*, 10(5):2885–2896.
- 2249 SVENSSON, B. M. (1995). Competition between Sphagnum fuscum and Drosera rotun-  
2250 difolia : A Case of Ecosystem Engineering. *Oikos*, 74(2):205–212.
- 2251 TREAT, C. C., BUBIER, J. L., VARNER, R. K. et CRILL, P. M. (2007). Timescale  
2252 dependence of environmental and plant-mediated controls on CH<sub>4</sub> flux in a temperate  
2253 fen. *J. Geophys. Res. Biogeosciences 2005–2012*, 112(G1).
- 2254 TRUDEAU, N. C., GARNEAU, M. et PELLETIER, L. (2012). Methane fluxes from a  
2255 patterned fen of the northeastern part of the La Grande river watershed, James Bay,  
2256 Canada. *Biogeochemistry*, 113(1-3):409–422.
- 2257 TRUDEAU, N. C., GARNEAU, M. et PELLETIER, L. (2014). Interannual variability in  
2258 the CO<sub>2</sub> balance of a boreal patterned fen, James Bay, Canada. *Biogeochemistry*,  
2259 118(1-3):371–387.
- 2260 TURETSKY, M. R., TREAT, C. C., WALDROP, M. P., WADDINGTON, J. M., HAR-  
2261 DEN, J. W. et MCGUIRE, A. D. (2008). Short-term response of methane fluxes and  
2262 methanogen activity to water table and soil warming manipulations in an Alaskan  
2263 peatland. *J. Geophys. Res. Biogeosciences 2005–2012*, 113(G3).
- 2264 TURUNEN, J., TOMPOPO, E., TOLONEN, K. et REINIKAINEN, A. (2002). Estimating  
2265 carbon accumulation rates of undrained mires in Finland—application to boreal and  
2266 subarctic regions. *The Holocene*, 12(1):69–80.
- 2267 UPDEGRAFF, K., BRIDGHAM, S. D., PASTOR, J., WEISHAMPEL, P. et HARTH, C.  
2268 (2001). Response of CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> emissions from peatlands to warming and water  
2269 table manipulation. *Ecol. Appl.*, 11(2):311–326.
- 2270 VARGAS, R., BALDOCCHI, D. D., ALLEN, M. F., BAHN, M., BLACK, T. A., COLLINS,  
2271 S. L., YUSTE, J. C., HIRANO, T., JASSAL, R. S., PUMPANEN, J. et TANG, J. (2010).  
2272 Looking deeper into the soil : biophysical controls and seasonal lags of soil CO<sub>2</sub>  
2273 production and efflux. *Ecol. Appl.*, 20(6):1569–1582.
- 2274 VARGAS, R., CARBONE, M. S., REICHSTEIN, M. et BALDOCCHI, D. D. (2011). Frontiers  
2275 and challenges in soil respiration research : from measurements to model-data  
2276 integration. *Biogeochemistry*, 102(1-3):1–13.
- 2277 VIEL, E., BINET, S., GOGO, S. et LAGGOUN-DÉFARGE, F. (2015). Tree invasion  
2278 controls the drainage pattern in La Guette peatland (France) : impact on the water  
2279 storage capacity of the peat. *Journal of Hydrology (submitted)*.
- 2280 WADDINGTON, J. M. et ROULET, N. T. (2000). Carbon balance of a boreal patterned  
2281 peatland. *Global Change Biology*, 6(1):87–97.

- 2282 WELTZIN, J. F., PASTOR, J., HARTH, C., BRIDGHAM, S. D., UPDEGRAFF, K. et CHA-  
2283 PIN, C. T. (2000). Response of bog and fen plant communities to warming and  
2284 water-table manipulations. *Ecology*, 81(12):3464–3478.
- 2285 WHALEN, S. (2005). Biogeochemistry of Methane Exchange between Natural Wetlands  
2286 and the Atmosphere. *Environmental Engineering Science*, 22(1):73–94.
- 2287 WORRALL, F., BURT, T., ROWSON, J., WARBURTON, J. et ADAMSON, J. (2009).  
2288 The multi-annual carbon budget of a peat-covered catchment. *Science of The Total  
2289 Environment*, 407(13):4084–4094.
- 2290 WUEBBLES, D. J. et HAYHOE, K. (2002). Atmospheric methane and global change.  
2291 *Earth-Sci. Rev.*, 57(3):177–210.
- 2292 YU, Z., BEILMAN, D. W. et JONES, M. C. (2009). Sensitivity of northern peatland car-  
2293 bon dynamics to Holocene climate change. In *Carbon cycling in northern peatlands*,  
2294 volume 184, pages 55–69. American Geophysical Union, Geophysical Monograph Se-  
2295 ries Washington, DC.
- 2296 YU, Z., LOISEL, J., BROSSEAU, D. P., BEILMAN, D. W. et HUNT, S. J. (2010). Global  
2297 peatland dynamics since the Last Glacial Maximum. *Geophys. Res. Lett.*, 37(13).
- 2298 ZHU, X., SONG, C., SWARZENSKI, C. M., GUO, Y., ZHANG, X. et WANG, J. (février  
2299 2015). Ecosystem-atmosphere exchange of CO<sub>2</sub> in a temperate herbaceous peatland  
2300 in the Sanjiang plain of northeast China. *Ecol. Eng.*, 75:16–23.

# Index

2301	<b>A</b>	
2302	atterrissement .....	11
2303	<b>C</b>	
2304	carbone	
2305	stock .....	12
2306	changements globaux .....	2, 14
2307	<b>E</b>	
2308	échange net de l'écosystème	
2309	contrôle .....	21
2310	<b>P</b>	
2311	paludification .....	11
2312	photosynthèse .....	17
2313	production primaire brute	
2314	contrôle .....	21
2315	<b>R</b>	
2316	respiration .....	18
2317	de l'écosystème .....	18
2318	contrôle .....	20
2319	du sol .....	18
2320	<b>S</b>	
2321	services écologiques .....	3
2322	<b>T</b>	
2323	tourbières .....	8–16
2324	distribution .....	11
2325	formation .....	11
2326	surface .....	10
2327	utilisation .....	14
2328	turbification .....	10
2329	<b>Z</b>	
2330	zone humide .....	8



<sub>2331</sub> Annexes

<sub>2332</sub> A Photos supplémentaires



(a) droséra

FIGURE 6 – Végétation présente sur le site de La Guette, et suivie lors des campagnes de mesure.

<sub>2333</sub> B protocole végétation

<sub>2334</sub> Le suivi non-destructif d'une végétation n'est pas triviale et nécessite la mise en  
<sub>2335</sub> place de protocoles particuliers en fonction du type de végétation. L'objectif est de  
<sub>2336</sub> pouvoir estimer une biomasse produite en impactant au minimum la végétation en  
<sub>2337</sub> place. Pour l'ensemble des espèces végétales présentes dans les embases servant à la  
<sub>2338</sub> mesure des flux un recouvrement à été estimé, à l'œil.

<sub>2339</sub> **La strate arbustive**

<sub>2340</sub> Pour la strate arbustive des mesures de hauteur moyenne ont été effectuées, en  
<sub>2341</sub> mesurant depuis le niveau du sol, ou le toit des sphaignes, si elles étaient présentes,  
<sub>2342</sub> jusqu'au sommet de l'individu.

<sub>2343</sub> **La strate herbacée**

<sub>2344</sub> Pour la strate herbacée, en 2013, 5 individus des deux espèces majoritaires (*Eriophorum vaginatum* ? *augustifolium* ?, *Molinia Caerulea*) ont été marqués afin de pourvoir  
<sub>2345</sub> les mesurer plusieurs fois au cours de la saison. Cependant les difficultés à retrouver  
<sub>2346</sub> les individus marqués couplés à la mort d'un nombre important d'entre eux n'ont pas  
<sub>2347</sub> permis d'acquérir de résultats significatifs. En conséquence en 2014 ces deux espèces  
<sub>2348</sub> ont fait l'objet de comptage exhaustif et de mesure de hauteur moyenne.




FIGURE 7 – Calibration de la biomasse en fonction de la hauteur




FIGURE 8 – Scanne des feuilles




FIGURE 9 – Calibration de la biomasse herbacées pour *Molinia Caerulea* (a), pour *Eriophorum* (b) et de la surface de feuille pour *Molinia Caerulea* (c), pour *Eriophorum* (d) en fonction de la hauteur

<sub>2350</sub> C CARBIODIV

<sub>2351</sub> D package m70r

[Prénom NOM]  
**[Titre de la thèse (en français)]**

Résumé : (1700 caractères max.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin volutpat ipsum id purus ultrices lobortis. Maecenas ornare enim quis eros. Nunc eget mauris ut quam malesuada mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer vel tellus. Nam rutrum, purus non sodales rhoncus, quam magna imperdiet eros, sit amet euismod justo metus at orci. Suspendisse neque turpis, feugiat interdum, faucibus vel, aliquet quis, risus. Etiam est elit, eleifend a, consequat sit amet, scelerisque nec, odio. Quisque id odio quis libero iaculis tincidunt. Sed non mi. Morbi aliquam commodo nibh. Integer justo purus, pulvinar a, suscipit vel, iaculis a, justo. Morbi ut orci. Maecenas fringilla orci. Phasellus auctor, enim vitae tempus egestas, justo mi cursus sem, vel blandit leo turpis vitae quam. Etiam sit amet felis vitae eros ornare porttitor.

Curabitur felis velit, aliquam at, aliquet in, iaculis vitae, velit. Nunc lobortis magna id ligula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer congue ultrices mi. Isdem diebus Apollinaris Domitianus gener, paulo ante agens palatii Caesaris curam, ad Mesopotamiam missus a socero per militares numeros immode dicte scrutabatur, an quaedam altiora meditantis iam Galli secreta suscepit scripta, qui conpertis Antiochiae gestis per minorem Armeniam lapsus Constantinopolim petit.

Mots clés : mot 1, mot 2, ...

**[Titre de la thèse (en anglais)]**

Résumé : (1700 caractères max.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin volutpat ipsum id purus ultrices lobortis. Maecenas ornare enim quis eros. Nunc eget mauris ut quam malesuada mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer vel tellus. Nam rutrum, purus non sodales rhoncus, quam magna imperdiet eros, sit amet euismod justo metus at orci. Suspendisse neque turpis, feugiat interdum, faucibus vel, aliquet quis, risus. Etiam est elit, eleifend a, consequat sit amet, scelerisque nec, odio. Quisque id odio quis libero iaculis tincidunt. Sed non mi. Morbi aliquam commodo nibh. Integer justo purus, pulvinar a, suscipit vel, iaculis a, justo. Morbi ut orci. Maecenas fringilla orci. Phasellus auctor, enim vitae tempus egestas, justo mi cursus sem, vel blandit leo turpis vitae quam. Etiam sit amet felis vitae eros ornare porttitor.

Curabitur felis velit, aliquam at, aliquet in, iaculis vitae, velit. Nunc lobortis magna id ligula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae ; Integer congue ultrices mi. Isdem diebus Apollinaris Domitianus gener, paulo ante agens palatii Caesaris curam, ad Mesopotamiam missus a socero per militares numeros immode dicte scrutabatur, an quaedam altiora meditantis iam Galli secreta suscepit scripta, qui conpertis Antiochiae gestis per minorem Armeniam lapsus Constantinopolim petit.

Mots clés : mot 1, mot 2, ...