

# COSYNDO B

## THÀNH PHẦN:

|                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vitamin B <sub>1</sub> (Thiamin mononitrat).....                                                                                                     | 175 mg |
| Vitamin B <sub>6</sub> (Pyridoxin HCl) .....                                                                                                         | 175 mg |
| Vitamin B <sub>12</sub> (Cyanocobalamin.).....                                                                                                       | 125 µg |
| (Tá dược: Tinh bột ngô, PVP K30, Talc, Magnesi stearat, HPMC E15, HPMC E6, Titan dioxyd, PEG 6000, Erythrosin lake, nước tinh khiết vđ..... 1 viên). |        |

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nén bao phim

**DẠNG TRÌNH BÀY:** Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên kèm đơn hướng dẫn sử dụng.

## DƯỢC LỰC HỌC:

### \* Thiamin mononitrat (Vitamin B<sub>1</sub>):

- Dạng hoạt động của thiamin có vai trò một coenzym decarboxylase transketolase. Decarboxylase giúp cho quá trình chuyển hoá pyruvat,  $\alpha$ -ketoglutarat thành các aldehyd và acid carboxylic. Khi thiếu thiamin, nồng độ pyruvat trong máu tăng cao. Ngoài ra, transketolase tham gia vào quá trình chuyển hoá pentose trong chu trình hexose monophosphat và chuyển hoá glucose. Khi thiếu hụt thiamin, lượng transketolase trong hồng cầu giảm rõ rệt.
- Tham gia vào tổng hợp acetylcholin với sự tham gia của acetyl coenzym A.
- Tham gia chuyển hoá acid amin: Khử carboxyl của valin, leucin và isoleusin

### \* Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B<sub>6</sub>):

- Dưới sự xúc tác của pyridoxalkinase vitamin B<sub>6</sub> chuyển thành pyridoxal phosphat có hoạt tính sinh học.
- Pyridoxal phosphat là coenzym của các enzym chuyển hoá acid amin như transaminase, decarboxylase, desaminase, các enzym này giúp chuyển hoá tryptophan thành serotonin, isoleucin thành valin và ngược lại, chuyển hoá leucin thành ketoisocaproic, alanin thành acid pyruvic, methionin thành cystein.
- Tham gia vào sự tổng hợp GABA và chuyển hoá acid oxalic.
- Tham gia sự tạo máu: Tham gia vào sự chuyển hoá vitamin B<sub>12</sub>, Acid folic.

### \* Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>) :

- Là coenzym của một số enzym tham gia tổng hợp acid nucleic và myelin, do đó giúp tế bào trưởng thành và giữ gìn sự toàn vẹn của tế bào thần kinh.
- Tham gia tạo máu và tái tạo nhu mô gan
- Ngoài ra còn có vai trò trong định vị tế bào, sự ổn định và hoạt tính của protein

## DƯỢC ĐỘNG HỌC:

### \* Thiamin mononitrat (Vitamin B<sub>1</sub>):

- Hấp thu trong ăn uống hằng ngày qua đường tiêu hoá là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na<sup>+</sup>. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hoá cao sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng. Tuy vậy, hấp thu liều cao bị hạn chế.
- Ở người lớn, khoảng 1 mg thiamin bị giáng hoá hoàn toàn mỗi ngày trong các mô và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp này, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô đầu tiên được bão hoà. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa thải trừ thiamin chưa biến hoá sẽ tăng lên

### \* Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B<sub>6</sub>)

- Hấp thu: Được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hoá, trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu.
- Phân bố: Sau khi uống thuốc phần lớn dự trữ ở gan và một phần ở cơ và não.
- Thải trừ: Chủ yếu qua thận dưới dạng chuyển hoá. Lượng đưa vào, nếu vượt quá nhu cầu hàng ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến đổi.

### \* Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>) :

- Hấp thu : Sau khi uống thuốc được hấp thu qua ruột, chủ yếu ở hồi tràng theo hai cơ chế: Cơ chế thụ động khi lượng dùng nhiều và cơ chế tích cực cho phép hấp thu những liều lượng sinh lý nhưng cần có yếu tố nội tại là glycoprotein do tế bào thành niêm mạc dạ dày tiết ra. Mức độ hấp khoảng 1% không phụ thuộc vào liều và do đó ngày uống 1 mg sẽ thoả mãn nhu cầu hàng ngày và đủ điều trị tất cả các dạng thiếu vitamin B<sub>12</sub>
- Phân bố: sau khi hấp thu, vitamin B<sub>12</sub> liên kết với transcobalamin II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố ưu tiên vào nhu mô gan. Gan chính là kho dự trữ vitamin B<sub>12</sub> cho các mô khác.
- Thải trừ: Khoảng 3 microgam vitamin B<sub>12</sub> thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50-60% là các của cobalamin không tái hấp thu được.

## CHỈ ĐỊNH:

Điều trị sự thiếu hụt Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12 do chế độ ăn uống không đầy đủ.

Điều trị các trường hợp viêm dây thần kinh và đa dây thần kinh liên quan đến thiếu hụt Vitamin B1, Vitamin B6, liên quan đến rối loạn chuyển hóa (trong bệnh tiểu đường) hoặc nhiễm độc Isoniazid, penicilamin.

Điều trị đau dây thần kinh, đau lưng, đau thần kinh tọa do Isoniazid hoặc gây ra bởi thiếu hụt Pyridoxin, tê phù Beriberi do thiếu Vitamin B1, các rối loạn do ngộ độc rượu mạn tính.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với vitamin nhóm B và các thành phần khác của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

## THẬN TRỌNG:

- Sau thời gian dùng Vitamin B<sub>6</sub> với liều 200mg/ ngày có thể thấy biểu hiện độc tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều 200 mg mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc pyridoxin.
- Vitamin B<sub>6</sub> kích hoạt enzym dopadecarboxylase ngoại biên. Do đó không được dùng vitamin B<sub>6</sub> chung với Levodopa nếu như chất này không phối hợp chung với chất ức chế enzym dopadecarboxylase.

## TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Vitamin B<sub>6</sub> làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson, không xảy ra với chế phẩm là hỗn hợp levodopa-carbidopa hoặc levodopa - benserazid .
- Liều dùng Vitamin B<sub>6</sub> 200 mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenytoin và phenobarbital trong máu ở một số người bệnh.
- Pyridoxin có thể làm giảm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.
- Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu vitamin B<sub>6</sub>.

## PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không được dùng thuốc này do hàm lượng vitamin B<sub>6</sub> quá cao.

## TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

## LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Liều dùng: 2 viên/ngày
- Cách dùng: Nên chia liều dùng mỗi ngày ra làm 2 lần, uống trước hoặc trong bữa ăn.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Rất hiếm khi gây các phản ứng dị ứng. Có thể gây dị ứng như shock, mày đay, ngứa... đôi khi rất nặng.
- Dùng liều Vitamin B<sub>6</sub> cao (2 - 3 gam/ ngày) và kéo dài trên 2 tháng có thể gây các biểu hiện thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ đáng đi không vững và tê cứng bàn chân đến tê cứng và vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể được hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn để lại ít nhiều di chứng.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

## QUÁ LIỀU:

### *Quá liều pyridoxin:*

Dùng liều Vitamin B<sub>6</sub> cao (2 - 3 gam/ ngày) và kéo dài trên 2 tháng có thể gây các biểu hiện thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ đáng đi không vững và tê cứng bàn chân đến tê cứng và vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể được hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn để lại ít nhiều di chứng.

### *Xử trí:*

Trong mọi trường hợp ngộ độc cấp, bệnh nhân nên nhập viện để được theo dõi và điều trị nâng cao trong điều kiện đặc biệt.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS

## ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

## ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

## NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC

### *Nhà sản xuất*

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 120 ARMEPHACO**

Số 118 Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên - TP. Hà Nội

ĐT/Fax: 0243 674 0054 - 0243 674 0019

### *Nhà phân phối*

**CÔNG TY CP TM DƯỢC PHẨM-TBYT-HÓA CHẤT HÀ NỘI**

ĐC: Đội 4 - xã Liên Phương - Thường Tín - Hà Nội

Tel: 097.973.6977