

Đại số Bool và Biểu đồ Karnaugh


Lý thuyết tổ hợp

Đại số Bool và Biểu đồ Karnaugh

- Đại Số Bool
- Hàm Bool
- Mạch logic
- Biểu đồ Karnaugh


Mở đầu

Xét mạch điện như hình vẽ



Tùy theo cách trạng thái cầu dao A, B, C mà ta sẽ có dòng điện đi qua MN. Như vậy ta sẽ có bảng giá trị sau

Mở đầu



Câu hỏi: Khi mạch điện gồm nhiều cầu dao, làm sao ta có thể kiểm soát được.

Giải pháp là đưa ra công thức, với mỗi biến được xem như là một cầu dao

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Đại Số Bool

Xét tập hợp $B = \{0, 1\}$. Trên B ta định nghĩa hai phép toán \wedge, \vee như sau:

\wedge	0	1
0	0	0
1	0	1

\vee	0	1
0	0	1
1	1	1

Khi đó, B trở thành một đại số Bool

Hàm Bool

Hàm Bool n biến là ánh xạ

$f : B^n \rightarrow B$, trong đó $B = \{0, 1\}$.

Như vậy hàm Bool n biến là một hàm số có dạng :
 $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, trong đó mỗi biến trong x_1, x_2, \dots, x_n chỉ nhận hai giá trị 0, 1 và f nhận giá trị trong $B = \{0, 1\}$.

Ký hiệu \mathbf{F}_n để chỉ tập các hàm Bool n biến.

Ví dụ. Dạng mệnh đề $E = E(p_1, p_2, \dots, p_n)$ theo n biến p_1, p_2, \dots, p_n là một hàm Bool n biến.

Bảng chân trị

Xét hàm Bool n biến $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Vì mỗi biến x_i chỉ nhận hai giá trị 0, 1 nên chỉ có 2^n trường hợp của bộ biến (x_1, x_2, \dots, x_n) .

Do đó, để mô tả f , ta có thể lập bảng gồm 2^n hàng ghi tất cả các giá trị của f tùy theo 2^n trường hợp của biến. Ta gọi đây là **bảng chân trị của f** .

Ví dụ

Xét kết quả f trong việc thông qua một quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z .

Mỗi phiếu chỉ lấy một trong hai giá trị: **1** (tán thành) hoặc **0** (bác bỏ).

Kết quả **f** là 1 (thông qua quyết định) nếu được đa số phiếu tán thành, là 0 (không thông qua quyết định) nếu đa số phiếu bác bỏ.

Hàm Bool

Khi đó f là hàm Bool theo 3 biến x, y, z có bảng chân trị như sau:

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Các phép toán trên hàm Bool

Các phép toán trên F_n được định nghĩa như sau:

Phép cộng Bool \vee :

Với $f, g \in F_n$ ta định nghĩa **tổng** Bool của f và g :

$$f \vee g = f + g - fg$$

Suy ra

\vee	0	1
0	0	1
1	1	1

Các phép toán trên hàm Bool

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n,$$

$$(f \vee g)(x) = f(x) + g(x) - f(x)g(x)$$

Dễ thấy

$$f \vee g \in F_n \text{ và } (f \vee g)(x) = \text{max}\{f(x), g(x)\}$$

Các phép toán trên hàm Bool

Phép nhân Bool \wedge :

Với $f, g \in F_n$ ta định nghĩa **tích Bool** của f và g

$$f \wedge g = fg$$

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n,$$

$$(f \wedge g)(x) = f(x)g(x)$$

Dễ thấy:

$$f \wedge g \in F_n \text{ và } (f \wedge g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

Ta thường viết **fg** thay cho $f \wedge g$

Các phép toán trên hàm Bool

Phép lấy **hàm bù**:

Với $f \in F_n$ ta định nghĩa hàm bù của f như sau:

$$\bar{f} = 1 - f$$

Dạng nổi rời chính tắc của Hàm Bool

Xét tập hợp các hàm Bool của n biến F_n theo n biến x_1, x_2, \dots, x_n

- Mỗi hàm bool x_i hay $\overline{x_i}$ được gọi là **từ đơn**.
- **Đơn thức** là tích khác không của một **số hữu hạn từ đơn**.
- **Từ tối thiểu** là tích khác không của **đúng n từ đơn**.
- **Công thức đa thức** là công thức biểu diễn hàm Bool thành tổng của các đơn thức.
- **Dạng nổi rời chính tắc** là công thức biểu diễn hàm Bool thành tổng của các từ tối thiểu.



$x, \bar{x}, y, \bar{y}, z, \bar{z}, t, \bar{t}$ là các từ đơn.

$x\bar{y}z\bar{t}$; $\bar{x}\bar{y}t$ là các đơn thức.

$x\bar{y}z\bar{t}$ là từ tối thiểu

$$f = xy\bar{z} \vee \bar{y}z$$

Mạng logic (Mạng các cổng)




Input: x_1, x_2, \dots, x_n là các biến Bool

Output $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hàm Bool.

Ta nói mạng logic trên tổng hợp hay biểu diễn hàm Bool ***f***.

Cổng NOT

Kí hiệu cổng



Bảng chân trị

X	not X
0	1
1	0

Input Output


Nếu đưa mức HIGH vào ngõ vào của cổng, ngõ ra sẽ là mức LOW và ngược lại.

$$F(x) = \bar{x}$$

Cổng AND


Cổng AND có ít nhất 2 ngõ vào

Ngõ ra là 1 khi tất cả các ngõ vào là 1,
ngược lại là 0



x and y


$x \bullet y, x \wedge y, x \& y, xy$



Bảng chân trị

X	Y	X and Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cổng OR




Cổng OR có ít nhất là 2 ngõ vào

Ngõ ra là 1, nếu có một ngõ vào là 1, ngược lại là 0

x or y


$x + y, x \vee y, x|y$



Bảng chân trị:

X	Y	X or Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Cổng NAND





Là cổng bù của AND

Có ngõ ra là ngược lại với cổng AND


$$X \text{ nand } Y = \text{not } (X \text{ and } Y) =$$

$$\overline{xy}$$



X	Y	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Cổng NOR



Là cổng bù của OR

Có ngõ ra ngược với cổng OR


$$X \text{ nor } Y = \text{not } (X \text{ or } Y) = \overline{x \vee y}$$




X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Ví dụ

$$f = xz \vee \bar{y}z \vee xt \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}$$



Ví dụ



Thiết kế một mạch điều khiển bởi 2 cầu dao

Mỗi cầu dao xem như là biến x, y : 1 là bật 0 là tắt

Cho $F(x, y) = 1$ khi đèn sáng và 0 khi đèn tắt


Giả sử $F(x, y) = 1$ khi cả hai cái đều bật hoặc cùng tắt

Ta có bảng chân trị sau

x	y	$F(x, y)$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

$x \text{ NOR } y$

$$xy \vee \bar{x} \bar{y}$$



$$\overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} \\ \overline{x \vee y}$$

Thiết kế một mạch điều khiển bởi 3 cầu dao


Mỗi cầu dao xem như là biến x, y : 1 là bật 0 là tắt

Cho $F(x, y, z) = 1$ khi đèn sáng và 0 khi đèn tắt

Giả sử $F(x, y, z) = 1$ khi 1 hoặc 3 cái đều bật.

Ta có bảng chân trị sau

x	y	z	$F(x, y, z)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0



Tối thiểu hoá hàm Bool

Công thức đa thức tối thiểu

Đơn giản hơn

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool :

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k \text{ (F)}$$

$$f = M_1 \vee M_2 \vee \dots \vee M_l \text{ (G)}$$

Ta nói rằng công thức F *đơn giản hơn* công thức G nếu tồn tại đơn ánh $h: \{1, 2, \dots, k\} \rightarrow \{1, 2, \dots, l\}$ sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ thì số từ đơn của m_i không nhiều hơn số từ đơn của $M_{h(i)}$

Công thức đa thức tối thiểu

Đơn giản như nhau

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F , thì ta nói F và G đơn giản như nhau.

**** Công thức đa thức tối thiểu:**

Công thức F của hàm Bool f được gọi là *tối thiểu* nếu với bất kỳ công thức G của f mà đơn giản hơn F , thì F và G đơn giản như nhau.

Phương pháp biểu đồ Karnaugh

Xét f là một hàm Bool theo n biến x_1, x_2, \dots, x_n với $n = 3$ hoặc 4 .

Trường hợp $n = 3$:

f là hàm Bool theo 3 biến x, y, z . Khi đó bảng chân trị của f gồm 8 hàng. Thay cho bảng chân trị của f ta vẽ một bảng chữ nhật gồm 8 ô, tương ứng với 8 hàng của bảng chân trị, được đánh dấu như sau:

	x	x	\bar{x}	\bar{x}
z	101	111	011	001
\bar{z}	100	110	010	000
	\bar{y}	y	y	\bar{y}

Với qui ước:

Khi một ô nằm trong dãy được đánh dấu bởi x thì tại đó $x = 1$, bởi \bar{x} thì tại đó $x = 0$, tương tự cho y, z .

Các ô tại đó f bằng 1 sẽ được đánh dấu (tô đậm hoặc gạch chéo). *Tập các ô được đánh dấu* được gọi là **biểu đồ Karnaugh** của f , ký hiệu là $kar(f)$.

	x	x	\bar{x}	\bar{x}
z	101	111	011	001
\bar{z}	100	110	010	000
	\bar{y}	y	y	\bar{y}

Trường hợp $n = 4$:

f là hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t . Khi đó bảng chân trị của f gồm 16 hàng.

Thay cho bảng chân trị của f ta vẽ một bảng chữ nhật gồm 16 ô, tương ứng với 16 hàng của bảng chân trị, được đánh dấu như sau:

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z	1010	1110	0110	0010	\bar{t}
z	1011	1111	0111	0011	t
\bar{z}	1001	1101	0101	0001	t
\bar{z}	1000	1100	0100	0000	\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

Với qui ước:

Khi một ô nằm trong dãy được đánh dấu bởi x thì tại đó $x = 1$, bởi \overline{x} thì tại đó $x = 0$, tương tự cho y, z, t .

Các ô tại đó f bằng 1 sẽ được đánh dấu (tô đậm hoặc gạch chéo). Tập các ô được đánh dấu được gọi là biểu đồ karnaugh của f , ký hiệu là $kar(f)$.

Trong cả hai trường hợp, hai ô được gọi là **kề nhau** (theo nghĩa rộng), nếu chúng là hai ô **liền nhau** hoặc chúng là **ô đầu, ô cuối** của cùng một hàng (cột) nào đó. Nhận xét rằng, do cách đánh dấu như trên, hai ô kề nhau chỉ lệch nhau ở một biến duy nhất.

Định lý

Cho f, g là các hàm Bool theo n biến x_1, x_2, \dots, x_n . Khi đó:

a) $\text{kar}(f \wedge g) = \text{kar}(f) \cap \text{kar}(g)$. (tích)

b) $\text{kar}(f \vee g) = \text{kar}(f) \cup \text{kar}(g)$. (tổng)

c) $\text{kar}(f)$ gồm đúng một ô khi và chỉ khi f là một từ tối tiểu.

Tế bào

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô

n: số biến

k: số từ đơn của đơn thức

Nếu T là một tế bào thì T là **biểu đồ karnaugh** của một đơn thức duy nhất **m**.

Cách xác định **m** như sau:

lần lượt chiếu T lên các cạnh, nếu toàn bộ hình chiếu nằm trọn trong một từ đơn nào thì từ đơn đó mới xuất hiện trong m.

Ví dụ 1. Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t .

Biểu đồ karnaugh của đơn thức $x\bar{y}z\bar{t}$ là

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

$n=4$ (số biến)

$k=4$ (số từ đơn của đơn thức: x, \bar{y}, z, \bar{t})

$2^{n-k}=2^0=1$ ô

Ví dụ 2. Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t .

Biểu đồ karnaugh của đơn thức $\bar{y}z\bar{t}$ là

$n = 4$
 $k = 3$
 2^1 ô





	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

Ví dụ 3.

Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t .

$n=4$
 $k=2$
 2^2 ô









Biểu đồ karnaugh của đơn thức $\bar{y}t$ là

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

Ví dụ 4.

Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t .

Biểu đồ karnaugh của đơn thức \bar{t} là

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

Ví dụ 5.

Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t .

Tế bào sau:

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

Là biểu đồ Karnaugh của đơn thức nào?

$y\bar{t}$

Tế bào lớn

Cho hàm Bool f . Ta nói T là một **tế bào lớn** của $\text{kar}(f)$ nếu T thoả hai tính chất sau:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq \text{kar}(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thoả $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq \text{kar}(f)$.

Ví dụ. Xét hàm Bool f theo 4 biến x, y, z, t có biểu đồ karnaugh như sau:

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

Kar(f) có 6 **tế bào lớn** như sau:

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

XZ

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

$\bar{y}z$

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	
	$x\bar{t}$				

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	
	xy				

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	
	$y\bar{z}t$				

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z					\bar{t}
z					t
\bar{z}					t
\bar{z}					\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	
	$\bar{y}\bar{t}$				

Thuật toán

Bước 1: Vẽ biểu đồ karnaugh của f .

Bước 2: Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.

Bước 3: Xác định các tế bào lớn **m** nhất thiết phải chọn.

Ta nhất thiết phải chọn tế bào lớn T **khi** tồn tại một ô của $kar(f)$ mà ô này chỉ nằm trong tế bào lớn T và không nằm trong bất kỳ tế bào lớn nào khác.

Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 đã phủ được $\text{kar}(f)$ thì ta có duy nhất một phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của $\text{kar}(f)$.

Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 chưa phủ được $\text{kar}(f)$ thì:

Xét một ô chưa bị phủ, sẽ có ít nhất hai tế bào lớn chứa ô này, ta chọn một trong các tế bào lớn này. Cứ tiếp tục như thế ta sẽ tìm được tất cả các phủ gồm các tế bào lớn của $\text{kar}(f)$.

Loại bỏ các phủ không tối tiểu, ta tìm được tất cả các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của $\text{kar}(f)$.

- Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối thiểu của f .

Từ các phủ tối thiểu gồm các tế bào lớn của $\text{kar}(f)$ tìm được ở bước 4 ta xác định được các công thức đa thức tương ứng của f .

Loại bỏ các công thức đa thức mà có một công thức đa thức nào đó thực sự đơn giản hơn chúng.

Các công thức đa thức còn lại chính là các công thức đa thức tối thiểu của f .

Ví dụ 1

- Tìm tất cả các công thức đa thức tối thiểu của hàm Bool:

$$\begin{aligned} f(x, y, z, t) &= xyz t \vee x \bar{y} \vee x \bar{z} \vee yz \vee xy(\bar{z} \vee \bar{t}) \\ &= xyz t \vee x \bar{y} \vee x \bar{z} \vee yz \vee xy \bar{z} \vee xy \bar{t} \end{aligned}$$

$$f(x, y, z, t) = \textcolor{red}{xyzt} \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee \textcolor{red}{x}\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee x \bar{y} \vee \textcolor{red}{x \bar{z}} \vee yz \vee xy \bar{z} \vee xy \bar{t}$$

$$f(x, y, z, t) = xyz\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{z}\bar{t} \vee \textcolor{red}{y}z \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

Dark Blue	Yellow	Yellow	White
Dark Blue	Yellow	Yellow	White
Light Blue	Light Blue	White	White
Light Blue	Light Blue	White	White

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee x \bar{y} \vee x \bar{z} \vee yz \vee \textcolor{red}{x y \bar{z}} \vee x y \bar{t}$$



$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee x \bar{y} \vee x \bar{z} \vee yz \vee xy \bar{z} \vee \textcolor{red}{xy \bar{t}}$$

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee x \bar{y} \vee x \bar{z} \vee yz \vee xy \bar{z} \vee xy \bar{t}$$


Bước 1: Vẽ $\text{kar}(f)$:

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{z} \vee yz \vee x \bar{y} \bar{z} \vee x y \bar{t}$$

Bước 2: Kar(f) có các tế bào lớn như sau:



x



yz

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn:

- Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất x. Ta chọn x.
- Ô 3 nằm trong một tế bào lớn duy nhất yz. Ta chọn yz.

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

1	2		
4	5		
7	8		
9	10		

x

	2	3	
	5	6	

yz

Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

x

Ta được duy nhất một phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của $\text{kar}(f)$:

$x \vee yz$.

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

yz

$$f(x, y, z, t) = xyz t \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{z} \vee yz \vee x \bar{y} \bar{z} \vee x \bar{y} \bar{t}$$

- Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối thiểu của f.
 Ứng với phủ tối thiểu gồm các tế bào lớn tìm được ở bước 4 ta tìm được duy nhất một công thức đa thức tối thiểu của f:

$$x \vee yz$$

Ví dụ 2:

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyz t \vee \bar{x}z\bar{t}$$

	x	x	\bar{x}	\bar{x}	
z			1	2	\bar{y}
z	3	4		5	t
\bar{z}					t
\bar{z}	6	7	8	9	\bar{t}
	\bar{y}	y	y	\bar{y}	

B1: Vẽ Kar(f)

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyz t \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{z}\bar{t}$

$\bar{x}\bar{t}$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

xzt

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{x}\bar{y}z$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{y}zt$

thứ?

B2: Xác định tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyz\bar{t} \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

xzt

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{z}\bar{t}$

$\bar{x}\bar{y}z$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{x}\bar{t}$

$\bar{y}zt$

B3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

- Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn
 - Ô 6 nằm trong một tế bào lớn duy nhất . Ta chọn $\bar{z}\bar{t}$
 - Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất . Ta chọn $\bar{x}\bar{t}$
 - Ô 4 nằm trong một tế bào lớn duy nhất xzt . Ta chọn xzt

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

xzt

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{z}\bar{t}$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$\bar{x}\bar{t}$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$$

B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

Còn lại ô 5 chưa bị phủ
Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\bar{x}\bar{y}z$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\bar{y}zt$$

B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

Còn lại ô 5 chưa bị phủ

Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}yz$$

$$\bar{x}\bar{y}z$$

B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyz\bar{t} \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

Còn lại ô 5 chưa bị phủ

Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xz\bar{t} \vee \bar{y}zt$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\bar{y}zt$$

B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

- Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối thiểu của f

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$$

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$$

Bài tập



- Hãy xác định các công thức đa thức tối thiểu của hàm Bool:

$$\begin{aligned} f &= xz(\bar{y} \vee \bar{t}) \vee \bar{x} \bar{z} \bar{t} \vee z(yt \vee \bar{x} \bar{y}) \\ &= xz\bar{y} \vee xz\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}\bar{t} \vee zy\bar{t} \vee z\bar{x}\bar{y} \end{aligned}$$