



Matemática Computacional

Todos os cursos C&TIC

Matemática Aplicada à Computação; Matemática;
Fundamentos de Computação; Modelagem Computacional





$$2\sqrt{y^2 - x^2}$$



$$x = 2y^2$$
$$z = 1 + y$$
$$z = 4 + y$$

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 z^{10(x+3y)} du =$$








$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^1$$

Dúvida...!

Por que devemos estudar Matemática Computacional???







$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^y$$


$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$


Resolução de Problemas Complexos

Ferramentas numéricas e algoritmos traduzem fenômenos físicos e matemáticos pesados em soluções práticas e precisas.



CIÊNCIA DE DADOS







$$y^2 = \cos 2x^2$$


$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^y$$

Fundamento para IA e Machine Learning

Compreender algoritmos exige bases sólidas em álgebra linear e cálculo para otimizar o aprendizado das máquinas.








$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

$$\int_0^1 dy \int_0^1 f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^1$$

Otimização de Recursos

Permite criar lógicas eficientes para alocação de recursos, roteamento logístico, previsão de mercado financeiro e criptografia.







$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^1$$

$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

Desenvolvimento do Pensamento Lógico

Melhora a capacidade de estruturar o "passo a passo" (sequências e reconhecimento de padrões) para resolver desafios.



VIBE CODING

1ª hora



VIBE CODING

11ª hora

3 DICAS PARA NÃO SER
O CEBOLINHA



$$\int_0^{1-x} \int_0^{10(x+3y)} \int_0^{10(x+3y)} x^2 dz =$$


$$\frac{3, x=5}{2+4y^2} \cdot \frac{2+4y^2}{2+4y^2}$$

$$V: z=10(x+3y), x+y+z=10, x=0, y=0, z=0$$


01

Fundamentos

A base de tudo



$$= \int_0^1$$



$\int dy$

Conceitos

O que os seguintes **objetos** têm em comum?

- um **grupo** de **pessoas**
- um rebanho de animais
- um **buquê** de **flores**
- uma dúzia de ovos



$$5 = 2$$


fdy

Conceitos

Esses itens têm em comum o fato de representarem a ideia de um **conjunto**, que é uma **coleção** de objetos bem definidos chamados de elementos.

Cada um agrupa indivíduos ou unidades que compartilham **características semelhantes** ou formam uma totalidade.






$$2\sqrt{y^2 - x^2}$$

$$V: z = 10(x + 3y) \\ x = 0, y = 0,$$

Teoria dos Conjuntos

$$= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\cos x} f dy$$






$$Z = \sqrt{y^2 - x^2}$$

$$Z = 1 + \sqrt{9x^2 + 4y}$$

$$Z = 4 + \sqrt{9x^2 + 4y}$$

$$\iiint_V$$

“Todos objetos matemáticos podem ser definidos em termos de conjuntos.”



$$y$$

$$V: z = 10(x + 3y), x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

fdy

Conjuntos

Notação:

Seja **S** um conjunto e **a** um elemento de S.

- $a \in S$: a pertence a S
- $a \notin S$: a não pertence a S



$5 = 2$

$\int dy$

Conjuntos

Axioma da extensão:

- Um conjunto é completamente determinado pelos seus elementos.
- A ordem na qual os elementos são listados é irrelevante.
- Elementos podem aparecer mais de uma vez no conjunto.



fdy

Exercício

Você faz um levantamento entre os **87** usuários de computador que assinam a sua newsletter, preparando-se para lançar seu novo programa de computador.

Os resultados de seu levantamento revelam que **68** assinantes têm disponível um sistema operacional baseado

em Windows, **34** têm disponível um sistema Unix e **30** têm acesso a um Mac.



fdy

Exercício

Além disso, **19** têm acesso aos sistemas Windows e Unix, **11** têm acesso aos sistemas Unix e Mac, e **23** podem usar tanto Windows quanto Mac.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Exercício


Quantos de seus assinantes têm acesso a todos os três tipos de sistema?



$$5 = 2$$

$\int f dy$


Diagrama de Venn



$$5 = 2$$

^r
f dy


Diagrama de Venn



$$5 = 2$$

^r
fdy

Diagrama de Venn




$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Operações com conjuntos:

Uniao de dois conjuntos



$$5 = 2$$

fdy

Conceitos

A **união de dois conjuntos** é a operação que junta todos os elementos dos conjuntos envolvidos em um único novo conjunto.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Se um elemento estiver presente em ambos, ele é escrito apenas uma vez.

O símbolo matemático utilizado é o **U**.



$\int f dy$

Regras

Junção: $A \cup B$ é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B (ou a ambos).

Sem repetição: Elementos repetidos aparecem uma única vez.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Conjunto A = {1, 2, 3}

Conjunto B = {3, 4, 5}



$$5 = 2$$

$\int dy$

Conceitos

Unindo os dois conjuntos, temos:

$$A \cup B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

Note que o número 3, que estava nos dois conjuntos, aparece apenas uma vez no resultado.



$\int dy$

Conceitos

Unindo os dois conjuntos, temos:

$$A \cup B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

$A \cup B$:

Lê-se "A união B" ou "A união com B".



fdy

Conceitos

Notação de Conjunto
(Definição por compreensão)

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ ou } x \in B \}$$

Lê-se da seguinte forma:

"A união B é igual ao conjunto dos x, tal que x pertence a A, ou x pertence a B."



$$5 = 2$$

r
 fdy

Conceitos

O símbolo $\{ \}$ lemos como "o conjunto dos...".

A barra vertical $|$ lemos como "tal que" (ou "onde").



fdy

Conceitos

Conjuntos **Disjuntos** (Sem elementos em comum)

Imagine que o Conjunto A representa os números pares menores que 6, e o Conjunto B representa os números ímpares menores que 6.

$$A = \{2, 4\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$



$$5 = 2$$

fdy

Conceitos

Conjuntos com **Interseção** (Elementos compartilhados)

Imagine que o Conjunto A é o conjunto de disciplinas de exatas e o Conjunto B é o conjunto de disciplinas de laboratório.

$A = \{\text{Física, Cálculo}\}$

$B = \{\text{Física, Química}\}$

$A \cup B = \{\text{Física, Cálculo, Química}\}$



$5 = 2$

fdy

Conceitos

Subconjuntos (Um contido no outro)

Se o Conjunto A é um subconjunto de B (ou seja, todo elemento de A também está em B), a união é o próprio conjunto maior.

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} = B$$



$$5 = 2$$

fdy

Para não esquecer

Comutatividade: A ordem não importa.

$$A \cup B = B \cup A$$



$$5 = 2$$

$\int dy$

Para não esquecer

Idempotência: Unir um conjunto com ele mesmo resulta nele mesmo.

$$A \cup A = A$$



$$5 = 2$$

fdy

Para não esquecer

Elemento Neutro:

Unir qualquer conjunto com o conjunto vazio $\{ \}$ ou $\emptyset$ (zero cortado) resulta no próprio conjunto

$$A \cup \emptyset = A$$



$$5 = 2$$

fdy

Para não esquecer

Elemento Neutro:

Unir qualquer conjunto com o conjunto vazio $\{ \}$ ou $\emptyset$ (zero cortado) resulta no próprio conjunto

$$A \cup \emptyset = A$$



$$5 = 2$$



$$V: z = 10(x + 3y) \\ x = 0, y = 0,$$

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 \arccos y \, dy \\ \int_0^1 f(2x) =$$



**A prática leva a
perfeição!**

$$V: z = 10(x + 3y), x + y = 1$$

$$x = 0, y = 0, z = 0$$

Faça as listas de exercícios!

Aprendemos praticando!



$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 z \Big|_0^{10(x+3y)}$$


fdy

Referências

- MATHEMATICAL STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE, SEVENTH EDITION
- Fundamentos matemáticos para a ciência da computação : matemática discreta e suas aplicações / Judith L. Gersting ; tradução Valéria de Magalhães Iorio. - 7.
- https://youtu.be/3kBuU7hTaIM?si=t7oOp_WAkI8U1RIc
- <https://www.youtube.com/watch?v=qhu7VSyD5Mo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Vw-yk-hhIXk>




$$5 = 2$$



$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x) dx + \int_0^1 dy \int_{1-y}^1 f(x) dx$$

$$S = 2\pi R$$



Thanks!

Do you have any questions?

daniel.h.paiva@ulife.com.br

